

1
HIPPOCRATIS

COL,

CHIRURGIA,

NUNC PRIMUM GRÆCE
RESTITUTA LATINITATE

donata, & commentariis
illustrata.


A STEPH. MANIALDO M. Doct.



PARISIIS,

Apud IOANN. LIBERT, via Diui
Ioan. Lateranensis è Regione Collegij
Cameracensis. 1619.


Cum Privilegio Regio.



THE BOOK OF GUTHRIE & ROLLA

THE
REGISTER
OF THE
GUTHRIE & ROLLA

THE
REGISTER
OF THE
GUTHRIE & ROLLA



THE
REGISTER
OF THE
GUTHRIE & ROLLA


THE
REGISTER
OF THE
GUTHRIE & ROLLA

THE
REGISTER
OF THE
GUTHRIE & ROLLA

THE
REGISTER
OF THE
GUTHRIE & ROLLA

THE
REGISTER
OF THE
GUTHRIE & ROLLA

*HENRICO IIII. Christianissimo
& inuictissimo Gallia & Nauarra
Regi, STEPH. MANIALDVS.
S. P. D.*

 **H**IRVRGIAM vetustis-
simam medicinæ partem
tibi nunc offero, Christia-
nissime atq; inuictissime
REX, opus hominum vitæ salutare
& imprimis necessariū, Maiestati tuæ
non inutile, nec iniucundum, tanto
etiam Rege nō indignum. Cū enim
à pueritia, diuturnis maximisque bel-
lis præfueris, cū sæpius cum hoste
confluxeris, & celebres plurésq; victo-
rias retuleris, cū etiam adhuc pro li-
bertate imperij Gallici maxima bella
fœlicissime sustineas, plurimaque tibi
conficienda sint in posterum, vt pro-
uincias male quietas ad obsequium
redigas, vt hostes procul arceas, & an-
tiquum Gallie penè collapsæ splendo-

rem restituas, quid vtilius hactenus,
 quid posthac excogitari potest magis
 necessarium, quàm Chirurgiæ præsi-
 dium? In bellicis enim expeditionib⁹
 medicus vulnerarius siue Chirurgus
 Homero iure censetur πολλῶν ἀνθρώπων
 ἄλλων. In his enim non aqua, non igne
 magis vtimur, quàm Chirurgorum
 auxilio. Quæ quamuis verissima sint,
 leuioris tamen operæ hoc opus, tibi
 ad excelsissimum humani generis fa-
 stigium euecto dicare, temerarium &
 ineptum videbitur iis, qui calumniæ
 telum tegere & inumbrare reuerentiæ
 velo se simulabunt. Agere quidem illi
 mecum videntur seuerè, sed tamen
 verè. Opus enim hoc Maiestate tua
 videtur indignum, sterilis materia est,
 horrida, imò sordida & inculta, & in
 qua iuuandi voluntatē placendi gra-
 tiæ prætuli. Si tamen Chirurgiæ vsum
 profectumque spectes, si Hippocratē
 philosophorum & medicorum lumē

vel quasi numen inspicias, iudicabis
 opus hoc, Rex augustissime, maiestate
 tua non indignum. Chirurgiam enim
 offero non inconstantem aut inter
 pollem, sed puram, sinceram, nume-
 ris omnibus absolutam, certis firmis-
 que principiis sic stabilitam, ut nulla
 temporis diuturnitas abolere, nulla
 posterorū portentosa garrulitas im-
 mutare potuerit. Author enim & pa-
 rens huius diuinæ scientiæ fuit Hip-
 pocrates Cous, qui mentiri & fallere
 nescit, & à quo nihil perperam prola-
 tum, vir ut arte insignis sic genere no-
 bilis, ad Herculem enim & Æsculapiū
 originem generis referunt, ut sit ab il-
 lo vigesimus, ab hoc decimus nonus.
 Huius autem medicinæ partis præce-
 pta sic certissima condidit, & perfe-
 ctissima excoluit, ut nihil ad perfe-
 ctionem addi possit, ut mirum sit tam
 puram integramq; lucem in homine
 tenebricoso potuisse inueniri. Admi-

randa certè, vel miseranda potius fuit
 nostrorum hominum socordia, qui
 partem hanc medicinæ hominibus
 adeo fructuosam & vtilem, à magno
 illo Hippocrate clarissimè conditam
 & excultam, in tenebris iacere tandiu
 permiserint, Chirurgis inuidentes,
 eosque tanto thesauro fraudantes.
 Galenus fidissimus Hippocratis in-
 terpres inter Græcos Chirurgiæ huius
 duos libellos commentariis illustra-
 uit, qui temporis iniuria, & magna
 medicæ artis iactura perierunt. Nostra
 memoria Vidiſus Florentinus doctissi-
 mus & elegantissimus medicus tres
 Hippocraticæ Chirurgiæ libros lati-
 nos edidit & cōmentariis auxit, qui-
 bus senis mentem non semper expres-
 sit, & vim verborum sæpius non vidit,
 dignus tamen sua gloria, magna que
 illi habenda gratia, quod partē hanc
 medicinæ tot difficultatibus inuolutā
 & abstrusam, euoluere & in lucē pro-

ferre tentarit, facémque aliis prætulerit, ad hæc diuina Hippocratis mysteria explicanda & illustranda, suóque labore, posteros maxima parte laboris leuarit. Quod mihi animum addidit, vt tam vtilem stabilémque artem à tenebris vindicarem, & Hippocratem penè neglectum & à paucis intellectú reducem suo nitore restituerem, & è densissima nocte in clarissimá lucem ceu postliminio reuocarem, vt tandè aliquando Chirurghi nostri è suis errorum plenis labyrinthis Hippocrate duce egrediantur, nec amplius *ἡποκρίτικὴν καὶ κορυφαίαν*, sed Hippocraticam Chirurgiam exerceant, magno publice sanitatis commodo, magnóque chirurgicæ artis ornamento. Difficile sanè summéque arduum munus suscipio, variisque hominum censuris obnoxium, dum obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, vetustis nouam auctoritatem

dare conor, dum senis linguam mutō.
 Quid præstiterim iudicent alij, ego sa-
 ne profiteor me pluribus locis, in qui-
 bus densa notabatur caligo, lumen
 aliquod attulisse, multa fortasse adiici
 potuerunt, quæ nos præterierunt, sed
 nos succisiuis temporibus & noctur-
 nis lucubrationibus ista curamus, dies
 egrotis impendimus. Quòd si huius
 vitæ vsura aliqua mihi concedatur, o-
 tiumq; suppeditetur, plenior iterum
 stylo hanc partem locupletare & illu-
 strare non grauabor, cæterosque chi-
 rurgicos Hippocratis libellos cum Ga-
 leni commentariis emendare & lati-
 nos facere non recusabo. Sed hæc cō-
 mentatio plurimi est otij quo ego ma-
 ximè nunc egeo. Hoc interim opus,
 qualecumque tandem sit, augustissi-
 mi nominis tui auspicio inchoatū in
 lucē proferre & in hominū manus ve-
 nire volumus, vt virtutum tuarum
 splendore illustrius appareret, & plus

authoritatis apud omnes haberet:
 multa n. valdè pretiosa ideo videntur,
 quia regibus sunt dicata, ne quis for-
 te credat me tenuem obscurumq; ho-
 minem aliquid voluisse moliri, quod
 ad maiestatis tuæ sublimitatem exor-
 nandam pertineret: desipiã profecto,
 si tantam solis lucem, accensa lucer-
 nula, splendidiorē reddere coner.
 Quis enim heroicam corporis tui ma-
 iestatem, firmumque robur, quis re-
 gium ingenium, egregium iudicium,
 singularem memoriã non admiratur?
 Quis tecum genitas virtutes clemen-
 tiam & fortitudinem non agnoscit?
 Quis iustitiam & pietatem non suspi-
 cit? Æquum tamen visum fuit, Hip-
 pocratem restitutum ei offerre, quem
 summa Diuinitatis prouidentia po-
 tissimum delegit, vt florentissimum
 hoc regnum varijs bellorum tem-
 pestatibus & funestis quorundam
 tragœdiis penè collapsum instauraret

& in integrum restitueret: mentem
 siquidem tantæ molis capacem vni ti-
 bi largitus videtur Deus, quem arden-
 tibus votis oro, vt te suo præsidio con-
 tra hostes tueatur, teque ab omnibus
 periculis protegat. inspiretque volun-
 tatem, qua semper iustitiam & pieta-
 tem colas, quod est omnibus salutare,
 tibi ad fælicitatem & nominis æterni-
 tatem, nobis autem ad quietem &
 tranquillitatem; eundemque sum-
 mum Regum Regem per Iesum Chri-
 stum quotidianis precibus precor, vt
 te quem florentissimi regni voluit
 esse custodem, custodiat quàm diu-
 tissimè florentem & incolumem. Vale
 Burdigalæ calendis Ianuariis, 1596.

*HENRICO FLUSSATI
CANDALAE Illustrissimo Boiorum
Principi, Duci Aluini &c. Pari
Franciæ, Cubiculariorum Regis
Primicerio, centum cataphracto-
rum equitum ductori, Xanctonum,
Engolismorū, et Lemouicū Præsidi.
STEPH. MANIALDVS regius
consiliarius Albret. in Castromaur.
Prætor, et Ecclesiarum Gallicarum. a-
pud Regem Christianissimū orator.*

PRODIT tandem in lucem,
tuis auspicijs, meo ductu (Henrice
Flussas Candala illustrissime)
liber, quem iure quodam meo in eadem
familia, eodem patre genitum & natum,
fratrem meum & quidem germanum au-
sim appellare. (Est enim & animi non
minus quam corporis quædam veluti so-

boles & propago.) Is annos complures desideratus et iam pene conclamatus illius incuria & negligentia, cuius fidei fuerat commissus, felici quodam fato non tam inuentus quam repertus, à me fratris officium iucundissima simul et acerbissima, communis utriusque nostrum parentis commemoratione, blande, sed vehementer tamen poposcit. Huic vero vel inuitamento vel postulationi non potui, sed nec debui sane reluctari. Itaque patris exemplum secutus, qui eum magno Regi, sed qui iam (proh dolor!) rebus humanis est ereptus, consecrarat: quando par alius occurrit nemo, feci quod proximum erat, ut aliquem seligerem, qui ab hac dignitate, non ita magno distaret intervallo. Is tu visus es (Princ. Nobiliss.) qui non sanguinis modo & propinquitatis, sed virtutis etiam & fortitudinis cognitione & affinitate quadam, Regem illum contingis. Huc etiam illud accedit, quod cum argumentum libri totum, ad eam

*artis Medicæ partem, quam Chirurgiam
 vocant, pertineat: cuius usus in bello &
 armis præcipuus est: nemini debuit of-
 ferri potius quam tibi, qui martium nes-
 cio quid & proferis & spiras: quod
 tu non tumida & inani iactantia, sed re-
 ipsa & factis toti Europæ demonstrasti:
 Testis sit prima tua adolescentia, qua tu,
 non quod vulgo quidem, sed pernicioso
 exemplo, fieri consuevit: In Christiano-
 rum cæde & sanguine, sed edita Turca-
 rum strage, & gentis barbaræ fracta at-
 que edomita superbia, prima rudimenta,
 & veluti tyrocinia bellicæ virtutis tuæ
 posuisti. Quæ tam præclara initia spon-
 dent in templo memoriæ insculptum ali-
 quando nomen tuum, nullis potius fore
 titulis decorandum, quam Herculis Chri-
 stiani perfidiæ & impietatis & barbaria
 domitoris. Denique illustrissima & spen-
 didissima Candallarum familia à me ex-
 igit: ut propensione, & animo fœlcis
 memoriæ patris mei obsecutus, memo-*

riam tuorum maiorum in te colam, quos
 ille viuos (non modo generis nobilitate
 sed omni etiam virtutis genere florentes)
 & obseruauit & reueritus est: usque a-
 deo ut si viueret, nil dubitandum sit, quin
 post-humum hunc & subcinericium in-
 genij sui fœtum, pene expositum, tuæ tute-
 læ (cuius ob virtutem tuam & generis
 splendorem, authoritas & potentia &
 gratia summa est) esset non minori studio,
 quam submissione animi commendatu-
 rus. Id est quod ego (cordatissime Prin-
 cept) à te peto, atque rogo maiorem in mo-
 dum per studium familiae tuæ, quod ut in
 meo parente fuit, sic in me fore summum
 sancte polliceor. Quod ego ut voueo, fa-
 xit etiam Deus aliquando possim re ipsa ti-
 bi probare. Lutetiae Parisiorum Kalend.
 Nouemb. M. DC. XVII.

In restitutam & latino ser-
mone donatam, à D. Manialdo
insigni Burdegalsensi doctore
Medico Hippocratis artem
Chirurgicam.

Gallia, quæ propria quæris tibi vulnera dextra,
Quamq; agit insanus dura per arma furor,
Hactenus emissum qui sisteret arte cruorem
Defuit, At deinceps qui tibi sistat, habes: (nat,
Hic sua dū Hippocrati, simul & tua vulnera sa-
Da facilem medico mox valitura manum.

In idem opus.

DVM doctus nimis & nimis peritus
Phæbæ Hippocrates vigeret artis,
Hoc videns Deus artifex medendi
Hoc videns simul inuidensque, dextra
Telis undique præpotente missis
Sic opus lacerum manus peritæ
Et totam propè sic peremit artem,
Vt spes à propria salutis arte
Tanto Artis domino diu iacenti
Nulla protinus esset expetenda,
Donc tu nova Manialde Phæbi
Proles, puberibus ferens ab Ida
Dictamum foliis, tuo perennem
Quæstisti Hippocrati, tibi que vitam.

I. SPAGNETVS in suprema Burdigalensi curia Præses.

In Chirurgiam Hippocratis
quam Stephanus Manialdus me-
dicus Burdigalensis restituit.

L Vxata Hippocratis quæ mēbra reponeret, olim
Inuenta Hippocratis est recidiva manus.
Imo Pythagoræ nisi nos ludibria fallunt,
Ad quorum stupuit Græcia tota fidem.
Hippocratis Manialdū inijt mens enthea mentem;
In Manialdo iterum spiret ut Hippocrates.
Fœlices animæ rabiem quæ vincitis Orci,
Atque aliquid fati demitis imperio.

In eandem?

Q Vacunque Hippocratem depositum diu, &
Confectum carie restituit manus,
Næ illa Aesculapio brachium, Apollini
Crus fractum in meliores renocet moras.

P. Borramæus Burdigal.
faciebat.

Εἰς αὐτόν.

Οὕτως αἰτερέχρ, χολδίων, ἡδὲ παραλόφ.

Κηλήτης, σρεβλός, μηδ' αἰάπηρες ἔη.

Εἴ γ' τίς ἴε πεζών, παῖξας ἴε, μαχεσάμενός ἴε

Τεθύμαῖα πολλὰ φέρει, φάρμακα πολλ'

ἔλαχε

Ἰπποκράτη κεκακωμένον ὁ Στέφανος Μα-

ναλδός

Ελκεῖν ἐξουρῶν, σῶσε ἔκ' ἡνυτρεῖ πικρ.

Νιῶ γούν θάρραλέως πηρώσκεο, αἴψα παρέσται

Ἡκὴ, καὶ γ' ἔχης δαύτερόν Ἰπποκράτιν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΡΑΣΣΕΡΙΟΣ.

Ad eundem.

SI caram potuit referre lucem
 Exstincto Hippolyto ferisque tracto
 Doctus Phæbigena, hunc citans in auras
 Herbarum auxilio potentiaque,
 Qui nunc ordinibus sedet Deorum
 Quod cæcas potuit fugare nubes
 Noctis perpetuæ tibi locorum
 Quis conceditur? ecquid esse credam
 Quod tanti faciam ac tuum libellum?
 Nam si tu lacero asperèque tracto
 Diuino Hippocrati mederis ipse
 Qui dudum horridulo iacens sepulchro
 Scriptis illepidum & parum piorum
 Reuixit moriens tua medela,
 Tu princeps medico mederis ipsi
 Qui lumen medicis facemque præfert.
 O noster Manialde, literarum
 Lumen, gloria, commodumque secli.

Stephanus Brassarius.

Adlocutio ad Clariss. Doctiss. eundemq;
integerrimum virum Steph. Manialdum
libri authorem.

Doctrina ingenij, vera probitatis, & acris
Iudicij, moriens hac monumenta tui
Tu dederas (Manialde) ratus generi haud satis esse
Vtilis humano, quod tua vita fuit.
Ni nobis etiam prodesse funere raptus.
Cura tibi nostræ tanta salutis erat.
Obruta sed tenebris æternis ista iacerent,
Fleret & hæc orbis munera adempta sibi.
Ni tibi te proles dignissima successisset,
Effigies animi filius ille tui.
Qua latuere diu, dias qui in luminis oras
Educta, & nobis reddidit, atque sibi.
Illius & ne qua pietas tibi parte deesset,
Candalida hoc, quantum est, esse sacrum voluit.
Hoc tu non poteras fato præreptus acerbo,
Hic si esses, factum tu tamen hoc cuperes.
Nam neque Candalidis fuerat tibi cultior Vllus,
Nec te Candalidis charior Vllus erat.
Namque ardens virtus illos tibi iunxit, & illis
Te coniunxerunt ingenium & probitas.
Sed quid ego te absentem, & celi viuum, lumine cassum
Alloquor, huc me in te summus adegit amor.
Summus amor spatiis longe distantia iungit,
Summus amor vitam reddit & exanimi.
Quamquam tu viuis vita meliore, receptus
Es Cælo, in terris viuere vita gravis.
Cæli progenies terris data, reddita cælo
Eheu debueras serius esse tuo.
Sed nos fallit amor, cæli tibi congrua sedes
Quo dignum in terra nil erat, una fuit.

IOHANNES CAMERO E.B.P. & SS. T.P.

Ad Dominum Stephanum
Manialdum Medicum
Burdigalensem.

*Vlcera, fracturas, luxataq; mēbra chirurg-
Abstergit, solidat, ponit et Hippocrates (gus
Sedulus Hippocratis doctrinā voluis, at ille
Doctrina medicum te Manialde facit.
Vlcera, fracturas, luxataq; mēbra, caducus
Librorum carie passus & Hippocrates,
Vlcera, fracturas, luxataq; mēbra chirurg-
Abstergis, solidas, ponis et Hippocrati, (gus
Næ tu gratus homo, ἐστὶ μὲν τὰ ἀνὰ πελαργεῖν,
Sic pius Hippocrati, factus es Hippocrates.*

Ræmundus Massacus Clariaci Age-
nensis, & collegij Aurelianensis
facultatis Medicæ Decanus.

Εἰς τὴν Στεφάνου τῆς Μανιαλδέ
 τῆς λαμπερῆς τῆς Βυρραλαλαίων τῆς
 χειρουργίας Ἱπποκράτους Ἰωάννης
 ὁ Οὐερδύγκιος.

Ἦνε πλάην, ὡς τ' ἡ γὰρ τῆς σῶμα ἱερῶμα
 Ἱπποκράτους βίβλοις, ὦ Μανιαλδέ, τεῶς
 Ἐκ πλυνῆς, ἡδ' ἀκέφης; ἡ κεν λεχθέντ' ἀπὸ τῆς
 Γεφυρῆς χρυσῶς, ἡδὲ λία βραχέως
 Ἐν πορέσι λόγους, ἡδ' ὀδύλοις ἀποίχης;
 Ἀξιος εἶ πρῶτος τῆς στεφάνου, Στέφανε,
 Πᾶσα γὰρ ἐκ σόφου χειρουργία Κῶα βιώσκει,
 Καὶ ῥά σὴ πρῶτων νῦν παλάμαις τείβεται.

Idem ab eodem totidem versibus
 latinè redditum.

Seu mendum, & veluti diuini in corpore vulnus
 Hippocratis, doce hoc ô Manialde, libro
 Eluis, & reparas: seu, quæ à scriptore feruntur
 Aut nimis obscure, aut fortè nimis breuiter
 Vbere, & egregiè nitido sermone recludis:
 Debetur ἱφάνος in re tibi, Stephane,
 Omnis enim per te Chirurgia Coa renixit,
 Cunctorumque manu iam facilis teritur.

Anagrammatismus,

Manialdus, DAS LUMINA.

*Divini Hippocratis tenebris DAS LUMINA dēsis,
Impositum idcirco nominis omen habes.*

De eodem versibus ropalicis.

Ἡ κλέος ἰητρῶν Μανιαλδὸς ψυχοδότηρων,
Φῶς λαμπρὸν ἐν πνεύματι φέρον συγγραμμάσιν Ἰπ-
ποκράτειοις,

Καὶ νέουσι παρέχον θεραπείαι ποικιλόδουλοι.

Steph. Manialdus fil.

*Pauli Manialdi Med. Doct. de
Chirurgia Hippocratis
à patre restituta.*

EPIGRAMMA.

*Pæoniæ Hippocrates mysteria cōdidit artis;
Divinisque dedit scripta voluminibus.
Quæ non natio ut quondam splendore
refulgent,*

*Obruta tot tenebris, saucia tot maculis.
Restituis scriptis priscum verumq; nitore,
Auctori genium reddis & ingenium.*

*Dum tenebras pellis, dum sordida vulne-
ra sanas,*

*Dum medicam Hippocrati das Ma-
nialde manum.*

EXTRAICT DV PRIVILEGE.



NOVVS PAR LA GRACE DE DIEV
 ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE
 A Nos amez & feaux Conſeillers tenans nos
 Cours de Parlemens, Baillifs, Senefchaux ou
 leurs Lieutenans & autres Juſticiers & offi-
 ciers qu'il appartiendra Salut. Nos chers & bien amez JEAN
 LIBERT Marchant Libraire Juré à Paris & GILBERT
 VERNoy Marchant Libraire à Bordeaux Nous ont fait
 dire & remonſtrer que leurs ayant eſté mis en main vn Li-
 ure intitulé *Hippocratis Coſ, Chirurgia: Nunc primum Græcè
 Reſtituta latinitate donata, & commentarijs illuſtrata* A STEPH.
 MANIALDO M. Doct. ils deſireroient le faire Imprimer &
 donner au public. C'eſt pourquoy les expoſans nous ont
 tres-humblement fait ſupplier les vouloir octroyer nos let-
 tres ſur ce neceſſaires, humblement requerrans Icelles. A
 CES CAUſES Nous auons par ces preſentes permis &
 permettons auſdicts Libert & Vernoy d'Imprimer ou faire
 Imprimer ledit Liure par rel l'Imprimeur qui bon leur ſem-
 blera durant le temps de NEUF ANNEES pendant lequel
 nous faiſons tres-exprefſes deffences à tous Libraires, Impri-
 meurs & autres quelconques de l'Imprimer vendre ny debi-
 ter ſi ce neſt du conſentement deſdits expoſans à peine de
 confiscation & de mil liures d'amande Si VOVS MANDONS
 & à chacun de vous enioignōs que noſtre preſent Priuilege
 & permiſſion, & du contenu cy deſſus vous faites & ſouffrez
 les expoſans ou ceux qui auront droit d'eux, iouyr & vſer
 plainement & paſſiblement ſans qu'il ſoit beſoyn d'autre ſi-
 gnification de ceſdites preſentes que d'en faire mettre vn ex-
 traict au commencement ou à la fin dudit Liure CAR TEL
 EST NOSTRE PLAISIR, donné à Paris le 4. Iour
 de Mars l'An de grace 1619. & de noſtre règne le 9,

PAR LE ROY EN SON CONSEIL

SALOMON.



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΙΗΤΡΟΥ.



Ο' μὲν γράμμα ὅτιν ἰητροῦ
περσασίη, καὶ παρὰ γέλωμα πῶς
χρὴ καθασκευάζειν ἰηθεῖον. ἰη-
τροῦ μὲν εἶναι περσασίην, ὅρῃν
εὐχεως τε καὶ εὐσαρκος ἑστὶ περὶ
τινὶ ὑπάρχουσιν αὐτῷ φύσιν, ἀξιουῖται γὰρ
ὑπὸ πῶν πολλῶν, οἳ μὴ εὖ διακέμενοι τὸ σῶμα
ἔστω, ὡς ἔδ' αὖν ἑτέρων ὀπιμεληθῆναι καλῶς.
ἐπεὶ τὰ πρὶ αὐτὸν καθαίρειν, ὡς ἔχειν ἐοδῆται
χρηστῇ, καὶ χρίσμασιν ἐνὸς μοις, ὁδμίῳ ἔχουσιν
αὐτοπόπῳ περὶ ἀπαντα, τοῦτο γὰρ ἡδέως ἔ-
χειν συμβαίνει τὰς νοσέοντας.

HIPPOCRATIS DE ME-
DICO SIVE CHIRVRGI
institutione.

H O c Libro de Chirurgi institutio-
ne agemus, & tabernæ Chirurgi-

cæ instruendæ præcepta trademus. Ad Chirurgi institutionem pertinet prospicere, vt bono colore, plenoque corporis habitu sit quantum natura eius patitur. Vulgus enim existimat eum, qui sano non est corpore neque alijs bene posse consulere. Præterea in externis mundiciei studeat, vt sit vestitu decoro vnguentis odoratis, odorem suspectum nusquam habentibus. hoc enim ægrotantes delectare solet.



CHIRURGIA Medicinæ pars est, quæ morbos manu curat, cuius effectus inter omnes medicinæ partus evidentissimus est, eiusque artis praxis cognitione & administratione facilissima, quod sub sēsū cadat. idcirco veteres medici discipulos suos in chirurgicis morbis & operibus primū instituebant. Hic autē libellus institutionem eiusmodi continet. Inscribitur verò *περὶ ἰατρῆς*, de Medico manu curante & vulnerario, qui chirurgus est, eiusque officina *ἰατρῆσιν* dicitur, Sic enim explicat Galenus commentario in sententiam quintam libri primi de officina medici, & in exegeſi linguarum Hippocratis καὶ ἰατρῆσιν, exponit, τὰ καὶ χειρουργία. Nos autē *περὶ ἰατρῆς*, vertimus, de Chirurgi institutione, Sic enim Galeno adscriptus liber qui dicitur, *ἰατρὸς*, nominatur etiam *εἰσαγωγὴ*, medi-

cus, siue institutio aut introductio. Hic autem liber genuinus Hippocratis esse non videtur, si λέξιν & πᾶν consideres, & à Galeno nuppiam citatus inuenitur, habet etiam nonnulla, quæ grauitatem & veritatem Hippocraticam non redolent, fuit tamen ab Hippocratis filijs aut discipulis conscriptus, & inter Hippocraticos libros semper relatus. Primum autem in Chirurgo aut medico futuro requirit εὐχρόαν καὶ εὐερίαν siue εὐσαρκίαν, id est floridum colorem, bonumque & plenum corporis habitum, vt vel solo aspectu ægros erigat in spem certam recuperandæ valetudinis. Contra Plato libro tertio de republica vult medicum esse μὴ πάνυ ὑγιγνόν φύσιν, medici enim, inquit, peritissimi & ad artem exercendam præstantissimi euaderent si ab ineunte ætate, præterquam quod artis cognitionem ex præceptoris ore discerent, vsum quoque illius maturé adhiberent, & plurima & pessimè affecta corpora inspicerent atque tractarent, & ipsi in sese omnia morborum genera experiantur, sintque natura non multum sana atque incolumi, neque enim corpus corpore curant, sed animi industria & perspicacitate. Sed valetudinario medico nemo se libenter committit, quoniam vulgus existimat eum qui sano non sit corpore, neque alijs bene prospicere posse. Neque solum in medico aut Chirurgo bonum corporis habitum requirit, sed etiam in rebus externis mundiciem & puritatē, quæ consistit in vestitu & vnguentis. Sit autem vestis χρηστὴ, ἀφελὴς, εὐχρίμων, utilis, simplex, elegans, hic & in libro περὶ εὐχρημοσύνης, non

autem sumptuosa & superflua. Vani enim & ignavi medici, quique μετ' αἰσχροκερδεῖς καὶ ἀρχιμοσύνης, artem profitentur, ex vestitu facile dignoscuntur, atque ut ait author libri περὶ ὑγιαινούσης, οἱ ὑπὸ τῇ φανείᾳ κεκοσμημένοι, πολὺ μᾶλλον φουκτίοι, qui splendidus ornati sunt, multò magis sunt fugiendi. Unguenta etiam odorata medico & Chirurgo concedit, ut egros suauitate odoris delectet, Plinius hanc volup- tatem vocat alienam, etenim odorem qui gerit ipse non sentit. In hoc contextu καθαίρειν retinui, quod est, καθαρεύειν, nitescere purum esse, in puritate degere, legunt quidam καθαρώς εἶχειν.

Δεῖ δὲ τὸ τοιοῦτον σκοπεῖν τὰδε πρὸς τὴν ψυχὴν, σώφρωνα, μὴ μόνον τὸ σιγᾶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν βίον πάντῃ εὐτακτῶν, μέγιστα γὰρ ἔχει πρὸς δοξᾶν ἀχατὰ. τὸ δὲ ἥθος εἶναι καλὸν καὶ ἀγαθόν. τοιοῦτον δ' ὄντα πᾶσι καὶ σεμνὸν καὶ φιλόανθρωπον. τὸ γὰρ περὶ τὰς καὶ τὸ πρὸς τὸ χεῖρον καθαφρονεῖται, καὶ πάντῃ χεῖριστον ἢ σκοπὸν δὲ ἐπὶ τῆς ἐξουσίας. τὰ γὰρ αὐτὰ πρὸς τοῖς αὐτέοις σπᾶνίως ἔχουσιν, ἀγαπᾶται. σχήμασι δὲ ἀπὸ μὲν πρὸς σῶσιν νοῦ μὴ πικρῶς, αὐτὰς γὰρ δοκέειν εἶναι καὶ μισάνθρωπος. ὁ δὲ εἰς γέλωτα ἀνέμεινος, καὶ λίαν ἱλαρὸς, φορτικὸς ὑπολαμβάνεται, φυλακτέον δὲ τὸ τοιοῦτον ἔχει ἥκιστα, δίχαιμον δὲ πρὸς πάντας ὁμιλίην εἶναι. χρὴ γὰρ πολλὰ ἐπακουρέειν δίχαι- ιοσύνην, πρὸς δὲ ἰητὸν ἔμικρά συναλλάγμα- τὰ τοῖσι νοσῶσιν εἶναι, καὶ γὰρ αὐτοὺς ὑποχρεῖται.

sive Chirurgi institutione.

εἰς ποίεσιν τοῖς ἰητροῖς, καὶ πᾶσαν ὥρην ἐντυγ-
χάνουσιν γυναῖξιν, παρθένοις, καὶ τοῖς ἀξίοις πλεί-
στου κλήμασιν. ἐγκρατέως αὖ δέι' ὡς ἀπαντα
ἔχειν πάντα. τὴν μὲν αὖ ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα οὐ-
τω ἀσκήσας.

ANnimaduerte autem circa animū
oportet, vt sit prudens non solum
tacendo, sed & in omni reliqua vita be-
ne compositus, hoc enim ad opinionem
comparandam plurimū conducit. Bo-
nis etiam ac honestis moribus præditus
sit, talis autem cum fuerit omnibus &
modestus & humanus sit. promptitudo
& celeritas contemnuntur, quamuis
plurimum conferant. Considerandum
autem quantum liceat, eadem enim
apud eosdem quandiu rara sunt, in pre-
tio sunt figuram faciei habeat cogita-
bundam, non tamen iracundē, super-
bus enim esse videretur & inhumanus.
Qui in risū propēsiōr est & nimis Hila-
ris molestus habetur, hoc verò vel maxi-
mè vitandum est. Iustus autem in omni
conuersatione sit iustitiam enim pluri-
mū auxiliari & adesse conuenit, cū me-
dico autem non exigua sunt ægris com-
mercia, nam & se medicis tractandos
submitunt, & medici omni fere tem-

porē inter mulieres. Virgines & suppellectilem pretiosam versantur. Continēter igitur ad hæc omnia se habere oportet sicque & animo & corpore dispositum esse conuenit.

IN Chirurgo instituēdo rationem habet tum corporis, tum animi, quid in corpore & circa corpus requiratur, paucis proposuit, nunc inquit quæ sint animi virtutes Chirurgo necessariae duas autem præcipuas virtutes ei tribuit, prudentiam nempe & iustitiam. Prudens erit, Si sit taciturnus, *ἰατρὸς γὰρ ἀσθλεχρὸς νοσοῦντι πάλιν νόσος*, garrulus & loquax medicus, ægrotanti alter morbus, nec debet Chirurgus cū idiotis multa fabulari, libro *περὶ ἐνσημοποιΐας*, & si quid inter curandum viderit, audieritve, aut etiā ad medendum nō adhibitus in cōmuni hominū vita cognouerit, siquidem ea non efferre præstet tacebit, & tanquam arcana apud se continebit *ἐν τῷ ὄρφνῳ*. Ad prudentiam referuntur hæc, ut sit in omni reliquā vita bene compositus, ut sit bonus, honestus, modestus, humanus, ad iuuandum promptus & paratus, cum erit opus facie sit meditabundus, in risum non nimium exolutus nec nimium Hilaris. Ad iustitiam verò pertinet, ut sanctē & castē vitam suā instituat, artemque exerceat, ægrum citò, tutò & iucundē curet, eum in reditu non habeat, morbum ne protrahat, arti suæ auarē pretium non statuatur, mulierum & virginum pudicitie non insidietur, opes ægrotantis suppellectilem

& cætera pretiosa nec clam nec palam attingat. Comite prudentia & iustitia personam Chirurgi dignam sustinebit, gloriamque & laudem sibi comparabit.

Τὰ δὲ εἰς τὴν ἰατρικὴν τέχνην πρὸς θαυμάσια, δι' ὧν ὅτιν ἐῖναι τεχνικόν, ἀπ' ἀρχῆς συνισπλέον, ἀφ' ὧν καὶ μανθάνει ἄνθρωπος ἀρξαιτο. τὰ τοίνυν ἐν ἰατρείῳ θεραπευόμενα, σχεδὸν μανθανόντων ὅτιν. δεῖ δὲ πρῶτον μὲν τόπον ἔχειν τῆς οἰκίας. ἔσται δὲ ὅτο εἰ μὴτε πνεῦμα εἰς αὐτόν πρὸς θαυμάσιον ἐνοχλῇ, μήτε ἥλιος, ἢ αὐγὴ λυπείη. Φῶς δὲ τιλαυγές μὲν τοῖς θεραπεύουσιν ἄλυπον, ἔχει ὁμοίως δὲ τοῖς θεραπευομένοις ὑπάρχει. πάντως μὲν αὖ τοιούτῳ τῷ αὐγίῳ μάλιστα φεικτέον, δι' ὃ καὶ ξυβαίνει τὰς ὀφθαλμοὺς νοσεῖν. τὸ μὲν αὖ Φῶς τοῖσιν ἐῖναι παρήγγελται. τοῦτο δὲ, ὅπως μηδαμῶς ἐναντίως ἔξῃ τῷ προσώπῳ τὰς αὐγὰς, προσενοχλεῖ γὰρ τῷ ὅψιν ἀσθενέως ἔχουσιν. πάντα δ' ἱκανῶς πρὸς φάσις, ἀσθενέοντις ὀφθαλμοὺς ὀπίταραξαι, τῷ μὲν αὖ φωτὶ, τὸτον τὸν τόπον λεγέμενον ὅτιν.

Porrò præcepta ad artem medicam pertinentia, per quæ artifex esse poterit, ab initio considerabimus, ab iis quæ primum homo discere incipit, exorsî. Quæ igitur in Chirurgica taberna curantur, ad discentes fere pertinent. Primum quidem locum domus habere

oportet, Sit autem eiusmodi, vt neque ventus ad ipsum accedens molestus sit, neque sol aut splendor offendat. Splendida quidem lux medentibus non est molesta, ægrotantes tamen offendit talem igitur splendorem penitus fulgere oportet per quem contingit oculos ægrotare, atque hoc de luce sit præceptũ & hoc etiam, vt nequaquam faciem Splendori oppositam habeat, visum. n. debilem fatigat. Omnis autem occasio sufficiens est ad oculos debiles perturbandos. Luce igitur hoc modo vtendum est.

Medicina morborum externorum & internorum curam proficitur. Chirurgus in taberna sua, vbi organa & instrumenta artis omnia præsto sunt, externis manum admouet, internos morbos in egrorum ædibus curat medicus, ob id clinicus dictus, quod non in officina, sed ἐν ταῖς τῶν νοσούντων κλιναῖς, medicinam faciat. Hippocrates autem traditur instituisse hanc medicinam quæ clinice vocatur. Plinius libri 29. capite primo. Hoc autem libro tyrones medicos & Chirurgos instituens de morbis externis tantum loquitur, qui in Officina Chirurgi curantur, hos enim ad tyrones pertinere dicit, internorum non meminit, quoniam eorum cognitio & curatio ad prouectos iam in arte pertinet. Quæ de loco tabernæ commodo

& de luce præscriptis, clariora sunt, & explanationem non desiderant. de duplici specie luminis, communi nempe & artificiosa, de lumine etiam aduerso & auerso, vide primum librum de officina Chirurgi, sententia octaua & nona.

Τὸς δὲ δύφρως ὁμαλὺς εἶναι τοῖς ὕψουσιν ὅτι μάλιστα, ὅπως καὶ αὐτὸς ὦσιν. χαλκώματι δὲ, πλείω τῶν ὀργάνων, μηδενὶ χρῆσθαι. καλλωπισμὸς γὰρ τις εἶναι μοι δοκεῖ φορτικὸς, σκένεσι τοιστέροις χρῆσθαι. τὸ δ' ὕδωρ παρέχεν δεῖ πόπῃ μὲν τοῖς θεραπευομένοις καὶ καθαρόν. τοῖς δὲ ἀπομάγματος καθαροῖς καὶ μαλθακοῖς χρῆσθαι, πρὸς μὲν τῶν ἀφιδάλμους ὀφθαλμοῖς, πρὸς δὲ τὰ τραύματα ἀπὸ γυρίσ. αὐτόμαλα γὰρ ταῦτα βοηθεῖν δοκεῖ καλῶς. τὰ δ' ὄργανα πάντα εὐήρη πρὸς πλεονεξίαν ὑπάρχον δεῖ τῷ μεγέθει, καὶ βάρει, καὶ λεπτότητι.

Selle autem æquales altitudine sint Simprimis, vt eodem modo sedeant Chirurgus & ægrotus Aramento exceptis instrumentis nullo vtatur. Ornatus enim superfluous esse videtur talibus vasis vti. Ijs qui curantur aquam exhibere par est potabilem & puram. Absterforijs puris mollibusque vtendum, in oculis linteis, in vulneribus spongijs, hæc enim sponte sua & per se plurimum prodesse videntur. Omnia autem instrumē-

10 *Hypocratis de Medico-*
ta ad vsum expedita esse conuenit ma-
gnitudine, pondere & tenuitate.

Non solum quæ ad tabernæ locum idoneū
eligendum, & ad lumen commodum v-
surpandum pertinent, scire debet Chirurgus
sed etiam commodam medentis & egrotantis
sessionem cognoscere æquales ergo sint in offi-
cinis Sellæ, vt dextrè se possit Chirurgus ægro-
tanti accommodare, neque verò solum in ta-
bernis requiruntur Sellæ, sed vasa etiam & in-
strumenta, & quædam exterforia. Vasa autem
superflua & luxu diffluentia non comparet, luxu
enim externo famam & authoritatem non sibi
conciliabit, nec Chirurgi personam cum laude
sustinere poterit, sed modestia, morum probi-
tate & artis cognitione, non probat autem æ-
rea vasa, propter luxum & ostentationem, æs
enim apud veteres ante argentum & aurum
summo erat in pretio, æsque inter metalla no-
bilitatem admirationemque diu obtinuit, In-
strumenta ærea concedit, quia rubiginem non
ita celeriter contrahunt. Quæritur tamen ferrea-
ne an ænea sumi debeant, qui ferro æs præferūt,
hoc leuius esse, & facilius tractari, minusque
rubiginem trahere quam ferrum inquiunt. Cō-
tra qui ferrum æri anteponunt, validiorem hu-
ius materiam laudant, ære enim firmitus, effica-
cius, robustiusque ferrum est. Itaque licet & ex
ære, & ex ferro hæc fabricare. præter sellas,
vasa, & instrumenta, requiruntur in taberna
Chirurgi, ea quæ ad excrementa eluenda &
sordes auferendas pertinent, cuiusmodi sunt a-

qualintea & spongiæ. Aqua autem quæ ad ablundas sordes adhibetur, & ad chirurgica vasa & instrumenda lauanda & mundanda sit potabilis & pura, non enim intelligit aquam quæ potui sit exhibenda ægris, sed quæ ad Chirurgicos vsus adhibetur. Sic libro *πεὶ ὑγῶν χρείας, ὕδωρ ποτὸν, κατ' ἰντροῖον, κράτιστον.* Aqua potabilis in Officina Chirurgi optima nam & feramentis & æramenis optima, & medicamentis plurimis conuenientissima. Corpori autem adhibita, aut humectat, aut refrigerat aut calefacit. Cætera absterforia pura sint & munda, potissimumque lintea & spongiæ, quæ etiam per se, non solum detergent, sed etiam desiccant instrumenta etiã sint. *ἐνὴν πρὸς τὴν χρείαν,* ad vsum medicum expedita, agilia & tractabilia Sint etiam exposita vbi oportet, ne operam impediant neue longius distent, quàm vt prehendi possint, sed collocentur iuxta eam corporis partem quæ tractatur. Quod si ab altero præbeantur, is paulo anteparatus sit, exequatur autē vbi imperaueris, circa finem commentarij primi de officina medici.

Τὰ δὲ προπρόμνη ἀπαντα μὲν χεῖρ σινω-
ριῶ ὅπως συνοίση, μάλιστα δὲ, πλείστον εἰ ὁμι-
λεῖν μέλλῃ τῷ νοσούντι μέρει. Ταῦτα δὲ ὅστιν ἐ-
πίδωματα, καὶ φάρμακα, καὶ τὰ πρὶ τὸ ἔλκος
ὀφθόνια, καὶ τὰ κατὰ πλάσματτα. πλείστον γὰρ χεῖρ-
ον ταῦτα πρὶ τὴν νοσούντῃς ὅστι τὸ πάθος. ἡ δὲ με-
τὰ ταῦτα ἀφαίρεσις τῶν, ἀνάφυξις τε καὶ πρι-
κάθαρσις, καὶ τῇ ὕδατων κατὰ τλῆσις ὀλίγη



πινός ἐστι χεῖρον, καὶ τὶ ποιῆσαι ὅπου χεῖρ, μᾶλλον
 τε καὶ ἥσυχον ἐσκέφθαι δεῖ. τούτων γὰρ ἀμφοτέρων ἡ
 χεῖρσις ἀναισθητός τε, καὶ μὴ γενομένων, μεγάλην ἔ-
 χει ἀφροσύνην.

OMnia verò quæ adhibentur confi-
 derare oportet vt conferant , po-
 tissimumque, si circa ægram partem diu
 hære debeant. talia verò sunt ligamē-
 ta, pharmaça, lintea circa vulnus , &
 & cataplasmata longissimo enim tem-
 pore hæc in locis affectis permanent. at
 verò horum ablatio, refrigeratio, mun-
 dificatio & aquarum perfusio breuioris
 sunt more animaduertendum etiam cū
 aliquid facere oporteat, plus-ne an mi-
 nus facere expediat. Vtrorumque enim
 horum vsus tempestiuus vel intempesti-
 uus magni est momenti.

AVxilia Chirurgica consistunt vel in Orga-
 nis & instrumentis vel in oblatiis & admo-
 tiis, hoc loco τὰ προσερόμενα, siue oblata, sunt
 auxilia & remedia quæ admoventur partibus
 affectis. Instrumenta in corpus agunt subito &
 violenter, admota verò lentius & mitius. Obla-
 torum quatuor species proponit, fascias, me-
 dicamenta, lintea, cataplasmata, in quibus
 considerandum præcipuè, ne quid temere &
 frustra adhibeatur, cū enim diutius in parte af-

fecta relinquantur etiam absente Chirurgo, plurimum noxæ, & detrimenti possunt afferre si intempestivè admoucantur, ut contra plurimū emolumenti affert tempestivus horum usus.

Ἐστὶ δὲ οὐκ εἴη ἐπίδεσις τῆς ἰητρικῆς, ἀφ' ἧς ὠφελείᾳ τὸν τραυματοῦντα. μέγιστα δὲ ὠφελείᾳ δύο ταῦτα, οἷς ἐστὶ χεῖρτες, πῆσαι ὅκου δεῖ, καὶ ἀντὶ μένους ὀπιδῆσαι. ὥς δὲ τοὺς χεῖρας τῆς ὥρης, πολλὲ δεῖ σκεπαστικῶς καὶ μὴ, σωορην ὅκως μὴ δὲ ἀσθενῇ λεληθῶς πότρω τούτων ἐνιαχὺ χεῖρτες. εὐρύμης δὲ ἐπιδέσις καὶ χεῖρτες, μηδὲν ὠφελύσας ἀπομνάσκειν. Φορτικὸν γὰρ τὸ τοῖστον, καὶ παντελῶς ἀλαζονικόν, πολλάκις τὲ βλάβην οἶσον τῷ τραυματομένῳ. ζητεῖται ὁ νησέων ὁ καλῶπις, ἀλλὰ τὸ συμφέρον.

COnueniens autem Medicinæ deligatio est, ex qua æger auxilium sentit. Maxime verò conferunt hæc duo quibus utendum est, comprimere ubi oportet, & remissè deligare. Secundum autem anni tempora aliquando contegere oportet, aliquando verò minime. Simul etiam animaduerendum ne imbecilliore utaris, cum te lateat vtra deligationis specie alicubi sit utendum. Concinnas autem & ad ostentationem comparatas deligatio-

nes, nihilque iuuantēs reijcito id enim molestum & arrogans, sæpiusque damnum ægrotanti affert. Quærit autem ægrotus non ornatum, Sed auxilium.

Hic de vinculis & fascijs disputat, quantū tyronibus sufficiat. Conueniens autem & Chirurgo digna est deligatio, ex qua æger auxilium sentit, deligationis autem duas species proponit, arctam & laxam, quæ morbis & partibus sunt accommodandæ adiungit duas alias species ex his dependentes, densam & raram est autem densa cū pars contegitur, non solum fascijs, sed aliquando etiam lana succida & panniculis ad muniendum, fulciendum & firmadum, rara autem est ea quæ vincit tantum non contegit. Secundum anni tempora aliquādo contegere oportet partes affectas, aliquando verò minime, Sic Hippocrates quarto libro de articulis sententia 24. quū hybernū tēpus fuerit, lanam succidam vino madentem atque oleo tepido imponit vulneribus articulorum, qui ad pedem sunt, laxatis ossibus tibiæ, ne ob refrigerationem, neruorum distentio superueniat. Et quemadmodum hieme curationem calidiorē admouet, sic contra estate tu frigidiorē admouebis, ait Galenus in commentario huius sententiæ. Cæterū *ἐν ἅλοις* quod in omnibus codicibus legitur, mendosum suspicor, & restituo *ἐν ἰατρῇ*, id est alicubi deligationes verò elegantes & histrionicas, sine

ad spectaculum & ostentationem comparatas repudiat, quando nihil iuuant. Alioquin concinnas & decoras deligationes maximè probat in Chirurgo Hippocrates sententia prima libri secundi de officina medici, nam *εὐρυθμίᾳ* oculos delectat, & auctoritatem etiam Chirurgo apud egrotos conciliat, quod ipsis egrotis utilissimum est, magis enim homines iuvat Chirurgus, ubi apud eos in honore & admiratione est, quandoquidem magis obsequuntur, & iussis eius obediunt non secus ac numinis cuiusdam, duplex autem est *εὐρυθμία* & elegantia vinculi, quùm adhibetur in manuum motu consistit, quùm iam adhibitum est, in ambitu linteolorum. vtraque autem elegantia Chirurgo digna est, propter nobilitatem enim subiecti debet Chirurgus non solum utilitati studere sed etiam elegantiae, vt docet Galenus initio libri de fascijs.

Επὶ δὲ τῇ χειρουργίᾳ ὅσαι διὰ τομῆς εἰσὶν ἢ καύσιος, τὸ ταχέως ἢ βραδέως ὁμοίως ἐπαρνεῖται. χεῖρσι γὰρ ὅστιν ἀμφοτέρων. ἐν οἷς μὲν γὰρ ὅστι διὰ μῆς τομῆς ἢ χειρουργία, χεῖρ ποιεῖται ταχέως τὴν διαίρεσιν. ἐπεὶ γὰρ συμβαίνει τὸς τεμνομένους ποιεῖν, τὸ λυπεῖον μὲν ὡς ἐλάχιστον χεῖρον δεῖ παρῆναι τὸ δὲ ἕτα, ταχέως τῆς τομῆς γενομένης. ὅπου δὲ πολλάς ἀναγκαῖον γενέσθαι τὰς τομὰς, βραδέως χρθεῖον τῇ χειρουργίᾳ, ὁ μὲν γὰρ ταχὺς, ξυνεχῇ ποιεῖ τὸν πόρον καὶ πούλιον, ὁ δὲ ἀλγιστῶν, ἀνίστασθαι ἔχει τινὰ.

τῶν τοῖς ἰεργενομένοις.

IN Chirurgicis operibus quæ per sectionem aut vstionem fiunt, celeritas aut tarditas æque laudatur vtriusque enim necessarius est vsus in quibus enim Chirurgia per vnicam sectionem fit, celeriter secare oportet. Quùm enim contingat eos qui secantur dolere, quod dolorem affert, quam minimo tempore adesse conuenit, hoc autem fiet, si sectio celeriter perficiatur. Vbi verò multæ sectiones requiruntur, lenta Chirurgia vtendum est. Qui enim celer est, continuum multumque dolorem inducit, qui verò intermittit, requiem aliquam ægrotis exhibet.

Qua moderatione vtendum sit in operib. Chirurgicis, quæ per sectionem aut vstionem fiunt, nūc aperit. Aliquando enim celeriter & festinanter peragendæ sunt eiusmodi actiones aliquando verò tardius adurendæ aut secandæ sunt partes affectæ, festinatio nonnunquam periculosa, longaue curationis ratio sine dolore plerumque est. Itaque breuitas vel diurnitas temporis in sectionibus & vstionibus Chirurgus imprimis considerata & obseruanda in quibus morbis vnica sectio aut vstio sufficit, ea celeriter & expeditè perficienda, ne diurni & longi doloris vehementia ægri

gri vires deficient, cum verò plures faciendæ sunt sectiones, aut repetenda sæpius vstio, non vno eodemque tempore debent administrari, sed interposito aliquo temporis spatio, ne multarum operationum continuo dolore conficiatur aeger intermissio enim dolorem minuit & collapsas vires reficit. Quamvis autem diuidantur tempore sectiones aut vstiones, quaelibet tamen celeriter & expeditè fieri debet, atque vbi euitari dolor potest ἀναδύως iucundè & ἀσφαλώς tutò. Ad celeritatem cōfert plurimum promptitudo & praeparatio machinamentorū & instrumentorum, vt disponantur, vbi oportet, ne operam impediunt, nèue longiùs distent, quam vt prehendi possint, sed collocentur iuxta corporis partem, quæ tractatur, quod si ab altero præbeantur, is paulo ante paratus sit, exequatur autem vbi imperaueris. Assistentes vero id quod curatur, eo modo præbere debēt quo traditum fuerit, reliquum vero corpus continere sic, vt immobile præstent, vt docet Hippocrates circa finem libri primi commentariorum de officina medici.

Τὸ δ' αὐτὸ ὅτι τῶν ὀργάνων λέγεται αἱ τοῖς
δὲ μαχαιρίοις ὀξεσι δεῖν χρῆσθαι καὶ πλατέσιν ὅτι
ὅτι πάντων ὁμοίως παραγγέλλομεν, μέρη γὰρ πι-
νὰ ἐστὶ τῷ σωματός, ἀπὸ τὰ χειρὶ μὲν ἔχει τὴν ῥυ-
μην τῷ αἵματός, κατεσχεῖν ἐστὶν ἔρῃδιον, ταῦτα
δὲ ὅστιν, οἷτε χίρσοι, καὶ πινες ἀλλὰ φλέβες. ταῖς μὲν
τομαῖς χρὴ εἶναι τῷ ποιετέων στενάς· ἔγδρ' οἰόντε
τὴν ῥυσιν γενέσθαι κατακορῇ. Συμφέρει δὲ ποτε

ἀπὸ τῆς τοιαύτης αἵματος ἀφαίρεσιν ποιεῖσθαι
 πρὸς δὲ τὰς ἀκινδύνους τόπως, καὶ περὶ ὅς μὴ λε-
 πλόν' ὅτι τὸ αἷμα, πλατυτέροις χρῆσθαι μαχαί-
 ροισι. τὸ γὰρ αἷμα πορεύοιτ' αὖ, ἄλλως δὲ ἔδα-
 ρως. πάντ' ἔστιν αἰσχυρὸς, μὴ συμβαίνειν ἀπὸ τῆς
 χειρὸς ῥήγης ὅ, τι θέλει.

IDem de instrumentis dici potest.
 Gladiolis acutis ac latis vti nō in om-
 nibus similiter præcipimus. Nam partes
 quædam corporis sunt, quæ celerem
 sanguinis fluxum habent, quem sistere
 non est facile cuiusmodi sunt varices, &
 aliæ quædam venæ. Itaque in talibus
 angustas sectiones oportet esse, non
 enim fluxus moderatus esse potest. Cō-
 ducit autem aliquando à talibus sangui-
 nem detrahare. In locis verò non peri-
 culosis, & in quibus non tenuis conti-
 netur sanguis latioribus gladiolis vten-
 dum. Sic enim sanguis prodierit aliter
 nequaquam. Valde autem turpe est,
 consequi ex Chirurgia quod velis.

Non solum breuitas aut diuturnitas tem-
 poris consideranda est in sectionibus aut
 vstionibus humani corporis, sed videndum di-
 ligenter, quibus instrumentis fieri debeant eius-
 modi operationes. Hic exempli gratia gladio-

los proponit. Acutis & angustis utendum est, cum secatur pars, in qua subsunt venæ & arteriæ, ne superueniat sanguinis profusio, quæ non facile supprimi possit. Fiunt autem incisiones latoribus Gladiolis, cum secatur pars in qua nec venæ maiores latent, nec arteriæ: aut cum sanguinem crassum euacuare volumus, qui per angustum foramen, non facile educeretur caeterum *ρύσιν κατακορή*, verti, fluxum moderatum, quum tantum sanguinis effluit, quantum satis est ad satietatem & voluntatem Chirurghi, profusio autem sanguinis moderata esse non potest, cum copiosius fluit, & plusquam par sit profunditur incisio latiore Gladiolo varicibus aut arterijs.

Σκύων δὴ δύο προπίδες εἶναι χρησίμους, ὅτε μὲν γὰρ ῥεύμα ξυνεστηκὸς πόρρω τῆς ἐπιφαινομένης σαρκός, τὸν μὲν κύκλον αὐτῆς εἶναι δεῖ βραχίλιον αὐτῷ δὲ μὴ γαστρώδι, προμήκη τὸ πρὸς τῇ χειρὶ μέρος, μὴ βαρεῖαν, τοιαύτην γὰρ ἔσσαν. ἔλκειν ἐς ἑαυτὸν συμβαίνει, καὶ τὰς ἀφεστώσας ἰχῶρας καλῶς ἀνεσπᾶσαι πρὸς τῇ σάρκι. τὰ δὲ πύλας πλείονος κατεσκεδασμένους τῆς σαρκός, τὰ μὲν ἄλλα παραπλησίην, τὸν δὲ κύκλον μέγαν, ἔτι γὰρ ἐκ πλείονων μερῶν εὐρήσας ἀγασσάν ἐς ὃν δεῖ τὸ λυποῦν τόπον. ὃ γὰρ οἰοῦνται μέγαν εἶναι τὸν κύκλον, μὴ συναρτημένης τῆς σαρκός ἐκ πλείονος τόπου. Βαρεῖα δ' ἔσσαν ῥέψα καὶ ἐς τὰς ἄνω τόπους, κάτω δὲ μάλλον τῇ ἀφαίρεσιν, καὶ πολλάκις ὑπολείπεσθαι ταῖς νόσους τοῖσι μὲν οὖν ἐφεσῶσι ρεύμασιν, καὶ μα-

κραν ἀπέχουσιν ἀπὸ τῆς ἀνω τόπων, οἱ πλα-
τεῖς κύκλοι πολλὰ ξυνεπισπῶνται παρὰ τῆς ἄλ-
λης σαρκός. ἐπιπροσθῆν ὅν ξυμβαίνει τι εἰτεῦ-
θεν, εἰλκομένῳ νοτίδα τῷ ξυναρμένῳ κάτωθεν
ἰχθῶς, καὶ τὰ μὲν εἰσὶν χλεῖστα ὑπολείπεσθαι τὰ
δ' ὅθεν λυπέοντα ἀφαιρεῖσθαι. μέγεθος δὲ σικύης
τὶ χεῖριστον σοχάζεσθαι χεῖρ πρὸς τὰ μέρη τῆς σά-
ματος, οἷς ἂν δέη προσβάλλειν.

Cucurbitularum verò modi com-
modi sunt, quando enim fluxus
procul ab extima carne fuerit impactus
circulum cucurbitulæ angustum esse
conuenit ipsamque non ventrosam, sed
oblongam parte ad manum vergēte ne-
que grauem quæ enim talis est, in dire-
ctum trahere solet, & serosos humores
procul distantes probè ad carnem attra-
here. Quum autem dolor plurimus per
carnem dispersus est, in reliquis quidē
confinilem cucurbitulam esse oportet
sed circulum magnum, Sic enim ex plu-
rimis partibus id quod dolorem facit,
educere comperies ad locum conue-
nientem nemo enim magnum circu-
lum esse putat, si non ex ampliore loco
caro comprehendatur. Si verò grauis sit
pondere suo partes superiores premet,

& ad subiectas potius detractionem repellet, sæpiusque morbos relinquet intactos. Fluxionibus autem imminenti-
bus & longè distantibus à carnis superficie, lati circuli multum ex vicina carne simul attrahunt. Contingit igitur humiditatem inde detractam apponi collecto in profundo seroso humori, & ea quidem quæ infestant, relinqui, quæ verò nullum dolorem afferunt detrahi. Cucurbitulæ porro magnitudinem iuxta corporis partes, quibus imponere oportuerit æstimare conuenit.

INter instrumenta Chirurgica, cucurbitula seu cucurbita medicinalis numeratur, est autem instrumentum concavum quod ad multos usus, cum flamma vel sine flamma corporis partibus imponitur. Cucurbitularum vero duo genera apud veteres fuerunt, aeneum & corneum ænea altera parte patet. altera clausa est. Cornea alter à parte æque patens, altera foramen habet exiguum, in æneam, linamentum ardens conijcitur, ac si os eius corpori aptatur, imprimi-
turque donec inhæreat. Cornea per se corpori imponitur deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est ore spiritus adductus est superque ceracuum id clausum est, æque inhærescit. Vtraque non ex his tantum materiæ generibus, sed ex quolibet alio recte fit. Ex Celso libri secundi capite vndecimo, Alij cucurbitulis utuntur

vitreis, vt sanguinis qui vacuatur mensura in extractione pellucescat, Paulo libri 6. capite 41 Aeneorum apud veteres frequentior erat vsus, nunc vitreis magis vtimur. Corneæ, secundum locum etiam nunc obtinent. Cucurbitularum præcepta tradit, quæ tyroni Chirurgo sunt necessaria, plenior de cucurbitulis, earumque vsu tractationem ad prouectiores in arte pertinentem omittit. Cucurbitularum autem impo-
nendarum duos modos viles proponit, vel enim cucurbitula angustioris partibus aptatur, vel circuli latioris, vtriusque corpus non debet esse ventricosum, sed prolixum & oblongum, vtraque etiam cucurbitula levis sit necesse est, non autem grauis, præterea cum cucurbitulæ partibus subiectis sint adæquandæ, idcirco plurimum inter se magnitudine & paruitate differre debent. Cucurbitula autem oris compressioris humorem altius impactum & procul distantem in directum trahit versus cutis superficiem. Cucurbitula vero quæ habet circulum magnum, siue os amplum & latum adhibetur, cum humor qui morbum facit varijs in locis continetur & dolor plurimus per carnem dispersus est eiusmodi enim cucurbitula multam carnem comprehendis, humoresque dispersos ad locum conuenientem trahit & educit. Levis autem esse debet Cucurbitula, quia grauitas coarctans cutis meatu suo pondere extractionis motum impedit, & in profundum repellit apponitque Seroso humori intus collecto.

Ὅταν δὲ κατακρούην, κάτωθεν δέχεσθαι τὸ
 γὰρ αἷμα φανερόν· εἶναι δὲ τῷ χειρουργοῦ μὲν
 τόπων, ἄλλως δὲ ἔξω τὸν κύκλον τὸν ἐλκυομένον
 καὶ κατακρούην, εὐπαντέρη γὰρ ὅστις ἢ σαρξ τε
 πόνησαντος. μαχαίροις δὲ τοῖς χαμπύλοις, ἐξ
 ἀκροῦ μὴ λίαν φανοῖς ἐνίοτε γὰρ ἰχῶρες ἐρχομένη
 γλίσσοι καὶ σπασμοί, κίνδυνος ἐν ὅσῳ ὑπο-
 στήναι τῇσι τομῇσιν, ὅταν φανῇ τμηθῶσιν.

QUum scarificare voles, ab inferio-
 ribus partibus incipe. Oportet e-
 nim sanguinem partium scalpello con-
 cisarum manifestum esse, neque aliter
 circulum excitatum pertundere conue-
 nit. Caro enim partis dolentis tensa est.
 Gladiolis autem incurvis non admo-
 dum angustis scarificare oportet, ali-
 quando enim ichores lenti & crassi pro-
 fluunt, periculum igitur est ne sub inci-
 sionibus retineantur, si parvæ fuerint &
 angustæ.

Cucurbitula alia levis & simplex est, κοῦρη
 σκῦα græcis, cum imponitur integra cute,
 altera est cum scarificationibus κατὰ χάσματων,
 cum corporibus aptatur cute antè scalpello cō-
 cisa, itaque cucurbitulis scarificationem adne-
 cit, paucisque demonstrat quid tyro chirurgus
 desc scarificationibus præscire debeat. Cum ergo

scarificationis necessarius erit usus, ab inferioribus partibus est initium sumendum. Sic enim interpretor κατωθεν δεχεσθαι plagas profundas facere, vertit Zuingerus. altius plagas adigere & profundiores sectiones facere, interpretatur Fœlius in œconomia Hippocratis, in particulis, κατωθεν, scarificationem subter cucurbitulam adhibere, explicat Cornarius quam versionem probat Mercurialis, Mentem authoris & verborum vim nullus animaduertit, κατωθεν δεχεσθαι, est ab inferiore parte incipere. Sic enim vniuscuiusque partis scarificatæ manifestus est sanguis. Si verò à superioribus incipias scarificationem, sanguis defluens obscurabit eum qui ab inferioribus partibus profluet, nec certo dignoscere poteris, vtrum a parte inferiore concisa defluat sanguis, præterea sanguis à superioribus defluens impediet ne partes inferiores scarificare tutò possis. Antylus consulit scarificationis principium ab infernis partibus sumendum esse, ne sanguis per superficiem decurrens, obscuret eam partem, quæ postea scarificanda venit. Cæterum in scarificationibus non semper altiores & profundiores incisiones requiruntur, sed triplex constituitur à Galeno, lib. 2. ad Glauconem, eiusmodi incisionum differentia, aut enim tenuis & in superficie levis est, aut magna & profunda, aut longitudine & profunditate inter eas media. Quæ in superficie sunt, non attrahunt è longinquo, non reuellunt, non deriuant, sed in summa tantum cute hærentem humorem educunt. altæ vero & longæ plurimum sanguinis exhauriunt. cuius rei oribasius locu-

ples est testis, qui sibi scarificato crure, cum pestilentia laboraret, duas fere sanguinis libras detraxit, è remotissimis etiam partibus effundunt, adeo ut animi deliquium nonnunquam afferat intermediae autem ab his incommodis liberae sunt, quocirca his potius utendum est, cum scarificationis usus inciderit. Ea autem tribus de causis suscipitur, ad reuulsionem, ad deriuationem, ad vacuationem humoris tum toto corpore redundantis, tum in ea parte quae inciditur, impacti. Scarificatio autem, quae reuulsionis gratia instituitur, aut vacuationis è toto corpore, haud temerè in alijs partibus, quam in cruribus usurpata est à veteribus medicis. Circulum etiam per impositam cucurbitulam excitatum scarificabis sumpto initio ab inferiori parte, cum enim caro circuli sit tensa, propter humorem attractum, qui partem distendit, decurret liberius sanguis à parte superiore in decliuem, impedièturque scarificationem loci inferioris, neque dignosces utrum ab inferiore scarificato profluat sanguis. Gladiolos autem ad scarificationem adhibet incuruos, in summo non admodum angustos aut acutos, sed paulo latiores quales sunt scalpri rasorij, ut tenaces & crassi humores profluant, qui in angustis & parvis incisionibus, sub cute hærentes retinerentur. Præterea consulit Antylus scarificationem non $\chi\tau\iota$ $\pi\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}\nu$, ἀλλὰ $\chi\tau\iota$ $\sigma\upsilon\rho\mu\acute{\omicron}\nu$, hoc est non punctim sed cæsim faciendam esse.

Ταὶς δὲ ὅπτι τῷ βραχίονων φλέβας τῇσι κα-
ταλήψοι χεὶρ φυλάσσει. ἢ γὰρ χαλύνουσα

σάρξ πολλοῖς ἔχεται χαλῶς συνήρμοσται τῇ φλεβίτῃς
 γὰρ σαρκὸς ὀλισθηρῆς ὄσης ἔχεται ἑαυταῖς συμ-
 βαίνει τὰς τομαῖς ἀμφοτέρων γίνεσθαι, τίω γὰρ
 φλέβα ἐκφυσᾶσθαι συμβαίνει καλυφθεῖσαν, καὶ
 τίω ῥύσιν τῷ ὁματος κωλύεσθαι, πολλοῖσι δὲ καὶ
 πύος διὰ τῆτο ξυνίστασθαι δοκεῖ δὴ δύο βλάβας
 φέρειν ἢ τοιαύτη χερσὶν, τῷ μὲν τμηθέντι πόνον,
 τῷ δὲ τέμνοντι πολλὴν ἀδοξίαν. τὸ δ' αὐτὸ καὶ
 πασῶν παρήγεται γίνεσθαι· τὰ μὲν ἔν καὶ ἰη-
 τρεῖον ἀναγκαῖα ὄργανα καὶ πρὸς αὐτὰ δὲ τεχνικὸν
 εἶναι τὸν μανθάνοντα, ταῦτ' ὅτιν οὐδοντάζησι γὰρ
 καὶ σταφυλάζησι ζῆσθαι τὸν τυχόντα ὅτιν ἀπλή
 γὰρ ἡ ζῆσις αὐτῶν εἶναι δοκεῖ.

BRachiorum autem venas vinculo
 apprehensas constringere oportet.
 in multis enim caro veniam tegens non
 probe venę coheret, cumq; caro lubrica
 & laxa est, non contingit carnem & ve-
 nam ē directo secari, venam vero con-
 tactam inflari contingit & sanguinis flu-
 xum impediri, multisque ob id, pus etiā
 congregatur videtur autem eiusmodi
 Chirurgia duo mala secum afferre, se-
 cto dolorem secanti verò multam igno-
 miniam. Hoc idem in omnibus venis
 secandis præceptum esto. Hęc igitur
 in taberna Chirurgica instrumenta ne-

cessaria sunt, circa quorum vsum artificiosum esse oportet discipulum vossellis autem dentium & vuarum quilibet vti potest, simplex enim earum vsus esse videtur.

PRæcepta phlebotomiæ proponit quæ tyroni Chirurgo obseruanda sunt, in secandis venis brachiorum & reliqui etiam corporis brachiorum autem venas frequentius tres incidimus, circa cubiti flexuram, nempe *μαχαλιαῖαν*, axillarem, cubiti interiorē, vulgo basilicam; *ωμῶν*, humeralem cubiti superiorem, vulgo cephalicam : & *μέσην* siue mediam. In morbis capitis ac ijs qui supra collum sunt, humeralem incidimus in morbis qui infra ceruicem affligūt axillarem secamus, media vtrisque conuenit.

Albucrasis in reliquo corpore viginti quatuor venas enumerat ex quibus mitti solet sanguis, duas pone aures, vnam in medio frontis, duas circa magnum oculorum canthum, duas in labro superiori, totidem in inferiori, duas sub linguavnam in extremitate nasi, duas iugulares duas in vtraque manu in vtraque tibia, popliteam, Saphenam, & malleoli exteriorem, quæ ischias dicitur, quibus addere potes hæmorrhoidas, quæque ad lienem nigricant, & internas narium venas, quas aliquando vel scalpelli mucrone diuidimus, vel quibusdam asperis irritamus. Quid obseruandum sit in sectione venarum in brachiis paucis ostendit, suadetque vt priusquam sectio fiat, vinculo & fascia partem

constringat, vt vno ictu & carnem & venam
 pertundat, neque solum brachium deligare o-
 portet, sed etiam manu partem confricare dum
 incalescat, vt sanguine pro lecto vena tumen-
 tior in conspectum veniat. Infra etiam illigari
 mos est, quum tremula inconstansque vena ad
 scalpelli quemuis impulsu subterfugit, aut è
 sua sede diffilit. Quibus autem densa cutis est, &
 quibus angustæ venæ, aut in altum demersæ,
 multa carne vel adipe obductæ sunt, iis multo
 arctius vinculum iniici debet, Ligatura etiam sit
 propinqua, quumque ligaueris, & superuenerit
 inflatio, soluto vinculo frictione multa inflatio-
 nem discute, & rursus partem constringe, sed
 prospiciendum diligenter ne flatu tumidum lo-
 cum pro vena pertundas animaduerte etiam se-
 dulo, ne vinculo cutem è suo loco ante sectio-
 nem, aut post eam, dimoueas. Cùm ait venam
 carne obductam inflari, codices græci ἐκφυσά-
 σθαι legunt, quod est expirare, efflare & expuere,
 Cornarius videtur legisse ἐμφυσάσθαι, vertit enim
 inflari. Porro in venis reliqui corporis aperien-
 dis, non idem perpetuo præceptum obseruatur.
 Minores enim pedum manuūque venas, quia
 vinctis non satis implentur, in calentem a-
 quam demittimus, quæ & profluenti sanguini
 impetum facit. Venas etiam linguæ subditas,
 transuersas incidimus, euitantes constrictionem,
 ὀδοντάχνα instrumentum est chirurgicum
 euellendis dentibus idoneum. σκευλάχνα vero
 instrumentum aliud chirurgicum, quo vna flu-
 xione laxior attollitur, aut quo comprehend-

cur ea vix pars quam amputare volumus.

Περὶ δὲ φυμάτων καὶ ἐλκῶν, ὅκοσα μὲζόνων ὄντι νοσημάτων. τὰ μὲν φύματα τεχνικώτατον ὑπὸ ληφέναι, καὶ διυῖασθαι ἀφαιλεῖν, καὶ τὰς συστάσεις αὐτῶν καλύψιν. ἐχρόμνον δὲ τέχνης, τέλλειν εἰς τὸν ὅππασιν τὸ πον, ὡς εἰς βραχύτατον, καὶ πλεονέχουσιν ὁμαλῶς διὰ παντὸς ἐποιοῖσθαι τὸ φύματος. ἀνωμαλῶς γὰρ ἔχοντος αὐτῶ, ῥαγῆναι τε καὶ δυοθεράπευτον τὸν ἔλκος κίνδυνός ὄντι γενέσθαι. ἔξομαλίζῃν τὸ χεῖρον περὶ σὺντα πανομοίως, καὶ μήτε ἀφαιρεῖν ὡς ἕτερον, μήτε αὐτόματον εἰς ῥαγῆναι τὰ δὲ ἐκπέφαι διυῖα μὲν ὁμαλῶς ἐν ἑτέροις εἴρηται.

IN tuberculis autem & vlceribus eadem obseruanda quæ & in alijs grauioribus morbis. Tubercula quidem cohibere & dissoluere posse, eorumque collectiones impedire, maximum artis est opus, proximum est, in apparentem & quam breuissimum locum contrahere, æqualemque collectionem per totum tuberculum facere. Vbi enim inæqualiter se habuerit, periculum est ne rumpatur vlcusque curatu difficile fiat. Ad æquare igitur oportet per totum similiter concoquendo, neque prius aperire, neque sinere vt sponte rumpatur. Quæ vero

30 *Hippocratis de Medicò*
æqualiter concoquere possunt in alijs
libris dicta sunt.

MOrbos chirurgi manum requirentes in
duo genera distribuit, in tubercula nem-
pe & vlcera, ossium fractorum & luxatorum
curationem prætermittens, quod horum præce-
pta, non ad tyrones quos hic instituit, sed ad
prouectos tantum in arte pertineant. *φδμα* apud
medicos multis modis dicitur, vno modo *φδμα*
est inflammatio sponte nascens, quæ celerrime
gignitur, ocysissime in altum & acutum eleuatur,
citissime suppuratur, sæpiusque in alis & ingui-
nibus generatur, commentario in aphoris num.
26. libri tertij. Galeno secundo libro ad Glauco-
nem, Paulo libri quarti capite 22. alitero modo,
phyma dicitur tumor præter naturam sine cau-
sa aliqua externa perueniens, maximè si in cor-
poris superficiem extuberet, cuiusmodi sunt
verrucae, strumæ, & quamplurimi alij tumores
per se in extimis corporis partibus excitati, ex a-
phorismo eodem. Sic apud Celsum libri sexti
capite 18. *φύματα* sunt tubercula quæ circa glan-
dem oriuntur. Tertio modo, phyma, apud eun-
dem Celsum libri quinti capite de phymate &
eius curatione, nominatur tuberculum furun-
culo simile, sed rotundius, & planius, sæpe etiam
maius. Aliquando etiam phyma vocat Hippo-
crates, quod alibi solet *εμπύημα* dicere, com-
mentario in aphorismum 8. libri septimi. Hoc
autem loco, *φδμα* significat omnem tumorem
præter naturam in exteriori corpore partem

præsertim erumpentem, ex quocumque humore, sine causa vlla externa, qui si non inhibeat aut dissoluatur, ad suppurationem spectat. Suadet autem hic author vt tumores eiusmodi fieri prohibeamus, eorumque originem intercipientes, & humorem cum fluere in partem incipit, repellamus, siquid humoris in partem procubuit, dissoluamus, & collectionem humoris fieri prohibeamus. Quod si id consequi non liceat, proximum est, vt materiam ex qua fit tuberculum, è profundo in superficiem attrahamus, inque minimum spatium contrahamus, & ad suppurationem æqualiter perducamus. Cum enim tumores præter naturam curari soleant resolutione, suppuratione, induratione & corruptione, omnium istorum modorum optimus & magis expetendus is est qui per resolutionem fit, post illum vero, qui per suppurationem, que per indurationem fit, permutatio mala est, pessima vero quæ per corruptionem. *hîc ὑπελκφεται* cohibere dixi, id est tumorem originem intercipere, & reprimere. Cornarius deprehendere dixit, *ὑπολαμβάνειν* quidem vtrumque significare potest, mihi tamen magis placet ad tuberculi interceptionem referre, neque enim *τεχνικῶς παύειν* est tuberculum deprehendere & cognoscere. Æqualem collectionem per totum tuberculum facere. & adæquare per totum similiter concoquendo, est æqualiter maturare & suppurare. Genus autem coctionis est suppuratio & in pus conuersio, & medicamenta suppurantia etiam *πυλικά* medicis vocantur. pus etiam optimum

μαλὸν esse debet, prognostico ultimo libri primi. Cum tuberculi materia concocta fuerit & in pus versa, ferramento pars aperienda, ut exitum habeat pus delitescens; non tamen ante maturitatem scalpellum admouere oportet, nisi aut articulis aut principibus partibus vicini sint eiusmodi suppurantes tumores, ne ligamentum, neruus aut simile aliquid assidua putredine pariter contabescat, tunc enim crudi etiam, & priusquam ex toto in pus mutati sint, incidi debent. abscessus etiam ano proximos ante integram concoctionem crudos diffecari præcipit Hippocrates, veritus ne suppuratio ad intestinum perueniat. neque vero eousque suppuratori & maturatori incumbendum, donec sponte rumpantur tubercula, tunc enim fieret vlcus ægrè curabile. Recentiores tamen chirurgi sectionem quam manu molimur, deteriore putant ea apertione, quæ naturæ beneficio accidit, quoniam saniem, sordes aut fistulas generat, quod in paruis tumoribus verum esse potest, non autem in grauioribus de quibus hoc loco agit.

Τὰ δὲ ἔλκεα δοκεῖ πορείας ἔχειν τέσσαρας, μίαν μὲν εἰς βάθος, ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ σφαιρώδη, καὶ ὅσα ὑποὺν ἀέτι, καὶ ἐντοθεν κεκοιλασμένα, ἡ δ' ἑτέρα, εἰς ὕψος, τὰ ὑπερσφαιρεῖται. τρίτη δὲ ἐστὶν εἰς πλάτος, ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ χαλερόμηνε ἐρπητικά. τετάρτη ὁδὸς ἐστὶν ἡ ξύμφυσις, αὕτη δὲ μόνη καὶ φύσιν εἶναι δοκεῖ κήνησις. αὗται μὲν ἐν ξύμφυσι

φορεῖ

φορεῖται τοιαῦται σαρκὸς εἶσιν, πᾶσαι δὲ κεναὶ τῷ
 συμφέροντος. καὶ τὰ μὲν τέττων' ἐν ἑτέροις σημεῖα
 δεδήλωται, καὶ ἡ χρῆσις ὅτιν' ὀπτιμελεία. δι' ὧν
 τὸ συμφυρόμενον ἀφελυθήσεται, καὶ τὸ πηρεύμε-
 νον, ἢ κοῖλον γενόμενον, ἢ τινὲς εἰς πλάτος πορείαν
 ποιεῖμενον, πρὸς ὁριστὸν χρόνον ὡς τῶν ἄλλοις
 εἴρηται.

VLcera verò quatuor modis pro-
 grediuntur, vno in profundum,
 cuiusmodi sunt fistulosa, præsanata, &
 intus caua. Alio modo in altum, in qui-
 bus caro supercrescit. Tertia via est in
 latitudinem, hæc autem vocantur serpi-
 ginosa. Quarta via est agglutinatio,
 hæcque sola videtur esse secundum na-
 turam motus. Eiusmodi ergo carnis
 sunt calamitates actionem partis om-
 nes lædentes, & eorum quidem signa in
 aliis libris sunt exposita, quaque vten-
 dum sit curatione. Per quæ autem quod
 agglutinatum est dissoluatur, vel quod
 repletum, aut cauum redditum est, aut
 quod in latitudinem progreditur, a-
 bunde de his in aliis libris dictum est.

QVid in tuberculis observandum sit propo-
 suit, nunc quæ sint observanda circa vlce-
 ra, demonstrat. ἡ δὲ hic non solum continui

solutionem in carne significant, sed etiam disiuncti continuationem. vlcerum diuisionem rudem, & tyronis oculis obuiam proponit. Vlcera enim omnia progrediuntur vel in profundum, vel in altum, vel in latum, aut in id quod vacuum & disiunctum esse debet. Sic quatuor sunt vlcerum viæ & rudes differentia. prima est eorum vlcerum quæ in profundas partes progrediuntur, cuiusmodi sunt vlcera fistulosa, & ea quæ cicatrice obducta, intus tamen caua sunt. ὑπὸ κυλᾷ præsanata dixi, id est cicatrice obducta ante integram curationem, vel sub cicatrice latentia, & propriè sunt ea vlcera, quæ cum cicatricem obdlexerint, sunt tamen subter purulenta. hic ὑπὸ κυλᾷ & ὑποθὲν κακολασμένα, non sunt vlcera diuisa, sed vnam constituunt vlceris differentiam. falluntur interpretes cum sanie plena vertunt. Secunda vlcerum species, est eorum in quibus caro supercrescit, ὑπερστροφικόν & πληροῦς μόνον dicitur. Tertia vlcerum via in latum spargitur, ad quam referuntur vlcera serpiginosa. Quarta via vlcerum dicitur σύμφωσις agglutination, siue disiunctarum partium vnio, cum vlceris partes. quæ prius diuisæ & disiunctæ fuerant, coniunguntur & vniuntur, sic vlcerati digiti per carnem superuenientem concresecunt, sic etiam anus, vterus, præputium coalescere possunt, & hæc species videtur esse motus secundum naturam, cum omnis solutio continui vnitatem requirere videatur, est tamen præter naturam, & actionem partis lædit. Hic locus subobscurus erat, sed restituta dictio σύμφωσις clarissimum reddit: esse autem intelligendam

particulam illam manifestè apparet ex repetitione quam statim subiungit; cùm enim κοῖλοι ad primam vlceris differentiam referatur, πληθύμενον ad secundam. & πριούμενον πλὺ πορείαν εἰς πλάτος ad tertiam, necessariò τὸ ἑυμφερόμενον quartam constituet vlcerum differentiam. Legunt hîc etiam omnes codices, πᾶσαι δὲ καὶ τῆ ἑυμφέροντος, sine manifesto sensu, nos καὶ legendum putamus, vt sit sensus, omnes hæ carnis calamitates, eius quod iuvat sunt expertes & inanes, quia partis actionem lædunt. Sed vtriusque huius loci restitutio doctissimo Zuïngero debetur, qui Hippocraticæ doctrinæ obscuritatem clarissimis commentariis plurimum illustravit.

Περὶ δὲ κατὰ πλάσματος ὧδε. τῶν ἐπιτετριμένων ὀθονίων ὅκτις ἂν ἡχῆσις χτ' τῷ νοσέματι ἀκρίβης εἶναι δοκέη, καὶ τῷ ἔλκει ἀρμοζου τὸ ὀπιτηρέμενον ὀθόνιον, τῷ δὲ κατὰ πλάσματι πρὸς τὸν κύκλῳ τόπον ἔλκεος χεῖν. Χρήσις γὰρ αὕτη κατὰ πλάσματος ἐντεχνός τε καὶ πλείστα ὠφελεῖν δυναμένη ἐδόκει γὰρ τῷ μὲν ἔλκει βοηθεῖν ἢ τῶν πεπιτητεμένων δύναμις, τὸ δ' ὀθόνιον φυλάσσειν, καὶ δ' ἔξω μὲν τῷ ἔλκει, τὸ κατὰ πλάσμα ὠφελεῖ. τὴν μὲν οὖν χεῖσιν αὐτέων εἶναι δεῖ τοιαύτην. περὶ δὲ χειρῶν, ὅκτις τοῖς ἐκείτοις χεῖσιν ὅστις, καὶ τὰς δυνάμεις ὡς καὶ τῶν γεγραμμένων κατὰ μανθάνειν, παραλείπειν δὲ τὰ τοιαῦτα, ἐπεὶ πλείον

προηλθα τῆς κατ' ἰατρικὴν ἐπιμελείας, καὶ
πρότερον τῆς τέχνης ἤδη προσεληλυτός ἐστιν.

DE cataplasmatibus autem sic statuen-
dum, ubicumque linteorum im-
positorum usus in morbo exquisitus esse
videtur, ipsi quidem ulceri accommo-
dato linteum quod imponitur, cataplas-
mate verò in circumpositis ulceris parti-
bus utitur, hic enim cataplasmatibus usus
& artificiosus est, plurimumque pro-
desse potest. Videtur autem vis eorum
quæ circumponuntur, ulceri conferre,
lintheum quidem conseruat, cataplasma
vero circumpositas ulceris partes iuuat.
Eiusmodi igitur eorum usum esse oportet.
De temporibus vero, quando sin-
gulis istis utendum sit, & quomodo eo-
rum quæ scripta sunt facultates discere
oporteat, nunc relinquimus, quoniam
maior in arte requirunt industriam,
eiusque propria sunt, qui magnum iam
in arte fecerit progressum.

Q Vis sit legitimus linteorum & cataplas-
matum usus in ulceribus nunc aperit, sub
lintheis continetur & spongia: usus autem spon-
giæ & linteorum est ad vlcus detergendum &
desiccandum. spongia verò debet esse densa,

mollis, incisa, sicciior quàm humidior, ex sententia octaua libri de vulneribus: linteum verò siccum & purum esse debet, ex sententia vndecima eiusdem libri, sed addit Galenus libro quarto $\chi\tau\iota$ ῥῆν, μαλακόν, molle, & præterea λεπτόν tenue, ex sententia 24. libri eiusdem de vulneribus. Cataplasma verò de quo nunc loquitur, suppurans est leniens aut emolliens, quod non vlceri, imponit, sed circumpositis partibus. Sic sententia quinta & decima nona libri de vulneribus, cùm cataplasmatibus vsus necessarius videtur, non ipsum vulnus cataplasmate oportet nutrire, sed vicinas partes, vt pus effluat, & dura emollian-
tur. Linteorum verò vsus vlceribus opportunus est, antequàm medicamenta imponamus, vt sanguinem, vitiosum humorem, aut sordes siccemus, absorbeamus, aut extergamus, hæc enim quandiu in vlceribus retinentur, non mediocriter partem offendunt, & medicamenti vires retrundunt. Sic sententia vndecima libri de vulneribus, medicamenta prius imponere non oportet, quàm vulnus siccum planè reddideris, tunc autem apponere conuenit, sed sæpius spongia vulnus detergendum est, sæpius item admouendum linteum siccum & purum. præterea, linteum non solum vulnus contegit, sed etiam conseruat, ne mordicetur à cataplasmate vicinis partibus imposito.

Ε'χόμενον δὲ τοῦτων ὅτι καὶ $\chi\tau\iota$ φρατίλω νομέων τραυμάτων χειρουργίη, περὶ τὴν ἐξαιρέσιν τῶν βελείων. ὃν τῆσι $\chi\tau\iota$ πάλιν διατει-


Ἔῃσι βραχέα τίς ἐστὶν τούτων ἢ χεῖροις. ὀλί-
γάκις γάρ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ γίνονται πολιτι-
κὴ στρατιὰ καὶ πολεμικὴ. Συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦ-
τα πλεῖστάκις καὶ συνεχέστατα περὶ τὰς ξενικὰς
στρατίας γίνεσθαι. τὸν μὲ οὖν μέλλοντα χειρουργεῖν,
στρατεύεσθαι δεῖ, καὶ παρηκολούθησθαι
στρατεύμασι ξενικοῖς, οὕτω γὰρ ἂν εἴη γεγυμ-
νασμένος πρὸς αὐτοῖς τιῷ χρόνῳ. ὁ δὲ εἶναι
δοκεῖ περὶ ταῦτα τεχνικώτερον, εἰρηάζει. τῶν
γὰρ ὀπλῶν ἐνόντων καὶ σημεῖα πεποείσθαι τέχ-
νης ἐστὶ πλεῖστον μέρος, καὶ τῆς πρὸς αὐτὰ χει-
ρουργίας. τούτου γὰρ ὑπάρξαντος, οὐκ ἂν πα-
ραλίποισι τραυματίας ἀγνοηθεῖς, ὅταν χειρουργῇται
μὴ προσηκόντως. μόνος δ' ἂν ὁ τῶν ση-
μείων ἔμπειρος εἰκότως ἐπιχειρεῖν. περὶ δὲ τού-
των ἀπαντῶν ἐν ἑτέροις γεγραμμένον ἐστίν.

HIs consequens est vulnerum in mi-
litia acceptorum chirurgia, de te-
lis ē corpore extrahendis. In vrbanis
quidem couersationibus exiguus & ra-
rus est horum vsus. Rarò enim per omne
tempus ciuilia & hostilia bella contin-
gunt. Sæpissimè autem & frequentissi-
mè circa externas militias hæc solent
euenire. Qui ergo chirurgia vti volet,
in militiam concedere oportet, & sequi
externa bella. Sic enim ad eiusmodi

necessitatē vsum sibi comparabit. Quod verò circa hæc magis artificiosum esse videatur, dicere conuenit. Signa enim in promptu habere telorum infixorum, artis maxima pars est, & chirurgiæ quæ circa hæc versatur. Vbi enim hoc cognitum fuerit, nullus erit dubitandi locus, vtrum vulneratus rectè necne curetur. Solus autem signorum peritus, curationem rectè aggredietur. Sed de his omnibus in aliis libris dictum est.

Chirurgiæ partem telis extrahendis dicam. tam tyroni Chirurgo necessariam putat, ideoque consulit vt militet Chirurgus & bella sequatur, si velit vulnerum à telis inflictorum cognitionem assequi, & curationem aggredi. Chirurgo autem in vrbibus degenti non ita necessaria videtur hæc Chirurgia, quæ versatur circa telorum extractionem, quia raræ sunt in vrbibus ciuiles seditiones, aut obsidiones hostiles. Cognitio autem vulnerum eiusmodi imprimis artificiosa est, Comparaturque frequenti inspectione. considerandæ sunt autem telorum differentiæ, obseruandæ & explorandæ diligenter partes & sedes in quas illa penetrarunt, ex his enim duobus, difficultates curationis & extractionis dependent. Telorum differentiæ sumuntur à materia, quatenus sunt lignea, ferrea, ærea, cornea, ossea, vitrea; à figura, quatenus sunt rotunda, triangula, trifulca, cuspides habentia in

anteriora, vel in posteriora spectantes; a magnitudine, quatenus sunt magna, parua, media; a numero, alia sunt simplicia, alia composita, tenuia enim ferramenta ipsis imponuntur, quæ in teli extractione in imo delitescent. Ab habitu, quatenus alia ferrum acutum ligno habent insitum, alia concavum, & quædam firmiter ligno infixæ sunt, quædam negligentius, ut in extractione separata intus remaneant. Viribus denique tela differunt, quatenus quædam veneno sunt oblita, quædam verò non. Partium verò vulneratarum agnitio non est difficilis, ut quæ ex accidentium & symptomatum proprietate, excrementis & situ facile possit inueniri. Vbi telorum differentia, partesque vulneratæ fuerint cognitæ, facile fuerit de curatione statuere, & vtrum telorum extractio fieri debeat *κατ' ἐφευκτοῦ ἢ κατ' ἀνωκτοῦ*, euisione aut propulsione, id est vtrum extrahi debeat telum, ab ea parte, qua venit, aut ab ea in quam tendit. Periculum etiam prædici potest, & difficilis curatio prænunciari, aut promptior promitti. Itaque signorum peritus curationem rectè aggreditur, & calumniæ occasione idiotis nunquam præbet. Sed hæc tyroni Chirurgo non conueniunt, cuius institutionem rudem proponit hoc libro. his ergo dilatis, synceram veramque Chirurgiam ab Hippocrate veritatis Philosophicæ & Medicinæ parente iam discere incipiamus.



IN LIBRUM
HIPPOCRATIS
ΠΕΡΙ ΕΛΚΩΝ,

PRÆFATIO.



*Hirurgiam vetustissimam Medicina
partem Hippocrates Cens vir arte &
facundia insignis, parens omnis Medi-
cina plurimum excoluit & exornavit.
Cum enim Chirurgia tunc vulneryum, Vlceryum-
que, osium etiam luxatorum, fractorumque cura-
tiones sibi vendicaret, horum omnium curandorum
methodum breuem & exactam proposuit, plurimis-
que voluminibus comprehendit. Hocque libello vul-
nerum, vlceryumque curationem artificiosa metho-
do complectitur. Hippocrates autem, ut ait Galenus si-
cuto libro Therapentica methodi, salutarium prae-
ceptorum semina tantum prabet, quae postulant non
malos agricolas, qui ea tum semineant commodè,
tum augant & perficiant. Itaque si quis ex Hippo-
cratis lectione velit fructum consequi, eius mentem
altius exploret. Nam ut ait Seneca, leuium metal-
lorum fructus in summo est, illa opulentissima sunt,
quorum in alto latet Vena, assidue plenius respon-
sura fodienti. Aquam etiam maris in imo dulcio-
rem aiunt, quam in summo, Itaque ad imum de-
scendat, si quis Hippocratem velit intueri. Hic au-
tem liber Hippocratis legitimus est, quod ex*

ὁ τῆς elegantia, necnon ex rerum gravitate
 ὁ veritate colligere licet, imprimisque ex auctori-
 tate Galeni, qui plurimis in locis, ὁ potissimum li-
 bro quarto Therapētica methodi, sententias multas
 ex hoc libello depromptas affert. libro etiam tertio de
 fracturis commentario in sententiam 3. ea qua scire
 oportet illum, qui recte vulnera curaturus sit, abun-
 de in expositione libelli de vulneribus se proposuisse
 testatur. meminit etiam expositionis in libellum αὐτῷ
 ἐλκεῶν libro quarto de articulis commentario in senten-
 tiam 23. Inscribitur autem hic liber αὐτῷ ἐλκεῶν, de
 vulneribus aut ulceribus. Nam ἕλκος apud Hippo-
 cratem ὁ vulnus ὁ vlcus significat. ὁ ἕλκος di-
 citur ἢ συνέχειας λύσις καὶ τὰ ὀδονόδη πάντα, unita-
 tis solutio in parte carnosa. Latius tamen patet ali-
 quando nomen ἕλκος, ut commentario tertio de fra-
 cturis, sententia 34. cum ait Hippocrates πάντα τὰ
 νοσήματα ἕλκεα εἶναι, omnes morbos esse vlcera.
 Apud latinos aliquando distinguuntur vlcus ὁ
 vulnus. Nam vlcus dicitur solutio continui in par-
 te carnosa fœda ὁ impura, sapius à causa interna
 excitata. Vulnus verò siue plaga est solutio continui
 in carne, à causa externa ὁ euidente orta. Hoc au-
 tem libello pleniore notione nomen ἕλκος comprehen-
 dit solutionem continui in carne, quam causa inter-
 na siue externa excitauit.



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ἐλκῶν.

Hippocratis de vulneribus.

Λέκεα ξύμπαντα ἔχου τεύχειν, πλεον
οἶνω, ἢ ἢ μὴ ἐν ἀρτῶν εἴη τὸ ἐλκος,
τὸ γὰρ ξηρὸν ἔσθ' υἱέος ἐγγυτέρω ὅστι,
καὶ τὸ ὑγρὸν ἔσθ' μὴ υἱέος, τὸ γὰρ ἐλκος ὑγρὸν ὅστι,
τὸ δὲ υἱέος, ξηρὸν.

Vulnera uniuersa madefacere non
oportet, nisi vino, si modo in arti-
culis non sit vulnus. Nam siccum sano
propius est, humidum non sano, vulnus
enim humidum est, sanum verò siccum.

O Prima medendi methodus primùm de
simplicibus seorsum præcepta tradit, tum
dum de compositis. Sic Hippocrates pri-
mùm proponit vulneris simplicis & solius cura-
tionem. Est autem vulnus aliud simplex & so-
lum, aliud verò compositum. Simplex & solum
vulnus est sola continui solutio, siue ea summæ

est cuticulæ, quam *ἐπιδερμίδα* vocant, siue cutis totius, siue etiam pariter subiectæ carnis, quæ nullum habet alium affectum adiunctum, neque enim particula vulnerata fluxione vexatur, aut malo succo abundat, aut intemperie laborat, nec vlla adest cavititas, nullæve cutis amissio. Vulnus autem compositum, est quod aut causam adiunctam habet, aut alium affectum, aut aliquod symptoma. Vulneris ergo quæ vulnus est, curatio, mediocris siccatio est, & vulnus quatenus vulnus ex siccationem requirit. Cuius præcepti rationem reddit Hippocrates, quod sic cum ad sanum propius accedit, humidum ad non sanum & morbosum, & vulnus quatenus vulnus humido excremento abundat, integra vero & sana caro, non humida sed sicca tangentibus apparet. ut ergo vulnus sanetur & sicceatur, madefacere non oportet, nisi vino. Vinum enim vulneris quæ vulnus est, optimum est medicamentum. omne profecto vulnus tum siccaridebet, tum astringi, Galeno tertio libro Therapeut. methodi, cap. 4. vinum autem nigrum & austerum, quod hîc intelligit Hippocrates, tum per se, tum ex accidenti desiccat, habet enim vim & naturam desiccandi per se, & dum astringit, humores qui iam recepti sunt, repellit, & eos qui influunt, coercet, sicque vulnus siccius redditur. Præterea cum simplex vulnus postulet agglutinari, optimum *κολλητικόν* est vinum. Cum enim sit austerum & astringens, coniungit & vnit diuisas partes, ut in pristinam unitatem reducantur. Vinum tamen tenuium partium, quale est album, flavum aut rufum, inutiliter adhi-

betur, ait Galenus tertio libro de fracturis commentario in sententiam 21. vino ergo nigro & austero vulnera quælibet madefacere oportet. Ex hoc loco fallax empiricorum quorundam curatio refelli potest, qui linteis aqua frigida madefactis vulnera curant. Cuius opinionis vetustissimus author est Cornelius Celsus, qui libro quinto, cum agit de glutinatione vulnerum, sic scribit, Levis plaga iuuatur, si ex aqua frigida expressa sponsia imponitur, licetque sine peregrinis, conquisitis & compositis medicamentis vulnus curare. verum cum frigidum sit vulneribus mordax, cumque vulnus siccari postulet, necesse est aquæ frigidæ vsum vulneribus esse alienum & inimicum. Itaque rectè præcipit Galenus 2. capite libri quarti therapeuticæ methodi, ut aqua nullatenus vulneribus adhibeatur, imo si lauandum vulnus videatur, vinum, aut posca, aut decoctum austeræ cuiusdam herbæ præparandum. Nee minus ridiculum recentiorum empiricorum remedium, qui ex astacorum fluuiatilium puluere cum aliis quibusdam simplicibus decoctum parant cum vino albo, aut aqua vitæ, eoque vulnera quæuis sine temporum obseruatione, sine corporum distinctione abluunt, eoque solo remedio sanare se posse affirmant, ut vno collyrio omnes oculos, sed illi καὶ παροιμίαν, ἐνὶ καλόπιδι πάντας ὑπερδύοισι. Si quis autem obijciat contra hanc Hippocratis sententiam, vulnera. & vlcera aliquando aqua calida aut tepida humectari, ut etiam præcipit Galenus libro quarto Therapeuticæ methodi capite 2. In vlceribus, inquit, si carnis intemperies squallens, sic-

caque videtur, aqua temperata fouens, humectansque corriges. hîc vulneris simplicis curationem proponit Hippocrates, Galenus verò intemperiei correctionem tradit, quæ tamen vulneris ipsius curationem præcedere debet, neque enim vulnus agglutinari potest, nisi subiecta caro naturale temperamentum habeat. Adiungit author, vulnera quæ sunt in articulis non solo vino esse humectanda. per articulum intelligit aliquando Hippocrates id ex ossibus quæ inter se committuntur, quod in cauo recipitur, id est ossis caput, vt docet Galenus commentario in sententiam 52. lib. 3. de fracturis, & commentario in sententiam 1. lib. 1. de articulis, vel vt ait libello de ossibus, *Ἀρσπον* ab Hippocrate frequenter nuncupatur alterius coherentium ossium finis rotundus, in ossis propinqui cavitatem insertus. hoc tamen loco nomen *Ἀρσπον* vel articuli pro naturali ossium syntaxi sumitur. Cur autem vulnus quod est in articulis solo vino non madefaciat, docet Galenus commentario in sententiam 20. 21. 22. 23. & 24. libri quarti de articulis. Hippocrates enim vulneribus articulorum admouet ceratum tepidum quod picem habeat, cum paucis pannis ex vino madentibus, non valde frigidis, folia etiam betæ vel tussilaginis, vel cuiuspiam alterius talis in vino nigro austero semicocta imponit vulneri & vicinis partibus. Quod si hybernum tempus fuerit, lanam quoque succidam madentē ex vino atque oleo tepido superponit, & perfusione desuper vritur. Hæc autē omnia non adhibet vulneri vt vulnus est, sed quatenus neruorum distentionē

timet, quam in nervosis partibus dolor & frigus afferre solent. & nervosæ partes si neque refrigeratione, neque dolore tententur, nervorum distentione præhendi minimè possunt, ait Galenus ibidem. Quàm inimicum sit nervorum vulneribus frigidum, docet idem Galenus initio lib. 3. καὶ ὡς, exemplumque affert cuiusdam vulnerati, qui cùm diem quartam citra dolorem ageret, partemque affectam absque phlegmone videret, tempore frigidioris domo egressus ad opus quoddam necessarium, eique diu immoratus, domum rediit, membro uniuerso ad cervicem usque tenso, idque cum ingenti ipsius dolore, Galenus oleum ex itinere refrigeratum auferri iussit, & totum membrum oleo calente fouit, deinde cervicis partem aduersam lanis oleo respersis, & medicamento liquido ex euphorbio simul cum castoreo, sicque omnia symptomata cessarunt. Hippocrates præterea sententia 15. lib. secundi de fracturis, vult in omnibus qui circa articulos sunt affectibus liberaliter aquam calidam esse perfundendam, & Galenus in commentario ait, quùm leniendus dolor est, tunc multa aqua calida locus perfundatur. Quibus ex locis facile est cognoscere, cur vulnus quod est in articulis, vino solo madefacere non oporteat. Memineris etiam vulnera capitis cum fractura nulla re madefacere oportere, ne vino quidem. libro περὶ τῆς ἐν κεφαλῇ τραύματος.

Ἀνεπίδετον δὲ εἶναι ἀμεινόν ἐστιν, ὅτι γὰρ κατὰ πλάσσειν οὐδὲ κατὰ πλάσσειν εἰς δέχο-

μενόν ἐστίνενία τῶν ἐλκείων , μάλλον δὲ τὰ νεώ-
 τερά τῶν παλαιότερων, καὶ τὰ ἐν τοῖσιν ἄρθροῖσιν.

EXpedit fasciā non deligare vulnus,
 quod cataplasma non recipit. Quæ-
 dam enim vulnera cataplasma ferre non
 possunt , potiusque recentia , quàm ve-
 tustiora , eaque etiam quæ sunt in arti-
 culis.

IN vulneribus quibus cataplasma non admo-
 uetur , vinculi etiam vsum reiicit Hippocra-
 tes , cuius rei causa manifesta & perspicua erit, si
 cataplasmatiss & vinculi vsum & effectum con-
 sideremus. Cataplasma enim medicamentum
 est molle & consistentia mediocre , quod varias
 vires & diuersos habet vsus. Sæpius enim ad re-
 laxandum & leniendum dolorem aut pus mo-
 uendum adhibetur , parabatur veteribus ex fari-
 na triticea aqua & oleo, secundo libro ad Glau-
 conem , & quarto libro therapeuticae methodi.
 Vinculum autem ea de causa adhibetur, vt con-
 tinendo subseruiat curantibus præsidiis , aliud
 non propter hoc , sed vt ipsum per se agat , ait
 Galenus libro de fasciis. quod ab Hippocrate
 prius sic explicatum fuit, sententia quarta, com-
 mentarij secundi de officina medici. Vinculum
 aliud per se remedio est , aliud iis quæ remedio
 sunt, subseruit. Ex his sic colligere possumus.
 Cum vulnus siccare & agglutinari debeat, cata-
 plasma merito non recipit, quod humectandi &
 relaxan

relaxandi vim habet, cumque vinculum ad-
moueri soleat, vt cataplasma contineat, vbi cata-
plasmati locus non datur, neque etiam vinculo
& fasciis. In fine secundi libri de articulis docet
Hippocrates cur vinculum & cataplasma in fra-
ctura auris non conueniant. Vinculum, ait, ini-
micum est, quòd auris sub vinculo astricta dolet;
pulsu vexatur & inflammatione. Cataplasma
etiam alienum est, quoniam abscessum conci-
tat, & muccos plurimos, suppurationemque in-
festam reddit. Quæ omnia etiam simplici & re-
centi vulnere rectè possunt accommodari. Cæ-
terum nō omnibus vulneribus cataplasma alie-
num dicit, sed quibusdam, vt recentibus & arti-
culorum vulneribus. Recentibus quidem &
simplicibus quia exsiccationem requirunt. Ar-
ticulis autem quia cum sicciores sint partes, sic-
ciores etiam curationē requirunt. vulnus etiam
capitis cataplasmatē curari negat libro *ἢ κεφαλῇ πρῶματων*, & aurem etiam vulneratam
non posse ferre cataplasma dicit Hippocrates li-
bro secundo de articulis. Vulnera tamen vetu-
stiora inflammatione nonnunquam tentantur;
ideoque cataplasmatē sunt nutrienda, ad dolo-
rem sedandum vel pus mouendum, hūcque per
πάλαιότερα potest intelligere ea quæ ad tertium
vel quartum diem peruenerunt; in summa enim
vulnera plerumque tertio & quarto die recru-
descunt, ait Hippocrates 3. libro de fracturis,
sententia 33. vel ea vulnera quæ decimum diem
attigerunt, sic in curatione fracturarum minus
cibi sumendum esse dicit vsque ad decimū diem,
circa finem libri primi de fracturis: vel potius ea

quæ ad septimum diem peruenerunt, intra quod tempus vulnerati vt plurimum securi esse solent ab inflammatione & febre. Vulnera etiam contusa cataplasma recipiunt, vt quàm celerrimè pus moueatur, vt paulo post docebit. Vulnera etiam frontis cataplasmate indigent, vt videre licet sententia 28. libri de vulneribus capitis.

Ο ληροσιτέειν τὲ ὡς μάλιστα, καὶ ὕδωρ συμ-
φέρει πᾶσι τοῖσι ἔλκεσι, μᾶλλον δὲ τοῖσι νεω-
τέροις τῶν παλαιωτέρων, καὶ ὅ,τι ἄλλο φλεγμαί-
νει ἔλκος, ἢ μελλεῖ. καὶ ὅ,τι σφακελίσαι κίνδυνος,
καὶ τοῖσιν ἔλκεσι καὶ φλέγμασι τοῖσιν ἐν τοῖσιν,
ἄρθροισι, καὶ ὅκου ἀσασμὸς γένεσθαι κίνδυνος,
καὶ τοῖσιν ἐν κοιλίῃ τρώμασι, πάντων δὲ μάλι-
στα τοῖσιν ἐν κεφαλῇ, καὶ μηρῷ κατεργασί, καὶ
ἄλλω ὧ κατὰ τῆς γένιται.

Abstinere acibo quantum vires pa-
tiuntur, & aquam bibere, cunctis
vulneribus prodest, magisque recentio-
ribus quàm vetustioribus, tumque cum
vulnus inflammatum est, aut inflamma-
tio timetur, cumque periculum corru-
ptionis imminet, vulneribus etiam &
inflammationibus articulorum, & cum
metus instat conuulsionis, nec non vul-
neribus in ventre, maximè vero om-
nium fracturis in capite ac femore.

& cuicumque alteri parti fractura contigerit.

Vulnus nullum madefacere oportet, sed potius exsiccare, cum siccum sano vicinius sit. Itaque cum humores corporis vulnus humectent, vniuersum corpus abstinencia & inedia est desiccandum, ne copia succorum ad locum affectum transmissa, vulnus reddat humidius, eoque nomine glutinationem impediat. Vulnerata pars non solum reinediis admotis est desiccanda, sed medicamentis etiam aluum ducentibus materia, quæ ad locum affectum concurrit, est exhaurienda, sed quia frequentibus medicamentorum potionibus ægri vires conuelluntur, & ex imbecillitate summum periculum est, tutius est abstinencia materiam superantem minuere, quæ naturaliter digeritur, vbi nihil noui alimenti accedit. Itaque optimum medicamentum est, cibus oportunè datus, sicque vulneratus abstinendus à cibo primis diebus est. nihil autem horum vtrique perpetuum est. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale cœlum, quæ ætas, quod tempus anni, minimèque in rebus multum inter se differentibus quod intermittendum non est, perpetuum esse præceptum temporis potest. In morbo qui plus virium auferit, celerius cibus dandus est, itemque ex cœlo, quo magis digerit: ob quam causam in Africa nullo die æger abstinere recte videtur. maturius etiam puero, quam iuueni: æstate quam hyeme dari debet. Vnum illud est, semper quod vbiq; seruandum est, vt ægri vires subinde af-

fidens medicus inspiciat, & quandiu supererunt,
 abstinencia pugnet, si imbecillitatem vereri cœ-
 perit, cibo subueniat. id enim eius officium est,
 ut ægrum neque superuacua materia oneret, ne-
 que imbecillitatem fame prodat. ait Celsus libri
 tertij capite quarto. Multi etiam ex profluio
 sanguinis intermorientes, ante ullam curatio-
 nem, vino reficiendi sunt, quod alioqui inimi-
 cissimum vulneri est, idem Celsus libro quinto.
 Recenset hîc Hippocrates, quibus in vulneribus
 conueniens sit tenuis & exquisitus victus, cæte-
 ras vero circumstantias iudicio medici relin-
 quit. Triplex autem victus ratio vulneribus &
 fracturis ab Hippocrate præscribitur circa finem
 primi libri commentariorum de fracturis, vna
 est accurata, exquisita siue tenuis quam *σκηδραν* &
ἀκρις vocat, altera est vulgaris simplex & quæ-
 libet, quam *φάλλω* & *ἀπλῶ* & *ἐπιπυχοδραν* nomi-
 nat. Tertia est subvulgaris, mediocris inter sim-
 plicem & exquisitam media, quæ Hippocrati
ὑπερφάλλω dicitur, Galenus *μετρίω* exponit. Ex-
 quisitam victus rationem imperat ijs, quibus
 præter ossis fracturam, carnis quoque vulnus
 accessit. Simplicem ijs, qui omnino periculo va-
 cant, mediam victus rationē indicit ijs qui medijs
 sunt inter eos qui periculo vacāt, & eos qui peri-
 clitantur. Exquisita victus ratio est cū solo ptissa-
 næ cremore & mulsæ viuit æger. Victus simplex
 & vulgaris est cū æger carnē edit, & vinū potat.
 Victus inter vtrumque medius est, cum æger as-
 sumit opsonia mollia, quæcūque modice aluum
 deijciunt, ptissanam videlicet, betam, maluam,
 atriplicem, siue blitum, cucurbitam, & pisces te-

neros. ex sententia Hippocratis & Galeni circa finem cōmentarij primi de fracturis. Paucusita- que cibus & aquæ potio vulneribus cūctis ma- ximè prodest, & ex sententia authoris libri *πεὶ παθόν*, oportet *τὸς τραυματίας λιμερτέειν*, vulne- ratos fame macerare. Victus autem iste tenuis & exquisitus quamvis vulneribus omnibus pluri- mum conferat, magis tamen quibusdam con- uenit, quæ deinceps distinguit. vulnera recentia paucitatem cibi & aquæ portionem magis requi- runt, non solum ut magnæ corporis mutationi, magna etiam obiiciatur victus mutatio, sed po- tius ut exhauriatur succorum in corpore redun- dantium copia, quæ ad affectum locum facile transmittitur, ibique dolorem, inflammatio- nem, aliaque symptomata excitat. Vetustiora & diuturna vulnera vel vlcera non æquè ferunt victum illum tenuem & exquisitum, sed cum vi- res morbi diuturnitate vel deiectæ sunt, vel im- becilliores redditæ, paulo pleniore victu sunt reficiendæ, cumque cauitas tandem sit implen- da, plus cibi concedendum est, ut augeatur san- guis, qui carni materiam subministrat. Cū vero sanguinis copia inflammationem parere soleat, æquum est sanguinem abstinencia mi- nuere, sicque præsens inflammatio vulneris tol- litur, & futura præcauetur, cumque magnas in- flammationes sequatur corruptio partis, siue gangræna sit, siue sphacelus, eius etiam pericu- lum euitatur. Verbum autem *σφακελίωσις*, quo hîc utitur, significat integram substantiæ partis cor- ruptionem, quæ in carnosiss partibus gangræna, in ossibus proprie *σφάκελος* dicitur, quod vitium

ossibus accidit, vbi a superiecta carne pernicioſa
ſanies profluit, quæ hæc ipſa irrigando corrup-
pit, commentario in ſententiam 20. libri ſecun-
di de fracturis. Vulneribus etiam & inflamma-
tionibus articulorum conuenit abſtinentia &
aquæ potio, quia victus tenuis & exquisitus ijs
qui in periculo ſunt eſt imperandus, vt antea di-
ximus, in vulneribus enim & inflammationi-
bus articulorum metus eſt conuulſionis, quod
eſt ſymptomata terroris & periculi plenum. Hip-
pocrates autem hoc loco inflammationes φλέγμα-
τα vocat. φλέγμα enim non ſolum humorem al-
bum & frigidum ſignificat, ſed etiam φλόγωσι &
φλεγμασίλω, ardorem & inflammationem, Galeno
commentario in prognosticum 66. libri ſecundi,
& aliquando etiam φλέγμα humorem calidum
& retorridum indicat, vt libro ἀπὲ φύσιν πυλίδι
Vulneribus etiam ventris, id eſt pectoris & ab-
dominis idoneus eſt victus tenuis & exiguus,
metu inflammationis, cui partes illæ vulneratæ,
ſunt opportunæ. Vulnus etiam ventris graue, ma-
gnumque cenſetur, oblæſæ partis præſtantiam.
Ventrem vero non ſolum ſuperiorem intellige-
re oportet, ſed etiam inferiorem. Diuiſo nam-
que quod inter collum & crura eſt trunco in
duas capacitates maximas, prior ſub thorace, ſe-
cunda ſub peritonæo continetur. Eſane vulnus
quod intra thoracem, intraue peritonæum pe-
netrauit, non paruum periculum aſſert, præſer-
tim ſi quid interiorum vna ſit vulneratum, ait
Galenus ſexto capite libri quarti therapeuticæ
methodi. In fractura capitis & femoris, im-
primis abſtinentiam imperat, quod eiufmodi mor-

bus grauis, periculosus & acutus esse solet, fractura enim capitis conuulsionem, apoplexiam, febrem, inflammationem, delirium, mortem denique afferre solet. Vbi autem morbus peracutus est, sæuaque symptomata & periculosa superueniunt, tunc exquisitissimo victu est utendum, aphorismo septimo libri primi. femoris etiam fractura periculosissima esse solet, quod eius ossa grandia sint & medullosa, & quod multa ac magna simul lacerentur, nempe nerui, musculi, venæ, arteriæ, & non aliter vulnus femoris fracti curandum est, quàm caluariæ ossa ubi comminuuntur, nihil frigidum imponendum, a cibo penitus abstinendum. ait Hippocrates sententia 47. & 48. libri terrij de fracturis.

Εἶναι δὲ οὐ τῷ ἔλκει ἥκιστα συμφέ-
ρει, καὶ μᾶλλον ἢν οὐ τῷ σκέλει ἔχη τὸ ἔλκος,
ἀλλ' οὐδὲ καθῆσθαι, οὐδὲ πορεύεσθαι. ἡσυχίη
δὲ καὶ ἀπεμὴν συμφέρει μάλιστα.

STare verò in vulnere nequaquam
confert, præsertimque si in femore sit
vulnus, sed neque sedere, nec ambulare.
Quies autem & otium plurimùm con-
ducit.

Celsus hunc locum Hippocratis sic vertit li-
bri quinti capite de curationibus articulo-
rum. Optimum medicamentum vulneratis est
quies, moueri & ambulare, nisi sanis, alienum

est. minus tamen his est periculosum, qui in capite vel brachiis, quam qui in inferioribus partibus vulnerati sunt, minimeque ambulatio conuenit, fœmore, aut crure, aut pede laborante. Motus oras vulneris agitans & dimouens agglutinationem impedit, vulneratus itaque nec ambulare, nec stare, nec sedere debet, sed summa quiete opus est, ut vulnus glutinetur, agitatam enim dissoluitur perinde ac gluten quo ligna cohæret, ac perinde ut coactum lac. Sed stantes & sedentes non videntur moueri! Docet Galenus libro de tremore, multa eundem locum occupantia quiescere videri, quæ tamen continuè mouentur, idque confirmat exemplo auium, quæ non modo sursum versus, deorsumve volantes, sed eundem etiam locum non mutant, tamen mouentur, illaque immobilitas apparens, est ex duobus moribus mista motio, qui corpus in contraria loca trahere possunt, quorum si vnum auferas, ab altero corripitur corpus illico conspicies, asseritque ibidem Galenus, ὅτι ἀνεπαύτως ἔδωκεν ἡ φύσις τὴν ἐστὶν αὐτῶν κοινότητα, ὥς εἰ καὶ αὐτὸ κίνησις ὂν. Stare non minus esse laboriosum, quam ambulare, cum & illud motus sit, ob tensionem musculorum qui corpus regunt & erigunt. Cum vulnus in femore, crure, aut pede fuerit, tunc præsertim stare non conuenit, quoniam cum hæ partes onus totius corporis ferant, sintque decliues, in eas humorum decubitus facilis est. Sic Hippocrates secundo libro de fracturis sententia 12. Iacere vult eum qui fractura pedis laborat, & sententia ut eiusdem libri, fracto crure nequit homo excitari, quare de curuando crure aut surgendo

nullum verbum facit, sed extentus quiescit & cubat. ἡσυχία καὶ ἀσπρέμια non idem significant. Hippocrates enim diligens admodum fuit in vocabulis, & apud eum, vnumquodque vocabulum, & syllaba omnis, rem aliquam significat, ait Galenus libro de comate. ἡσυχία autem quies est, quam opponit dispositioni stantium, sedentium & ambulantium, ἀσπρέμια vero summa est quies, quam opponit dispositioni cubantium, qui vel minimum mouentur vel locum mutant, & ἀσπρέμια est ἡσυχία χωρὶς ὄρου, quies sine agitatione aut commotione vlla Celsus libro sexto hunc locum expressit, dum ait, longa quiete & immobili penè corpore opus est. Vnde Hippocrates vltima sententia commentarij quarti de officina medici, ἱρμάσματα καὶ σπείγματα, fulcimenta & firmamenta partibus adhibet, vt motu minime concutiantur aut agitentur. membrum enim vulueratum aut fractum sæpe loco motum, coire vix potest.

Τὰ δὲ νεότερα ἔλκεα πάντα ἥκιστα ἀνφλεγμῖναιεν αὐτὰ τὸ καὶ τὰ περὶέχοντα, ἔτις διαπύσσει ὡς τάχιστα, καὶ τὸ πύον μὴ απολαμβάνόμενον ἀπὸ τοῦ σώματος ἰσχυροῦ. ἢ ἔτις ἀποτρέποι ὅπως μὴ δὲ μελλήσῃ διαπύσσει, πλὴν τοῦ ἀναγκάσιου πύου ὀλίγου, ἀλλὰ ξηρὸν εἶναι ὡς μάλιστα φαρμάκῳ μὴ περισκελεί. πυρῶδες γὰρ γίνεσθαι, ἐπὶ φέμῃ ἐγγένῃσθαι, καὶ σφυγμῶς, φλεγμαίνει γὰρ ἔλκεα τότε, ὁκόταν ἀφγπύσσει μελλῇ. ἀφγπυεῖ δὲ, ἀλλοτριμένου τοῦ

αἵματος, καὶ θερμανθέντος, ἕως σαπὲν πύον γέ-
νηται τῶν τοιούτων ἑλκεων. ὅταν δὲ δύνῃς δέϊσθαι
καταπλάσιος, οὐ γὰρ αὐτὸ τὸ ἑλκος κατα-
πλάσσειν, ἀλλὰ τὰ περιέχοντα, ὅπως τὸ πύον
ἀποχρῆν, καὶ τὰ σκληρυνόμενα μαλαχθῇ.

R Ecentia vero vulnera, partesque
circumpositæ minimum inflam-
mabuntur, si quis celerrimè pus moueat,
pûsque vulneris oris receptum non reti-
neatur, aut si quis prohibeat ne suppu-
ret, nisi exiguum admodum pus quod
necessarium sit. Sed quam maximè sic-
cum sit medicamento non mordente
aut irritante. Igneum enim euadit, ubi
horror & pulsus accesserit. Inflamman-
tur enim vulnera tunc cùm ad suppura-
tionem tendunt. Suppurant autem alie-
nato sanguine & calefacto, donec pu-
trescens eiusmodi vulnerû pus fiat. Cum
cataplasmatibus vsus necessarius videbi-
tur, non ipsum vulnus oportet cataplas-
mate nutrire, sed vicinas partes, ut pus
effluat, & dura emolliantur,

S Implex vulnus de siccari postulat ut glutine-
tur, compositum autem eiusmodi est con-
tusum, admistam habere solet inflammationem,
quæ glutinari vulnus prohibet. itaque inflam-

mationi prius medendum, deinde vulneri curando incumbendum, fieri enim non potest, ut vulnus sanetur, nisi locus in quo consistat, prius sit sanatus. Vulnere vero & circumposita loca minus inflammationi erunt opportuna. Si pus quàm celerrime moueatur. Indicat autem hos vulneratarum partium affectus non esse siccandos, in quibus gigni pus. quàm celerrimè cupimus, sed potius humectandos & calefaciendos. Ideoque ea cataplasmata quæ ex hordei farina componuntur, ceu quæ calefaciant, humectentque, omnibus ijs affectibus, quibus moueri pus expedit admouemus. hordei namque farina ex aqua & oleo, itemque panis ex aqua & oleo, præterea fomentum multæ aquæ calidæ, & tetrapharmaci vis, omnia denique quæ calefaciunt & humectant, celerrime pus mouent. Ideoque his partibus quæ phlegmone infestantur, vbi vehementius iam pulsant, sic ut iam desperetur de horum citra pus curatione, veteres omnes eiusmodi applicant medicamenta, ait Galenus libro quarto therapeutice methodi capite quinto. Puri autem exitum esse dandum admonet, retentum enim & circa oras vulneris suppressum inflammationem auget, vulnusque sordidum reddit, & vicinas partes corrumpit. Minus etiam inflammantur vulnera, partesque vicinæ, si quis prohibeat suppurationem admoueatque medicamenta desiccantia, non mordacia acria aut irritantia, qualia proponit sententia 22. huius libri, & certè ipsius phlegmones vera remedia ficciorum sunt virium, ait Galenus libro quarto therapeutice methodi, idque probat authorita-

te Hippocratis, qui hoc libro cataplasmata inflammationis proponit, quæ siccandi vim habent, & compendiarie obsessarum phlegmone partium curatio fit, per ea præsidia quæ affectum prorsus summonent, vel si quid exiguum quod suppuret, reliquerint alterum medicamentum acre, quod pus educere queat, requiritur, vel si tenuis circumposita cutis sit, velisque celerius explicatum ægrum, sectio necessaria est, ait ibidem Galenus. Quamvis autem notabile pus in suppurante particula sit contentum, non expedit, quod nonnulli faciunt, protinus incidere, imò exhalationem moliri medicamentis ad id valentibus, sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea videantur tibi totum digerere posse, secare exitum ei, quod digestionem non cessit, eo potissimum loco oportet, quo est editissimum, quippe tenuissimam etiam illic inuenies cutim. libro 13. therapeuticae methodi. Vidi autem male vertit, *φάρμακον μὴ πέλκειν*, medicamentis quæ vinculum non postulant, nec videtur legisse explicationem Galeni secundo libro ad Glauconem, qui de herpetum curatione disputans, sic tandem concludit, hoc porro in summa, in omni ulcere cognoscendum est, siue id sponte, siue ex casu, siue ex vulnere accidat, nimirum, *ὡς ξηραίνειαι μὴ αἰεὶ βούλεται φάρμακον, ὡς Ἱπποκράτης φησὶ, μὴ πέλκειν, πύπτει, μὴ δάκνῃ, μὴ δ' ἐρεθίζῃ σφοδρῶς*, quod semper exsiccare desiderat, medicamento, ut inquit Hippocrates, non aspero, hoc est, neque irritante vehementer, nisi malignum ac putre sit. Nam id genus ulcera acerrima medicamenta efflagitant, & quæ

igni vires proximas habeant. Quale est mysi, chalcitis, arsenicum, calx & sandaracha, ignis enim modo deurunt, quæ si malo cedunt, ipso igne vtendum est. quo ex loco apparet manifestissime quid sit *φαρμακον αεισχελες*. inde etiam perspicuum est, medicamenta eiusmodi partibus phlegmonē tentatis, non esse admouenda, quoniam vt ait Galenus libro 13. therapeuticae methodi capite quinto. Quum phlegmonodes quicquam in membro restat, acria medicamenta magis irritant, quam digerant. Si quando ergo ægram partem medicamenti acrimonia irritatam videris, ita vt tumentior aut rubicundior sit, aut magis doleat, mitigabis eam in retea fomento quod per spongiam administra- bis, id autem aliquando ex aqua dulci esto, aliquando etiam cum sale, vbi scilicet schirrosiores phlegmonæ fuerint. Pus autem euadit *πυώδες* & igneum, cum incalescit sanguis, alienatur, & putrescit. *φειμα* siue horror, est remissus rigor, media quædam affectio inter rigorem & frigus. Rigor autem motus est voluntarius deprauatus, frequens, velox, & coactus, quo iuncti distenduntur & curvantur, à materia acri, & pungente excitatus, quæ si sit copiosa, mordax & vehementius mota rigorem inducit, si qualitate, copia & motu sit moderata, horrorem gignit.

Non omnis rigor febrilis est, vt nec horror, sed vt ait Galenus capite 7. Libri de timore rigore & palpitatione, pharmacum acre & calidum vlceribus ad ætū primo dolorem, mox horrorem, demum rigorem infert. inflammationi etiam dum in abscessum vertitur, rigorem

& horrorem hîc intelligi Hippocrates, non autem illum qui fit ob febrem. Σφυγμός. siue pulsatio est molestus quidam sensus, & cum dolore ex arteriarum motione factus. In conuersione sanguinis in pus, fit pulsus carne arterijs incubante ipsatum motum non ferente, sed dolente quam ipsæ inter dilatandum vehementius impelluntur & feriunt. hanc arteriarum pulsationem sani non sentiunt, tum propter earum viciniam dolore vacantem, tum propter latius & amplius spatium in quo mouentur. Hinc dolor σφυγμώδης siue σφυγματιώδης, id est pulsatorius, propriè ad arterias pertinet, quæ solæ pulsant in homine bene valente citra dolorem, vbi autem oborta est vehemens inflammatio, aut affectus aliquis phlegmonodes, aut erysipelas aut abscessus, cum dolore. Inflammantur autem vulnera cum tendunt ad suppurationem quia sanguis putrescens incalescit feruet & exurit, in ebullitione & feruore sanguinis eleuantur vapores calidi, qui vicinas partes calefaciunt, & ita generant inflammationem, & tandem per consensum accenso & inflammato corde febris excitatur, vnde aphorism. 47. libri 2. Dum pus fit, dolores & febres accidunt magis quam confecto. Puris generationem fieri dicit, ex sanguine alienato, supercalefacto donec putrescens vertatur in pus, Galenus commentario in aphorismum prædictum, Pus dicit fieri ex sanguine conuerso in ἡμιμόχθρον μεταβολὴν; in semiuitiosam mutationem. Tres autem mutationes siue αμοιώσεις in animalium corpore fiunt, vna plane secūdam naturā est, cum videlicet cibus in ven-

triculo coquitur, altera planè præter naturam, ut putredo, tertia ex vtraque mista & media est, ut suppuratio. Prima mutatio fit ex familiari animantis materia & ab ingenito calore, secunda fit ab externo calore, & materia omnino aliena, tertia perficitur ab ingenito calore, sed non plane vincente, nec solo, neque in materia prorsus benigna, neque tamen omnino aliena, ex capite sexto libri quinti de simplicium medicamentorum facultatibus. Cum autem vulneribus adhibendum est cataplasma, non est oris plagæ imponendum, ne puris exitum prohibeat ut ab imperitis Chirurgis fieri solet, sed partibus proximis & vicinis adinouendum est. Hoc autem præceptum quoniam Chirurgis imprimis est obseruandum, idcirco repetet etiam postea, sententia 19, huius libri.

Τῶν δὲ ἐλκῶν ὅσῳ μὲν ἀνὸς βέλει ἀφαι-
μῖσθῃ ἢ ἀφαικοπῇ, οὐδέχεται καὶ ἔναιμον φάρμα-
κον, τὸ καλύον ἀφαιπνεῖν καὶ ἀναξηρεῖν. εἰς
δὲ ὑπὸ τοῦ βέλους ἐφλάσθη καὶ ἐκόπη σὰρξ, ταύ-
τῳ δὲ ἰητέειν, ὅπως ἀφαιπνός ὡς τάχιστα
γένῃται. ἥσων τὲ γὰρ φλεγμαίνει, καὶ ἀνάγκη
ταῖς σάρκεσιν ταῖς φλασθεῖσιν καὶ κοπείσιν,
σαπείσιν καὶ πύον γενομένας εὐτακτεῖν. ἐπει-
τα βλαστάνειν νέας σάρκας.

QUodcumque vulnus telo diuisum
aut præcisum fuerit, medicamen-
tum enæmon admittit prohibens sup-

purationem & siccans. Sin caro aliqua telo contusa & præcisa fuerit, huic ita medendum est, vt quam celerrimè suppuret. Minus enim inflammatione tentabitur, & necesse est carnes contusas & præcisas, putrefactas & in pus versas tabescere, & postea nouā carnem nasci.

HÆc sententia aperte nos docet Hippocrates omnia vulnera siccanda esse, præter ea quæ sunt contusa, in quibus pus quàm celerrimè mouere oportet. Vulnus autem simplex à telo acuto fieri dicit. Tela enim acuta, oblonga, admodum tenuia, leuia, carnem incidunt magis quàm contundunt. Tela vero obtusa, plana, dura, grauiā carnem contundunt maturant & lacerant; ait Hippocrates libro περὶ τραυμάτων. Medici autem pharmacum ἔναμιον vocant medicamentum quod imponitur, vulneribus vt primum illata sunt. & nondum plane sicca, sed adhuc cruenta; hoc est, cū αἷμα ex cute ipsa vulnerata, seu etiam ex carne roris modo destillat, ait Galenus commentario in sententiam tertiam libri tertij de fracturis. quidam etiam κολλητικόν & τραυματικόν nominant. Hæc autem medicamenta ἔναμιον vim habent desiccanda & astringendi. ἔργον δὲ αὐτῶν ἐστὶ συμφύσαι τὰ κολλησαι τὰς διηρημένους σάρκας; ὥς εἰς πλεονάζοντα ἔναμιον ἀχλὺς αἵματος μίγνεται. id est, opus eorum est, coniungere diuisas carnes & conglutinare, vt in pristinam vnitatem reducat partem scribit Galenus circa finem. 2. κεφάλαιον. Medicamenti enim acuto

exemplum proponet Hippocrates sententia 33. huius libri. vt autem vulnus simplex siue a telo acuto diuisum siue præcisum sit, medicamenta enæma requirit. glutiniantia siccantia & suppurationem prohibentia, sic vulnus contusum exigit pharmacum *διεπηκκόν* & suppurans, quod calore & humore temperatum esse debet, & præterea emplasticum & poros obstruens. Cum autem ea quæ puti mouendo conueniant, proxime ad caloris nostri substantiam accedant, eumque augere debeant, hinc fit vt in mouendo pure, humor quidem alteretur, & si quæ caro contusa sit & detrita, alia vero omnia, quæ secundum naturam sunt, substantiam suam conseruant. De emplastris enëmis sic scribit Celsus libri quinti capite decimo nono ex emplastris nulla maiorem vsum præstant, quam quæ cruentis protinus vulneribus iniiciuntur, *ἐναιμία* græci vocant. hæc enim reprimunt inflammationem, nisi magna vis eam cogit, atque illius quodque impetum minuunt, tum glutinant vulnera, quæ id patiuntur, cicatricem iisdem inducunt, constant autem ex medicamentis non pinguibus. Sententiã autẽ de carne contusa & præcisa suppurãda bis repetit libro *ἐπὶ τραυμάτων*, primum loquens de telis obtusis & grauibus quæ carnem cõtundunt & lacerant, sic ait, *ἀνάγκη τὰς σάρκας τὰς φλαδίσεις ἢ κοπίσας πύον γενομένας ἐκτακῆναι.* & paulo post, cum docet, carnem humidam & sanie madentem calamitatem ossi afferre, sic scribit, *ἀνάγκη ἔχει τὰς σάρκας τὰς κοπίσας ἢ φλαδίσεις ὑπὸ τοῦ βέλους ὑπεπύους γενομένας ἐκτακῆναι*, quibus in locis *σπῆσις* obmisit, vt etiam

codex Basiliensis libro quarto therapeutices methodi, quamvis Galeni interpres, putrefactas, reddiderit. Vidius etiam hoc loco non vertit, quamvis in omnibus codicibus græcis legatur. Cæterum non omnis caro contusa ad suppurationem ducenda est, sed ea tantum quæ detrita & lacera est. σαρκόθλασμα enim & contusio carnis, quæ cute integra venis ex ignis disruptis facit ἐκχύμωσιν siue ἐκχύμωμα, id est, sanguinis suffusionem, non requirit suppurantia, sed curatur initio astringentibus & discutientibus, tandemque calefacientibus, & modice siccantibus, galeno circa finem libri quarti therapeutice methodi, & Paulo libri quarti capite 30. Hic autem contextus in codice græco deprauatus legabatur, nos ex quarto libro therapeutice methodi restituimus.

Εἰς νεοτρώτω παντὶ, πλὴν ἐν κοιλίῃ, συμφέρει ἐκ τῷ τρώματος αἷμα ῥῆναι αὐτῇ πλεον ἢ ἔλασσον, φλεγμαίνει γὰρ ὅσον αὐτὸ τὸ ἔλκος, καὶ τὰ περιέχοντα, καὶ ἀπὸ τῶν πεπαλαιωμένων ἐλκείων συμφέρει αἷμα ποιεῖν ἀπορρεῖν πυκνὰ, ὅπως ἂν δοκῇ χαιρὸς εἶναι, καὶ ἀπὸ αὐτῶν τῶν ἐλκείων, καὶ ἀπὸ τῶν περιέχοντων τὸ ἔλκος ἄλλως τε καὶ ἢ ἐν κήμη εἴη τὸ ἔλκος, ἢ ἐν δακτύλῳ ποδὸς ἢ χειρὸς, μᾶλλον ἢ πού ἄλλοτι τῷ σώματι. γίνεται γὰρ ἀπορρέοντος τῷ αἵματος ξηρότερα καὶ μείονα ἰσχυρόμενα. καλῶς γὰρ μάλιστα μὴ ταῖς τοιαῦτα ἔλκεα ἐγείνεσθαι, ἔπειτα δὲ καὶ τὰλλα σύμπαν-

τα ἀμωτος σπινδαῖν, & ὅτι ἐξ ἀμωτος μετὰ
 ἑλπίος γέννται.

OMni recenti vulnere, nisi sit in ventre, expedit ex ipso statim sanguinem plus minusve effluere, quippe inflammatione minus tētabitur tum vulnus ipsum, tum quæ circumposita loca sunt, & ab inueteratis vlceribus vt sanguis crebrò fluat, efficere prodest, vt cumque opportunum videbitur, tum ab ipsis vlceribus tum à circumpositis vlceri partibus, atque adeo si sit in crure vlcus, aut in digito pedis, vel manus, magis quam in alia corporis parte. Quæcumque enim profusione sanguinis extenuantur, sicciora fiunt & minora. prohibet namque maxime quidem eiusmodi vulnera sanescere, deinde vero etiam reliqua omnia sanguinis putredo, & quod ex sanguinis transmutatione oritur.

Hic contextus in exemplaribus græcis Hippocratis non solum mutilus & mancus est, sed ita deprauatus vt ex eo sensus nullus elici possit, nos ex capite sexto libri quarti Therapeuticæ methodi, principium restituimus, finem vero ex quinto capite eiusdem libri. Duo autem præcepta continet de sanguinis profusione in

vulneribus. Primum præceptum est, vt ex vulnere recenti sanguinem fluere patiamur, plus minúsve dum tutum erit, sique parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat, vtique si corpus iuuenile, robustum & exercitatum est, multoque magis. Si id vulnus ebrietas præcessit, ait Celsus libri quinti capite de curatione aduersus vulnerum inflammationem. Cumque medicus debeat non tantum imitator esse naturæ, sed etiam eorum, quæ cum sponte sua eueniunt, conferunt, clarè Hippocratis mentem de sanguine id vulneribus detrahendo intelligere licet. Si enim expedit ex omni recenti vulnere sanguinem effluere, non autem effluxerit, quod deest, medicus adijcere debet. ait Galenus libro quarto therapeuticae methodi. Sanguinis autem profusio symptoma est, quod omni recenti vulnere coniungitur, nisi fortasse sanguis intro reuocetur, tuncque mors in propinquo est. protinus tamen prospiciendum ne sanguinis profusio ægrum interimat, quod ex sede vulneris & magnitudine eius, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest, tunc enim sanguis protinus suppressendus, idcirco addit Hippocrates, plus minúsve, vt pro modo vulneris, pro natura laborantis, sanguinem fluere patiamur, & si nimium profundatur, mature suppressimus. Excipit autem vulnus ventris, idest thoracis aut abdominis, non quodlibet, sed id tantum, quod intra thoracem, intrave peritonæon penetrat. nam vt scribit aphorismo 20. libri. 6. Si in ventrem sanguis præter naturam effunditur, necesse est suppurari, & Galenus notat sanguinem non solum

suppurari, sed corrumpi, putrescere in grumos & thrombos verti; Cum enim sanguis à propria cavitare, in aliam quamcumque peruenierit, ut sanguis permaneat, fieri non potest. Vnde Philotheus ait, τὸ αἷμα, καὶ τὸ σπέρμα, καὶ τὸ γάλα, ἐκ τῶν οἰκείων τόπων γινόμενα, θρομβοῦνται καὶ σκίπεται. Sanguis semen & lac ex propriis locis exeuntia in grumos vertuntur & putrescunt. Secundum præceptum est, ut ab inueteratis vlceribus sanguinem fluere faciamus. tum ab ipsis vlceribus, tum à circumpositis vlceri partibus. Quoniam prædixerat, omni vulnere recenti expedire sanguinem ex ipso effluere, cernens nisi etiam de inueteratis mentionem faceret, fore ut ab aliquo putaretur de recentibus tantum ita pronunciasse, idcirco illud rectè adiecit, & ab inueteratis vlceribus sanguinem mittendum esse: addit vero, tum ab ipsis vlceribus, tum à circumpositis vlceri partibus, ut doceat fluxionem fixam iam in laborante particula vacuandam esse, vel ab ipsa particula quæ affligitur, vel à maxime vicina, incipientem vero fluxionem ad contraria esse trahendam, ex sexto capite libri quarti therapeut. methodi. Addit Galenus ibidem, succum in vlceribus redundantem esse vacuandum, & sanguinis detractionem esse adhibendam cum sanguis vincit, aliàs dandum pharmacum, quod bilis flauæ, vel atræ, vel pituitæ educendæ vim habeat. Ex hoc Hippocratis loco Theſſalus curandorum vlcerum indicationem à tempore sumendam credebatur, quem passim refutat Galenus libro tertio & quarto Therapeut. methodi, quoniam nulla externa causa ad

curationis indicationem conducit, sed ad affectus cognitionem, Vetustas enim curationem non indicat sed sanguinis prauitas, signum quidem vitiosi succi est ipsa vlceris diuturnitas, inuentio autem eius quod expedit, non ex diuturnitate, sed ex cacoehymia suggeritur. Itaque nulla est a tempore nec in vlceribus, nec in phlegmone, nec denique in alio quopiam affectu indicatio, & tempus nihil aliud nos docere potest, quam numerum dierum ex quarto capite, quarti libri methodi therapeuticae. Suadet autem vt ex inueteratis vlceribus sanguis effundatur, vt siccata potius sanescant, & quoties id moliendum fit, non praescribit, sed crebro & cum opportunum videbitur. Vult etiam Celsus libro quinto, vt vetus vlcus ad curationem recentis vulneris reducat, quod fit, vbi sanguis emissus, nouatumque vulnus est. Potissimum autem hanc sanguinis profusionem tentandam esse admonet in vlcere crurum, & digitorum pedis & manus. Cum enim crus & pedes onus totius corporis sustineant, sintque decliues partes, facilis est ex toto corpore in eas defluxio. Vulnera etiam quacumque parte oborta fuerint, ex partibus continentibus inflammantur & intumescunt ob sanguinis influxum, ait Hippocrates libro *ἀπὸ τῶν ἑσωμάτων*. Digiti etiam manus & pedis difficilimè ferunt inflammationem, cum partes sint nervosae, molestèque humorum decubitus recipiunt, cum minime partes sint capaces, & idcirco *τῶν ῥαείων δυστηνότεροι μὲν, τῶν δὲ ἀπὸ αἵματος ἐπικινδυνότατοι οἱ μεγάλοι δάκτυλοι, καὶ μᾶλλον οἱ τῶν παδῶν*. Ex partibus difficilius curantur saucia crura,

ex articulis periculo maxime obnoxij sunt magni digiti & præsertim pedum, ex secundo libro prædictionum. Cæterum cum Galenus Hippocratis illud affert, quæcumque profusione sanguinis extenuantur, sicciora fiunt ac minora, scribit tantum, vlcus effluente sanguine fit siccius. capite quinto libri quarti methodi. Postrema autem huius sententiæ particula a nullo fuit intellecta. Cornarius enim sic vertit. Prohibet hoc maxime talia vlcera humectari, deinde vero in omnibus putredo sanguinis ex sanguinis transformatione fit. Vidijs autem sic latine reddidit: neque madere vllo pacto sinitur, adde quod a putri atque alienato sanguine omnia proficiuntur. Vterque deprauatum codicem nactus, mentem Hippocratis assequi non potuit.

Συμφέρει δὲ μετὰ τὴν τοῦ αἵματος ἀπορροίαν, ὅτι τῶν τοιούτων ἐλκῶν καὶ ἀσφύγιον ὅτι δέιν, πυκνὸν, καὶ μαλακὸν, τεταπημένον, ξηρότερον, ἢ ὑγρότερον· ἢ ὅτι τῷ ἀσφύγι ἀνωθεν φύλλα ἰσχυρὰ πηθεῖσθαι.

Confert post sanguinis profusionem talibus vlceribus alligare spōgiam densam, mollem, incisam, sicciorē quam humidiorē. Vel spongiæ exilia folia superponere.

CUm ex recenti vulnere fluxerit sanguis, aut ex inueterato fuerit detractus, videndum

ne quid concreti sanguinis supersit, & in vulnere remaneat, id enim in pus vertitur, & inflammationem mouet, & vulnus glutinari prohibet. Itaque nunc suadet, vt in eiusmodi vulneribus, ex quibus profluxerit sanguis, alligetur spongia, quæ sanguinis reliquias absorbeat, profluuium supprimat, & ita vulnus desiccet. Spongia vero Dioscoridi libro quinto est vulneraria & τραυματική, recentia vulnera conglutinat cum aqua vel oxycrato, sanguinis profluuium sistit, & manifeste desiccat, vide librum vndecimum de simplicium medicamentorum facultatibus. Spongia densa eligenda est, sanguinem enim quem ebibit melius retinet, quam rara, mollis etiam sit, ne partem vulneratam duritie lædat, incisa sit, vt facilius vulneris oris aptetur, siccior sit quam humidior, vt non solum, sanguinem supprimat, sed etiam desiccet. hanc particulam ἐνέστερον ἢ ὑγρότερον, Galenus exponit ἐνέστερον οὐχ ὑγρότερον, & particulam ἢ hoc loco negationis vim habere scribit quinto capite libri quarti methodi therapeuticae. Vidius Galenum sequens male vertit, sicciolem non madentem. Vterque vim particulæ ἢ oscitanter obseruauit, & mentem Hippocratis diligenter non explorauit. Itaque Galenum diligentem Hippocratis interpretem & genium hîc non approbo ἢ cum spiritu tenui & accentu graui, est particula disiunctiua & per aut redditur, vel est explanatiua & significat, quam, præterea ἢ inter duo comparatiua sæpius significat, quàm, vt hoc loco, & ἢ subaudita diuisione μᾶλλον, quàm denotat. Itaque cum Galenusiple μᾶλλον legerit, miror fuisse decep-

tum. Sic enim scribitur, quarto therapeuticae methodi capite quinto, ἀσπγγον ἐκέρτερον μᾶλλον ἢ ὑγρότερον. Præterea locus ille Homeri, quo Galenus probat ἢ particulam esse negatiuam, commentario in sententiam 18. libri tertij de officina medici, & quem etiam affert hoc commentario Vidijs, ut idem confirmet, non satis probabilis apparet. Est autem versus libri primi Iliados.

Βούλομι ἐγὼ λαὸν σὸν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι.

Id est ex mente Galeni.

Esse volo populum saluum, non morte perire.

Sed melius reddi potest.

Seruare incolumem populum quam perdere malo,

Galeni autem explicationem non probat vulgaris Homeri interpres græcus, dicit enim sensum huius versiculi esse hunc, θέλω ἐγὼ τὸν ὅχλον μᾶλλον σώζεσθαι, ἢ αὐτὸς ἀπολέσθαι. Volo ego populum seruari, & ipse interire. Et Eustathius sic explicat, βούλομαι σὸν εἶναι τὸν λαόν, ἢ ἀπολέσθαι αὐτὸν βουλοίμην αὐτὸς. Volo saluum esse populum, aut perire malim ipse. Sed ne hæc πέρεργα ὡς ἔργα tractare videamur, ad rem iam veniamus, spongiam autem vulneribus siccam non esse alligandam, patet ex Celso, qui libro quinto capite de curatione aduersus profusionem sanguinis in vulneribus, sic inquit: Si profusionem sanguinis timemus, quod ex sede vulneris, ex magnitudine eius, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest, siccis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua frigida expressa, ac manu super comprimenda. Et paulo post, capite de glutinatione vulnerym,

sic ait : Omni vulnere primo imponenda est spongia ex aceto expressa , si sustinere aliquis aceti vim non potest , vino vtendum est. Levis plaga iuuatur etiam , si ex aqua frigida expressa spongia imponitur , sed ea quocumque modo imposita dum madet,pròdest,itaque vt inhærescat non est committendum. Scribonius etiam largus capite de sanguinis eruptione , scribit spongiam quæ vulnere imponitur ex aqua recenti , vel ex aceto ; frequenter mutandam esse , ne concale facta noceat. Itaque per spongiam ficiorem quam humidiorē , expressam ex aqua , vino , vel aceto intelligere oportet. Obserua etiam Hippocratem ipsum in detractiōe sanguinis ex varicibus post situm conuenientem & fasciæ vsum , ad sanguinem sistendum , duplex linteolum vino madens imponere , supraque laminam oleo imbutam , sententia 50. huius libri , folia quoque exilia spongiæ superimponit. Galenus in exegesi linguarum Hippocratis scribit , φύλλα significare τὰ κητώδη & βοτανώδη χλαρά ἡδύσματα. i. hortensia & herbacea viridia odoramenta , & statim subiungit , φύλλα & in quibusdam codicibus φύλλια , ἡδύσματα κηπαία. , ἃ τοῖς ἀναισθητοῖς τὰ λάρνακα προσέπιπιδέασιν , οἷον κορίανθον , ἡδύσμον , πιγανον , σελιγον , id est , odoramenta hortensia quæ ementibus, olera adijci solebant, vt coriandrum, menta, ruta apium. Hippocrates ipse libro secundo de morbis, dum remedia præscribit contra σαφολὴν vnam morbum, suadet τὸ ἀπὸ πάντων φύλλον διδόναι ἀναγκαρεῖεν , id est foliorum decoctum gargarisandum dandum esse. Vbi per φύλλα intelligit ὀσείανον , & θυμ-

λεαν, & σέλινον, & μάνθω, vt paulo ante gargarisimum contra anginam primam præscripserat. Libro etiam quarto de articulis sententia 22. folia betæ, vel tussilaginis, vel cuiuspiam alterius talis in vino nigro austero semicoëcta, vlceri atque adiectis partibus imponere præcipit. Paulo post contra inflammationem & erysipelas vsurpabit, verbascum folia trifolij, malua, rutæ origani viridis, glasti, rubi, canini, nasturtij, & similia. Sunt etiam qui φύλλον nomen proprium herbæ existiment, de qua Dioscorides libri tertij cap. 123. Cuius etiam meminit Theophrastus libri vndecimi cap. 19. quam Plinius libri 22. capite decimo sexto, non solùm Phyllon, sed etiam Leucantham, ischiada, & polygonaton appellat. Sed cùm ea herba Galeno fuerit incognita, cumque alibi non meminerit Hippocrates, vsurpanda potius esse puto, folia menthæ, ruthe, apij origani, trifolij, nasturtij, quæ & exilia sunt, & siccandi pollent facultate.

Ε'λαωὺν δὲ καὶ ὅσα μαλθακάδεα, ἢ ἐλαιώδεα ἐστὶ φάρμακα οὐ συμφέροι τοῖσι τοιοῦτοις ἐλκεσιν, ἢν μὴ πάνυ ἤδη πρὸς ὑμείνην τείνη, οὐδὲ τοῖσι νεοτερώτοις ἐλκεσι συμφέροι ἐλαιον, οὐδὲ μαλθακάδεα, οὐδὲ τεάπνάδεα φάρμακα, ἄλλως τε καὶ ὅτι ἀν δέηται ἐλκος πλείονος χυθάρσιος. τὸ δὲ ξύμπαν εἰπεῖν, ἐλαίω τινὲ χρίσιν ποιεῖσθαι, καὶ ἐν θέρει, καὶ ἐν χειμῶνι, πρὸς ἅ τῶν τοιούτων φαρμάκων δέμεθα.

Oleum & quæcumque medicamenta mollia aut oleosa, sunt talibus vlceribus minime conueniunt, nisi iam ad sanitatem multum vergant. neque etiam recentibus vulneribus conuenit oleum, neque mollia, neque pingua medicamenta, præsertim cum multa purgatione vulnus indigeat. Vt autem vno verbo dicā, oleo tam æstate, quam hyeme illinenda sunt ea, quæ medicamentis egent eiusmodi.

Quid post sanguinis profusionem, vulneribus sit admouendum dixit, nunc autem exponit quid vulneribus eiusmodi sit alienum, vt id caueamus. proponit vero quatuor remedium genera, quæ post sanguinis effluxum, aduersa sunt vulneribus tam recentibus, quam inueteratis, nempe oleum, medicamenta mollia, oleosa, & pingua, de quibus ordine dicendum. Oleum ipsum maximè proprium, & quod potissimum ab omnibus hominibus ita vocatur, considerare sufficit. Hoc enim *ἐπιλωσ, ἀπὸ ὧτος, ἐκ κελύους* sic dicitur, & fructus ex quo conficitur, oliua, & arbor olea vocatur, reliqua vero per metaphoram & per abusum, ait Galenus septimo capite libri secundi de simplicium medicamentorum facultatibus, eiusmodi enim oleū, exacte oleum existens, cuncta tum humectat, tum emollit, ibidem, capite decimo octauo. Idcirco autē oleum inimicū est, eiusmodi vulneribus, quia vulnera

desiccari postulant. Si vero vlcera caua fuerint, oleum ipsis aduersissimum omnium medicamentum est, cum si ita mederi velis, vsu ipso intelliges, sordidum ac male olens vlcus fieri, ex 2. capite libri tertij methodi therap.

Mollia medicamenta, quæ vocat hippocrates *μαλθακώδεα* vel etiam *μαλθώδεα*, vt legisse videtur Galenus in exegesi linguarum, proprie sunt medicamenta *κηρώδη* id est cerea. *μαλθὴ γὰρ ὁ κηρός ἔστι καὶ μάλιστ' ὁ μεμαλαχυμένος*, maltha est cera præsertim emollita, & apud Festum, maltha est pix cum cera mixta, & medicamenta mollia siue cerea, sunt ea quæ ex cera, pice, resina, & terebinthina componuntur.

Ελαϊώδη siue oleosa, sunt ea medicamenta quæ multum olei recipiunt, habentque vt plurimum adiunctam adipem, ideoque humectandi vim habent. *ἔλαιμα* vero nonnulla, aliquid olei recipiunt, sed præpollet desiccantium quantitas, hæcque ex medicamentis non pinguibus constant, ideoque alipenæ nominantur ait Celsus libri quinti capite 19. *ἀλίπαινα* græci vocant *ἀπὸ τοῦ λιπαίνειν*, & *τὸ ἀ μούριον σερπητικοῦ*. *Στεατώδη* pingua medicamenta sunt ea quæ recipiunt adipem anserinam, suillam caprinam: medullam bubulam, vitulinam ceruinam, sæuum, pinguedinem & similia, hæcque remediorum genera, mollia, oleosa pingua, à græcis *λιπαρά*, à latinis lenia dicuntur. Hippocrates hoc loco dicit ea minime conuenire vulneribus recentibus aut inueteratis, in quibus glutinandum, aut cauitas carne implenda. Cum enim siccantibus aut farctoticis sit opus, hæc iure reiiciuntur, quæ nec

glutinare, nec carnem producere possunt, sed potius vlcus sordidum & putridum efficiunt. Vulnera verò quæ ad sanitatem tendunt, requirunt hæc medicamenta lenia, quibus etiam vritur Hippocrates postea sententia 44. huius libri, ad pulchram & decoram inducendam cicatricem. Hæc eadem medicamenta sordidis vlceribus sunt inimica, quia horum admotione sordidiora fiunt, quod si anni tempus calidius sit, ac cacochymia homo laboret, aut rheumatismis sit obnoxius, aut etiam in victus ratione delinquat, timor est ne pars computrescat, in qua vlcus est factum, ex secundo capite libri tertij methodi. In fine scribit, cum lenium medicamentorum vsus vlceribus necessarius incidit, oleo inungenda esse eiusmodi vlcera, tam æstate quam hyeme, potius quam cæteris mollibus, oleosis & pinguibus medicamentis, quæ postea hyeme magis admouenda esse dicet, quam æstate. Sententia 44. huius libri.

Υ' ποκράβασις τῆς χεῖρος κοιλίης συμφέρει τοῖσι πλείστοις τῶν ἐλκέων, καὶ ἐν τρώμασιν ἐν κεφαλῇ εὖσι, καὶ ἐν κοιλίῃ, καὶ ἐν ἄρθροισι, καὶ ὅσα σφακελίσαι κίνδυνος, καὶ ὅσα ραπίδα, καὶ τοῖσιν εὐθιομένοισι, καὶ ἐρωτιστικοῖσι, καὶ τοῖσιν ἄλλως πεπαλαιωμένοισιν ἔλκεσι, καὶ ὅπῃ ἀν μέλη ἐπιδεῖν.

Purgatio per aluum plurimis vuln-
ribus confert, siue sit in capite vul-

nus, in ventre, aut in articulis, & in quibus periculum corruptionis imminet, & ijs quæ futuram postulant, vel exedunt, vel serpunt, alijsque etiam quouis modo inueteratis vlceribus, & quando vinculum necessarium erit.

Hippocrates morbi magnitudinem ad purgationis indicationem considerat, hocque loco clare docet omnibus vlceribus & vulneribus cum magna sunt, purgationem esse utilem. Cum enim trifariam non solum hæc, sed etiam reliqua morborum genera, grania, magnaue reddantur, vel propter affectæ partis præstantiam, vel propter affectus magnitudinem, vel propter κακόνδεσιν & malignitatem, cuiusque horum seorsum videtur mentionem fecisse Hippocrates, nam in capitis & ventris vulneribus præstantiam læsæ partis indicat, ventrem autem hoc loco non solum inferiorem intelligendum esse, sed etiam superiorem, cuius perspicuum esse arbitror. Diuiso namque quod inter collum & crura est trunco, in duas maximas capacitates, prior sub thorace, secunda sub peritonæo continetur, & sane vulnus quod intra thoracem, intrâve peritonæon penetratit, non paruum periculum affert, potissimum si quid interiorum vnâ sit vulneratum. Quin etiam maligna fieri statim, quæcumque in articulis accepta vulnera sunt, id quoque omnes fere sciunt, empirici quidem ex sola experientia, cui soli attendunt, qui verò corporis naturæ scientiam com-

parare studuerunt , ex ipsa vulneratarum partium natura, ubi enim tendones sunt & nervi, & carne vacua atque ossea loca , hic doloris , vigiliarum, conuulsionis & delirii periculum instat. Tùm hæc igitur vulnera , tùm quæ fiuntur, id est , quæ adeo sunt magna , vt futuris indigeant, aut si non his, certe vinculo , purgationem desiderant, nam magna vulnera, vel futuris, vel vinculis sunt coniungenda , & sanè quibus corruptionis periculum impendet , ea cum magnitudine phlegmones sunt. Iam quæcumque exedunt aut serpunt, ea tum maligna sunt, tum malorum succorum soboles, nonnullæque à bilioso excremento ortum habent. Vlcera verò inueterata ab aliqua simili causa proueniunt : quare in omnibus his nō sine ratione purgare per aluum iubet. Galenus hanc Hippocratis sententiam his verbis explicat sexto capite libri quarti methodi. Vbi tamen varietas quædam est in verbis græcis, in codice Hippocratis legitur, καὶ ὅσα ῥαπία, & quæcumque sutilia, in codice Galeni, καὶ ὅσα ῥάπτεται, & quæcumque fiuntur, præterea apud Hippocratem scribitur, καὶ ἐρπιστικοῖσι, in vlceribus serpiginosi, apud Galenum καὶ ἑρπιοῖσι, herpetibus, & duæ postremæ huius sententiæ partes, sic leguntur apud Galenū, καὶ τοῖσιν ἄλλοις τοῖσι πεπαλαιωμένοις τὰ ἔλκεα, καὶ ὅποια δ' αὖν μέλλῃ τις ἐπιδεῖν, ὑποκαταλεῖν πλὴν καὶ τοῦ κοιλίῳ. Et reliquis quæ vlcera diuturna reddunt : etiam quæcumque deliganda sunt , per aluum purganda sunt. Cornarius in sua versione locum hunc non intellexit , perperam etiam Mercurialis græca Galeni margini ascripsit, dum post, ὡς, ad-

iungit,

lunigit, ὑποκαταίρειν τὴν κατὰ κοιλίαν. Totus autem iste locus ex Galeno luce meridiana clarior est.

Οὐ γὰρ οὐδ' ἐμπλάσσειν τὰ φάρμακα, πρὶν ἂν πᾶν ξηρὸν ποιήσῃς τὸ ἕλκος, τότε δὲ δεῖ προστιθέναι, ἀνασπογγίζειν δὲ τὸ ἕλκος πολλάκις ἀπόξη, καὶ αὐτὶς ὁθόνιον ξηρὸν, καὶ καθαρόν πρὸς σιγῶν πολλάκις, οὕτω δὲ ὅπως τὸ φάρμακόν τὸ δοκέον συμφέρειν, ὁπιδεῖν, ἢ μὴ ὁπιδεῖν.

NEquè vero medicamenta imponere prius oportet, quàm vulnus plane siccum reddideris: Tunc autem imponere conuenit, sed sæpius vulnere admoenda spongia, rursumque linteum siccum & purum sæpius adhibendum. Cùmque hoc pacto medicamentū quod conferre videbitur imposueris, deligandum, vel non deligandum.

Medicamenta quæ vulneribus imponuntur, sunt vel ἑναιμα siue κολλητικὰ, quæ eruentis protinus iniiciuntur, vel σκελετικὰ, quæ cauo vulnere ad carnem producendam immituntur, vel ἐπουλωτικὰ medicamenta valde sicca & astringentia quæ vlceri cicatricem inducunt, nonnulla ad sordes detergendas, quædam etiam ad super crescentem carnem coercendam ac-

commodata sunt, quæ numquam vulneribus aut
 vlceribus imponere debemus, nisi prius ipsa vul-
 nera sicca reddita sint. Siccantur autem vulnera
 & vlcera cum sanguinem aut vitiosum humo-
 rem, aut sordes quibus abundant, non solum
 spongia absorbemus, sed etiam linteo molliore
 puro & sicco extergimus, id quæ non semel mo-
 limur. Sed sæpius tentamus, donec nempe sicca
 nobis appareant vlcera. Sanguis autem, icho-
 res & sordes vulnerum, non solum retinentur
 imposito remedio, sed remedij etiam vires re-
 tundunt, hoc loco ἰδόντων ξηρὸν καὶ καθαρόν requi-
 rit. Galenus autem libro quarto κε' γ', initio
 secundæ sectionis, ἰδόντων μαλακὸν καθαρόν καὶ
 ξηρὸν postulat, ad humores vitiosos detergendos
 & sordes eluendos. Cum autem spongia & lin-
 teo sæpius exsiccatum fuerit vulnus, & medica-
 mentum quod conferre putabis imposueris,
 tunc fascia deligandum vulnus, vt medica-
 mentum contineat, vel si medicamentum per se re-
 tineatur, nec facile decidat, fasciam nullam inji-
 cies, expedit autem vt initio dixit, cum cataplas-
 ma non admonetur, à vinculo quoque abstinere,
 emplastra enim per se tenacius partibus in-
 hærent, & vinculum non requirunt, dixit autem
 pharmacum quod conferre videatur, quia non
 semper idem medicamentum adhibendum, sed
 modo colleticum, modo sarcoticum, aliquan-
 do detergens, & præterea non vnum omnibus
 naturis & partibus medicamentum est idoneum
 etiam si ad eundem spectet finem. Ceterum cum in
 principio huius sententiæ geminatam negatio-
 nem video, cum etiam post οὐ γὰρ, locum ani-

inaduerto vel asterisco notatum, vel puncto distinctum, colligo facile totam antiquitatem suspectum eum habuisse, itaque post *ὅχι*, legendum puto, *ἐπιθεῖν*. Ut sit sensus, neque deligare, neque medicamenta prius imponere oportet, &c. quod manifestissime conclusio huius sententiæ demonstrat, cum medicamento imposto dicit vulnus deligandum, vel non deligandum. Sic in sectione varicis tum demum fasciam admouet, cum nihil concreti sanguinis in sectione relinquitur, sententia 50. huius libri. Sic Celsus libro quinto, in glutinatione vulnerum, neque futuram, neque fibulam prius imponit, quam vulnus intus purgatum est, ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur, id enim in pus vertitur, & inflammationem mouet, & glutinari vulnus prohibet.

Ἐλκεσι τοῖσι πλείστοις ὥρη ἢ θερμότερῃ
 συμφερατέραν τῷ χειμῶνος, πλὴν τοῖσιν ἐν κε-
 φαλῇ καὶ κοιλίῃ, μᾶλλον δὲ ἢ ἱσημερινῇ.

PLURIMIS vulneribus curandis tem-
 pus calidum opportunius hyeme,
 exceptis ijs quæ sunt in capite & ventre,
 multoque magis æquinoctium.

QUoniam aër ambiens is est, sine quo nec
 tolli morbus, nec teneri sanitas potest, ex
 decimo quarto capite, libri noni methodi thera-
 penticæ, idcirco nūc Hippocrates inquit quæ-
 nam tempestas vulneribus sit salubrior. Tempus

autem calidius plurimis vulneribus curandis commodius esse dicit hyeme, quoniam frigidum ulceribus mordax, ex aphorismo 20. libri quinti. Quomodo autem frigidum sit ulceribus mordax, docet Galenus secundo capite libri quarti de simplicium medicamentorum facultatibus, frigidum enim spiramenta cuncta in raris corporibus subiens, qualia sunt vulnerata omnia, refrigerandorum corporum partes circumquaque amplectitur, easque contrahens, condensans & constringens à continuis auellit. Celsus libri quinti capite 26. apertius rem istam distinguit, dum ait, opportunissimum curationi vulnorum tempus vernum est, aut certe neque feruens, neque frigidum, siquidem vulnera & nimius calor, & nimium frigus infestant, maxime tamen horum varietas, ideoque perniciosissimus autumnus est. Hic excipit Hippocrates vulnera capitis, thoracis, & ventris, quibus hyemem salubriorem esse dicit tempore calidiore, quoniam hyeme calidum nativum copiosius est & robustius in capite & cavitatibus omnibus nostri corporis, per aphorismum. 15. libri primi. Ventres hyeme natura calidissimi. Calor autem corporis nostri vires sustinet, ab eoque omnes naturales actiones proveniunt. Scribit Hippoc. libro *περί βρωμάτων ἐν κεφαλῇ*, hominem quacunque capitis parte vulnus acceperit, diutius vitam protrahere hyeme quam æstate, quamvis alioqui sit moriturus. Æquinoctium autem vulneribus saluberrimum esse dicit, quod sit temperatum, neque ita calidum ut æstas, nec ita frigidum ut hyems, sed mediam quandam habeat

temperiem, hoc æquinoctio verno potissimum attribuitur. Ver enim saluberrimum est, aphorismo nono libri tertij. Potest etiam æquinoctio autumnali conuenire, quia sit inter æstatem & hyemem veluti medium. Est autem duplex æquinoctium, vnum vernum, alterum Autumnale de quibus sic Plinius libri decimi octauī capite 25. Cardo temporum quadripartita anni distinctione constat per incrementa lucis, augetur hæc a bruma, & æquatur noctibus verno æquinoctio diebus xc. horis tribus, deinde superat noctes ad solstitium diebus xcij. horis xij. vsque ad æquinoctium autumnī, & tum æquata die procedit ex eo ad brumam diebus lxxxix. horis tribus, omnesque eæ differentiæ sunt in octauis partibus signorum, bruma Capricorni, ad viij. calend. Ianuarij ferè. Æquinoctium vernum arietis, solstitium Cancrī, alterumque æquinoctium Libræ. Secundum Ætium tetrabiblij primæ, sermone tertio cap. 164. Æquinoctium vernum fit vigesimotertio die Martij. Solstitium verò, vigesimoquinto die Iunij. æquinoctium Autumnī est vigesimoquinto die Septembris. Bruma autem siue solstitium hyemale fit vigesimotertio die Decembris. Nostris autem temporibus post correctionem Gregorianam, æquinoctium vernum fit 13. calend. Aprilis, quod ante correctionem cadebat in sextū id Martij. Solstitium autem æstiuum post correctionem temporum incidit in vndecimum calend. Iulij, quod ante fiebat iij. idus Iunij, Æquinoctium Autumnale post emendationem, fit ad ix. calend. Octob. quod ante contingebat idib. Septemb. Bruma

denique post correctionem redijt ad xij. calend. Ianuarij, quæ prius eueniebat iij. idus Decembris. Cæterum hæ temporum distinctiones à medicis considerantur, non dierum numeris & momentis, sed potius temperamentis. Vnde si ver frigidum fuerit, hyemis vicem habere dicemus, si æstas in calore & frigore inæqualis admodum fuerit, tunc Autumni tempus potius esse censebimus.

Τὰ δὲ ἔλκεα ὅσα μὴ καλῶς καθαθέντα, καὶ ἐς τὸ δέον αἰὲν ὥσπερ, ἀρξεται βλαστάνειν, ταῦτα ὑπερσπαρκεῖ μάλιστα, ὅκοῖα δ' αὖ καθαθέντα καλῶς, καὶ ἐς τὸ δέον, αἰὲν ὅπι τὸ ξηρότερον θεραπεύηται, πλείω εἰ ἰλασθῇ, ταῦτα οὐχ ὑπερσπαρκεῖ ὡς ὅπιτοπολύ.

QUÆ vlcera non probè & vt conuenit, purgata prius semper, pullulare incipiunt, ijs maxime caro supercrescit. Quæ verò probè & vt decet, expurgata semper ad siccius promouetur, nisi contusa sint, ijs caro vt plurimum non supercrescit.

EA vlcera non probè & vt decet ex purgata semper prius fuerunt, in quibus caro humida & sanie madens apparet, cumque in eiusmodi vlceribus noua caro producitur, ea solet supercrescere non sicca & firma, sed hebes, mollis, & fungola, ad quam exedendam, & ne ultra

ſetpat continendam, adhibentur medicamenta cathartica, quæ carnem eiufmodi ſupercrescentem tollant eamque ad modum ſtatumque naturalem reducant. Vlcus autem quod ſupercrescentem carnem habet, nō vnus eſt morbus, ſed ſimul *ὑπερκαρσία* & vlcus, incidat autem magnitudo quæ præter naturam eſt, ipſius exuperantis ablationem, at hæc ſola medicamentorum ope perficitur, non opera naturæ. Carnis autem generatio & glutinato naturæ ipſius ſunt opera, pharmacis tantum quæ eius actioni obſtāt ſum-mouentibus, at ſupercrescentis carnis detractio, nullum quidem naturæ opus eſt, ſed medicamenti perficitur, quæ vehementer ſiccant, ait Galenus ſexto capite libri tertij, methodi therapeuticæ. Caro autem ſupercrescere non ſolet in ijs vlceribus, quæ probè & vt decet expurgata ſemper ad ſiccius promouentur. Hippocrates apertè nos docet, quod ſæpius iam antea dixit, vulneratas partes quam maximè eſſe ſiccandas. Illud autem quod adiicitur, niſi ſunt contuſa, redigit nobis in memoriam, quod etiam prius eſt dictum, nempe oportere omnia vulnera ſiccari, præter ea quæ contuſa ſunt, in quibus pus quàm celerrime mouendum eſt. In libro *ἐπὶ τοῖς τραύματι* *ἐν τῇ κεφαλῇ*, dicit calamitoſum eſſe, in vlcere carnem humidam & pernicioſa ſanie madentem reperiri, & longiori tempore expurgari, vlcus vero ſiccius redditum, ſanum ſtatim fieri, emergente ſicca carne non humida, ſicque carnem vlceri minime ſupercrescere. Cæterum in omnibus Hippocratis codicibus græcis hic locus mutilus legitur, nos ex capite quinto libri quarti

therapeuticæ methodi eum restituiamus.

Ἡν ὑπόθεν αὐτοῦ ὅστεον ἀφιστῆται, ἢ καυθεῖν, ἢ
 πεισθεῖν, ἢ ἄλλῳ τῷ τρόπῳ, τῆς ἐλκείων
 τύπων αἱ αὐλαὶ κοιλότερα γίνονται.

SI os vstum aut sectum, aut alio quo-
 suis modo vndecumque abscesserit,
 horum vlcerum cicatrices cauæ fiunt.

EX carne perperam curata os detrimentum
 percipit, & quæcunque mala caro in se ha-
 bet, os ea contrahit, ex hippocratis libro de vul-
 neribus capitis. Itaque si vlcus probe ac vt de-
 cet, non expurgetur, supercrescit caro mollis,
 ac sanie madens, qua os ipsum corrumpitur, &
 cariem contrahit, os autem corruptum & cario-
 sum auferendum, si vlcus ad cicatricem ducere
 velimus. Duplex autem est ratio auferendi ossis,
 vna fit manu Chirurghi, qui ossis corrupti partem
 abscedere facit medicamentis siccantibus, vel
 aufert instrumentis accommodatis, vel igne, al-
 tera fit ope naturæ, quæ expellere solet quod
 noxium est, sicque os aut vstum, aut sectum
 aut alio quouis modo dicitur abscedere, fieri au-
 tem non potest, quin talium vlcerum cicatrix
 caua nō fiat, quia ossis portio sub illa carne deest,
 & vt ait Galenus commentario in aphorismum
 45. libri sexti, tantum cicatrices fieri cauas con-
 tingit, quantum abscessus profunditatem ha-
 buerit, Hanc eandem sententiam vide aphoris-
 mo nunc dicto. Si vlcera annua, aut etiam diu-
 turniora fiant, os abscedere necesse est, & cica-

trices canas fieri. Cicatrix autem siue concaua fuerit, siue excreuerit, restitui potest, siquidem vtraque cicatrix exulcerari scalpello potest, cute exulcerata supra eminentem carnem, exedentia medicamenta conijcienda sunt, super concauam implentia, donec vtrumque vlcus sanæ cuti æquetur, & tùm cicatrix inducatur, sed stultum est decoris causa rursus & dolorem & medicinam sustinere, ait Celsus libri quinti capite de cicatrice vulnere inducenda. Cicatrices autem nigrae quomodo tollantur, & potissimum in facie, docet ibidem Celsus, & Paulus libri quarti capite 47.

Ἐλκεα οὐ κεκαθαρμένα, οὐκ ἐθέλει ζυγνέ-
ναι, ζυναγόμενα, οὐδ' αὐτόματα ζυγνέχεται ὧν
τὰ περιέχοντα φλεγμαίνει τοῦ ἔλκεος, ἐπ' αὖ
μὴ παύσῃται τῆς φλεγμοσύνης, οὐκ ἐθέλει ζυ-
γνέναι· οὐδὲ ὧν τὰ περιέχοντα τοῦ ἔλκεος με-
λαντῇ καὶ αἵματος σπινθηρί, ἢ καὶ κροσίου παρέ-
χοντος τὴν ὑπερβολὴν τοῦ αἵματος, οὐδὲ ταῦτα
ἐθέλει ζυγνέναι, ἢν μὴ τὰ περιέχοντα τοῦ ἔλ-
κεος ὑγιέα ποιήσῃ.

VLcera non purgata glutinari non possunt, si in vnum adducantur, neque sua sponte coeunt. Vlcera etiam quorum circumpositæ partes inflammatione tentantur, coire non possunt, quandiu aderit inflammatio. Nec glu-

tinari possunt eiusmodi vlcera, quorum vicina partes nigricie occupantur ob sanguinis putredinem, aut etiam ob varicem fluxionem sanguinis suppeditantem, nisi quæ vlcus ambiunt sana reddideris.

TRia proponit vlceris genera quæ glutinari non possunt, primò, quæ non sunt purgata, humiditas enim aut sanies in medio posita continuitatem impedit: deinde ea quæ in circumpositis partibus inflammationem patiuntur, temperatam enim subiectam carnem esse oportet, ad vlcera tum carne implenda, tum glutinanda: postremò ea quæ ob sanguinis vitiosi, aut copiosi affluxum, colorem non laudabilem obtinent. Galenus primo capite libri 4. methodi therapeuticae, tres ægre sanabilium vulnerum modos proponit, vnum qui ex intemperie subiectæ carnis prouenit, alterum qui ex vitio affluētis sit sanguinis, tertium qui ob confluentis succi mensuram & quantitatem nascitur. *συναγόμενα ἔλκτα* vocat Hippocrates vulnera commissa & in vnum adducta, quando vulnerum partes diductæ & separatæ & nimium hiantes in vnum coguntur, & deinde commissæ retinentur fascia, sutura vel fibulis, *αὐτόματα* spontanea, sunt ea vulnera quæ sponte, naturæ vi & prouidentia citra medici operam committuntur, quia scilicet partes & oras vulneris non habeant dissitas & distantes, sed coniunctas, in quibus & sutura aliena est, eaque minime fasciam

postulant. Cæterum ut ait Galenus circa finem artis medicæ, agglutinat dissidentes partes ac pristinae unitati restituit natura, nostrum vero munus est primum quidem diductas partes in unum cogere, secundum commissas servare, ad quod deligatura & suturae utiles sunt. Circa finem dicit, partes ulceri vicinas nigricie occupari ob sanguinis putredinem. Sanguis enim a venis transfusus in varios colores conuertitur, fit enim liuidus, deinde niger, cumque in pus vertitur, albidior euadit, est enim pus cinerei coloris, cumque pars transfusum sanguinem nec concoquere potest, nec in pus vertere, nigrescat necesse est & corrumpatur, ait Galenus commentario in sententiam 32. libri secundi de fracturis. Varicis etiam occasione contumax ad sanandum vlcus efficitur, quoniam ex eo humiditas ad exulceratas partes defluit, quinto capite libri quartimethodi, & circa finem secundi capitis eiusdem libri, varices qui supra locum exulceratum sunt, prius sanabimus, quia fluxionis causa sunt, deinde mox ad vlceris curationem accedemus, de varicum curatione postea dicet sententia 49.

Τῶν ἐλχέων τὰ κυκλοτερέα, ἢν ὑποκοιλὰ ἢ, ἐν κύκλῳ πάντῃ ὀπιτάμειν καὶ τὰ ἀφεγέωτα ἢ πάντα, ἢ τὰ ἡμίσεια τοῦ κύκλου, καὶ μῆκος τῆς φύσιος τοῦ ἀνθρώπου.

Circularia vlcera si subcaua sint, circulo præcidere oportet undiqua-

que quæ abscefferunt aut omnia, vel dimidium circuli, secundum naturalem hominis longitudinem.

Rotunda ulcera & subcaua habent labra dura & callosa, quæ præcidere iubet Hippocrates, ut censet Galenus libri quarti methodi capite quinto, τὰ ἀρρετιώτα, quæ abscefferunt nominat eiusmodi labra callosa & dura, quæ sunt sine venis & arterijs & veluti emortua, πῶλος enim Fautorino est νεκρωμένη σὰρξ. Callus est caro emortua, quæ medicamenta non admittit, quibus locus ulceratus indiget, hæc autem iubet præcidere aut omnia, aut saltem dimidium orbem, secundum naturalem hominis longitudinem ob musculorum fibras, in inguine tamen & in alis sectio fieri solet per transfuersum ob cutis reduplicationem. Similis sententia est in libro περὶ βρωμάτων his verbis. Ulcera rotunda, multumque subcaua sectionem postulant, orbemque ulceris duabus lineis diuidere oportet secundum hominis longitudinem naturalem, vlcusque ipsum longum efficere. Celsus libro quinto capite 26. inquit. Pessima plaga quæ in orbem, tutissima quæ lineæ modo recta est, quo deinde proprius huic illive figuræ vulnus est, eo deterius, vel tolerabilius est. Aristoteles circa finem capitis decimi libri prioris de Demonstratione scribit, ὅτι μὲν τὰ ἑλκη τὰ περιφερῆ βραδύτερον ἰμάζεται, τοῦ ἰατροῦ εἶδέναι, διότι δὲ, τοῦ γεωμέτρου. Quod ulcera circularia tardius curentur, nouit medicus, huius autem causam reddit geometra.

Cur vero difficilius vlcera rotunda curentur docet Alexander Aphrodisicus problemate 97. libri primi. Quoniam per bilem acrem atque exedentem consistunt, exulceratur quippe in orbem, quoties bilis guttatiim confluit & exedit, itaque fit, vt medicamenta quæ admodum sicca, & prope deurendi vim habent, afferre necesse sit, medici ita volunt, naturæ vero & sapientiæ studiosi, curari hæc difficilius idcirco dicunt, quoniam principium nullum est, vnde cicatrix adduci incipiat. Circulus enim & principio caret & fine, vnde figuram hanc vlceris ferramento immutandam censent in angulos, vt pars idonea sit, vnde cicatrix oriatur.

Ἐπὶ παντὶ ἔλκει ἐρυσιπέλατος ὀπιγνόμενος, καθαροὶν δεῖ ποιεῖσθαι τοῦ σώματος, ἐφ' ὅποτερ αὖν συμφέροι τῷ ἔλκει, εἴτε ἀνω, εἴτε κατω:

IN omni vlcere cui superuenit erysipelas, purgare corpus conuenit, qua parte vlceri conducit, siue per superiora, siue per inferiora.

Hippocrates non solum vlcerum vulnerumque quæ citra alium affectum consistunt, sanandorum rationem declarat, vt quæ in siccando posita sit, sed etiam priuatim per species affectum cuiusque, nam vlceris quod cum alio affectu coniunctum est, cuius præcedere curatio

nem oportet, eius curatio ut vlceris solius non est, sed prior illius affectus, secunda vlceris, nam siue phlegmone quæpiam siue erysipelas, siue ædema vlceratam carnem obsederit, primum eius molienda curatio est. Erysipelas autem biliosæ fluxionis soboles est, cutis vitium dicitur, quando est exquisitum, aliquando etiam subiectæ carnis aliquid occupat, tuncque non exquisitum censetur. Solet autem aliquando per se consistere, & sine vulnere oriri, aliquando vulneri superuenire consuevit, de quo nunc agit, sequitur etiam aliquando ossis *φύσσις* siue dénudationem, ex aphorismo 19. libri septimi, prauum autem symptoma est, cum nudato osse caro circumstans erysipelate occupatur, ex Galeni commentario. Vult Hippocrates ut in vlcere, cui superuenit erysipelas purgetur corpus, vel per vomitum, vel per aluum ductam, qua parte vlceri magis conducet, quod hic minime definiuit, sed eius rei *διεσπών* in libro de succis nos edocuit, reuellere nos iubens ad contraria, deriuare vero ad latera, quin etiam cum maxime influit, tum ad diuersa reuellere, & si in superioribus vlcus consistat, per inferiora purgare oportet, sin autem in inferioribus sit, superiorem ventrem vacuare, at si iam fluxio restitit, atque in membro inhæsit, deriuare per vicina magis expedit, cum & in propinquiora translatio sit, & purganti medicamento promptior tum accessus tum attractio è vicino detur, ex sexto capite libri quarti methodi, sententia 46. libro autem *ἐπὶ τῶν τραυμάτων*, censet cum in vulneris capitis osse nudato, tumor rubicundus erysipelatis naturam

præ se ferens superuenerit in facie & in ambo-
bus oculis, vel in alterutro, aluum expurgan-
dam esse medicamento quod bilem moueat, sed
ita dandum medicamentum, vt prius quid va-
leant ægrotantis vires perpendamus.

Ὅταν δὲν οἴδημα γήνηται παρὰ τὸ ἔλκος,
ἀφλεμάτωρ εὖντος τοῦ ἔλκος, χροῖνῳ ὑπερον-
κύνῳ ὑπότασιν ἴσχει τὸ οἴδημα, καὶ ὅτι δὲ τῇ
φλεγμοσὶ οἰδῆσαν μὴ κατρίσκηται, πῶν ἄλλων
κατρίσμενων, ὅσα ἅμα ἤρξατο φλεγμοῖναι
καὶ οἰδίσμεσθαι, καὶ τοῦτο κίνδυνος μὴ δὲ ἅμα
ζυγίεναι.

C Vi iuxta vlcus tumor obortus fue-
rit, vlcere minimè inflammato,
paulo serius in pus vertetur tumor:
Quodque ob inflammationem tumi-
dum non resedit, desidentibus alijs, quæ
simul inflammari ac tumere cœperunt,
hoc etiam peticulum est non coales-
cere.

C Vm tumor aliquis circa vlcus exoritur, nul-
læque apparent in vlcere signa inflamma-
tionis, humor ille ex quo fit tumor, crudus est
crassus & durus atque etiam frigidus, idcôque
ad concoctionem ineptus, itaque miranduma
non est, si tumor ille suppurationi contumax, se-
rius longôque temporis progressu in pus verta-

tur. Ut autem celerius suppuret, cataplasmatibus
 vsus necessarius erit, huiusmodi tumores appel-
 lat Hippocrates *οἱ σφαιροὶ ἐν ὤλκῃ*, id est, *σφαιροὶ*
 tumores crudos & incoctos aphorismo 67. libri
 quinti, & malos esse dicit cum vlceribus super-
 tinentiunt. Vultus autem quod ob inflammatio-
 nem intumuit, si cum vicinæ partes remissa in-
 flammatione, & discussis humoribus, subsidunt
 & detumescunt, non etiam residat, agglutina-
 tionem impedire solet, quoniam ut inquit Ga-
 lenus libri tertij therapeuticae methodi capite
 octauo, fieri non potest, ut in vlcere vel carnis
 productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio,
 vel cicatricis inductio rectè vnquam cedat, nisi
 subiecta caro pro naturali modo se habeat, &
 temperatam carnem subiectam esse oportet, ad
 vlcera tum glutinanda, tum carne implenda, ca-
 pite primo libri quarti methodi. Si quis autem
 obijciat ex aphorismo 65. libri quinti: Tumores
 in vlceribus apparentes, si derepente euanes-
 cant, conuulsionem, maniam, aliaque pessima
 symptomata afferre, hic autem permanentes
 in vlceribus tumores, agglutinationem impedi-
 re, & hinc colligere velit, neque bonum esse tu-
 mores euanescere in vlceribus, neque permane-
 re, dic Hippocratem in aphorismis agere de tu-
 moribus qui repente delitescent, & quorum
 materia non resoluitur, sed fertur ad partes in-
 ternas & nobiles, hic autem loqui de tumori-
 bus, qui idoneis adhibitis remedijs curantur &
 finiuntur.

Ὅσα δὲ πιπλόντων ἢ ἄλλω τῷ τρόπῳ δια-
κόπεται, καὶ θλάται, καὶ ἀνοιδίσκεται, τὰ πε-
ριέχοντα τὸ ἕλκος, καὶ διὰ πύψαντα, πύον
ἀπὸ τῶν οἰδημάτων ἀποχωρεῖ καὶ τὸ ἕλκος,
τῶν τοιούτων ὅτι ἀν' δοκίῃ δεῖσθαι καταπλάσ-
σιος, οὐχ ἔτι αὐτὸ τὸ ἕλκος καταπλάσσειν,
ἀλλὰ τὰ περιέχοντα, ὅπως τὸ πύον ἀποχωρῇ,
καὶ τὰ σκληρυνόμενα λαπαχθῇ.

Q Væcumque casu, aut alio quouis
modo præciduntur, & collidun-
tur, & intumescunt, vicinæ vlceris par-
tes cum suppurauerint, pus ex tumori-
bus ad vlcus transfundunt, in talibus
cùm cataplasmatiis vsus necessarius vi-
debitur, non ipsum vlcus cataplasmate
nutrire oportet, sed vicinas partes, vt
pus effluat, & dura emolliantur.

Q Væ necessaria sunt, & magnam noxam
afferunt neglecta, satius est bis terve, vt fi-
delius memoriæ inhæreant, repetere, ait Gale-
nius libro quarto καὶ γὰρ. Idcirco repetit Hippo-
crates quod supra etiam dixit, vlcери non esse
cataplasma imponendum, cùm pus mouendum
est; sed vicinis partibus, vt pus liberum exitum
habeat, nec intra vlceris labra supprimatur, quia
non solum inflammationem auget, sed vicinas
etiam partes corrumpit. Nemo autem existi-
met idcirco hunc librum ab Hippocrate mini-

me fuisse correctum aut perpolitum, quod idem bis & iisdem fere verbis repetatur, non enim ante de vulneribus quæ fiunt casu, lapsu aut offensione egerat, sed de ijs quæ fiunt a telis acutis obtusis & similibus, observare enim solemus quo teli genere vulnus sit inflictum, adeo ut acuto telo quàm retuso vulnerari sit commodius, & peius est quod collisum, quàm quod discissum tantum, ex Celso libri quinti capite 26. Sic etiam Hippocrates libro *ἐπὶ βωμάτων*, ad vulnerum capitis dignotionem & distinctionem, non solum iactum aut ictum considerat, sed etiam lapsum & casum. Sic ex cadentibus quicumque ex altissimo loco in durissimum & obtusissimum decidit, magis vulneratur & colliditur, quam qui ex æquali magis loco, in mollius quippiam decidit, & quod durissimum, obtusissimum, gravissimumque ex altissimo loco decidit, magis sauciat & collidit, quàm quod leve & molle, ex æquali loco. Vulnus autem contusum quacunque ex causa excitetur, quàm celerissime suppurandum est, ut ab inflammatione minus vexetur. Avicenna libri quarti fen. 4. tractatu 2. capite 4. Casum & offensionem lædere dicit corpus cum contusione & attritione. Verbum autem postremum, quo utitur, vacuare proprie significat, sed pro *μαλαχθῆναι*, quo usus est sententia quinta huius libri, nunc sumitur, quod etiam notat Galenus in exegesi linguarum Hippocratis, *λαπαχθῆναι, κρείως μὲν τὸ κενωθῆναι, διὰ πᾶν το δὲ καὶ τὸ μαλαχθῆναι.*

Ἐπειδὴν δὲ λαπαχθῇ, καὶ ἡ φλεγμασίη
παύσῃται, ἔπειτα ἀφεσπικότες αὐτοῖς ὀπι-
δέων προσιστάναι, ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ ὑγιέος
ὕλην προσχάρεων, ὅτι δὲ τῷ σπύγῳ ἀνω-
θεὶ φύλλα ἐπέτω συχνά, ὅτι δ' αὖ μὴ δύνη-
ται προσῆλαι ἢ σαρκὲς ὑγρὴ εἶναι αὐτὴν ὅτι, ταύ-
τῃ ἐκβάλλειν.

Postquam autem emollita fuerint,
& inflammatio cessarit, tunc co-
gere oportet quæ abscesserunt alligatis
spongijs, initio ducto a parte sana, pau-
lumque procedendo. Super spongiam
autem multa folia imponantur. Si quid
autem coalescere non potest, causa est
caro humida, hancque detrahare ne-
cesse est.

Cum tumor ex lapsu, casu aut offensione
exortus in vicinis vlcereis partibus, emolli-
tus aut euacuatus fuerit, sublatâque inflamma-
tio, proutque ex tumore ad vulnus ipsum transfu-
sum fuerit & exitum habuerit, partes abscessus
in quibus collectum pus continebatur, a se di-
stant, quas cogere oportet, & impellere, ut sese
contingant & coaptentur, & ita agglutinentur.
Id fit alligatis spongijs, & initio ducto a parte
sana, hanc vincendi rationem declarat Hippo-
crates secundo libro de officina medici senten-
tia 27. Quæ abscesserunt, ait eatenus deliganda

sunt, ut quæ sublimia sunt, sedem contingant, at non premant, incipiendum vero a parte sana, & quæ vlcus est, finiendum, ut quod subest, effundatur, neque aliud ultra cocat, & Galenus in commentario, id dictum putat de tumoribus, ab ijs enim sanie effundi oportet, & glutinationis tempore nullum succum concurrere ad partem, quod sane continget, ubi imum sinum astringamus, dum comprimatur: tùm paulatim vinculum laxemus, vsque ad os sinus, quod seruari apertum debet, & ἐν τῷ ῥήματι καταρρόπη id est, in situ decliui. Suadet deinde ut paulum procedat vinculum, id est ut paulum circumbeat super sanam partem, est enim τὸ καθόλου παρόρημα, commune & perpetuum illud præceptum, ut vincula non parùm occupent sanæ partis, aut non parùm super integram partem ferantur, commentario in sententiam 22. libri tertij de fracturis. Memineris autem in tumoribus & abscessibus vinculi initium esse a parte sana, in fracturis verò a parte læsa. Dum dicit, ἀπὸ τοῦ ἐνὸςθεν φύλλα ἔπρωσιν συνηδ, fortasse melius legeretur ἰσχυρὰ, ut supra sententia octaua idem consulu-
 luit. Si quid coalescere non potest, impedimento est caro madens & humida, nam ut dixit supra sententia 15. vlcera non purgata glutinari non possunt, quoniam humiditas in medio posita continuitatem impedit, quam detrahendam præcipit, quod fit scalpello, vel medicamentis exedentibus, si nimium supercreuit, vel desiccantibus, si caro sit hebes & humida citra ὑπερκαυσίαν.

Ἦν ὑπὸ βαθεΐᾳ σαρκὶ τὸ ἕλκος ἔη, κατ' ἀμφω, καὶ κτῆς ὀπιδέσιος, καὶ κτῶ πρὸς πύσσουτος ὑποκυρσούται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἂν τις τάμνῃ πρὸς μήλην, ἢν ἐνδεχεται εὐροον, ὅπου τοῦ τραχήλου τὸ ἕλκος ἀνατάμνεται, ὅπῃ ἂν δοκέῃ χαρπὲς εἶναι, καὶ οὕτως ἰητρὲίῳ προσφέρειν ὁκοίης δ' ἂν δοκέῃ προσδεῖσθαι.

SI sub profunda carne fuerit vlcus, vtrunque & ex vinculo & ex compressione subincuruatur, tale vlcus si quis admoto specillo secet, si fieri possit fluxui accommodatum, ab ore rescandendum est, vbi opportunum videbitur, tuncque id remedij genus afferre conuenit, quo potissimum videbitur indigere.

Post curationem abscessuum, de sinu disputat, est autem κόλπος siue sinus, venter & obtecta latensque capacitas expurgato abscessu manens, distat autem curatio abscessuum à curatione sinus, abscessibus enim expedit priusquam ad maturitatem perueuerint, nihil effundi, contra in sinibus nihil intus relinqui, præterea abscessibus nullo ore prorsus est opus, sinus os requirunt, idque apertum. Item quæ abscedunt sub calido cataplasmate, & madefaciendi vim habente, coqui debent, sinus per vehementer siccantia pueros reddere siccosque oportet,

ait Galenus commentario in sententiam 30. libri secundi de officina medici. Vlcus sub altiori carne dum alligatur & comprimitur, in tumorem curuum & flexuosum atrollitur, quia humor confluens liberum habere non potest exitum. Vlcus autem quod cuti proximum est, aut quod sub modica carne est, non ita cito intumescit, quia materia quæ attrahitur, per os facile effluit. Quod in contextu legitur *ὑποκυρτούται*, mendosum est, nec est, quod putat vidius assurgere in speciem varicis, *ὑποκυρτούται* legendum videtur, & sic etiam Hippocrates prognostico 36. libri primi, *διαπυήματα ἐς ὅξυ ἀποκρητούμενα*, vocat suppurationes in acutum tendentes, curuatas aut fastigiatas. Tale vlcus sub profunda carne latens, admoto specillo ab ore resecandum est, vt humores qui influunt & retenti partes etiam sanas corrodunt, exitum habeant. Non autem omne eiusmodi vlcus sectionem postulat, sed illud tantum cuius sinus in imo est, os autem in sublimi, nec conueniens figura potest dari, vt effundantur humores, quos vinculum & compressio attrahunt. Galenus secundo ad Glaucōnem copiosè rem istam distinxit. Cùm ad locum superiorem sinus extenditur, facile per os vitiatu humor elabitur. Si verò vergit ad ima, cum intus retineatur, partem aliquam continuam erodit, in his quidem sinibus, nisi prius ad effluxum feceris sectionem, nihil proficies, neque enim carnem generare, neque cùm agglutinare voveris, in alijs vero non est opus sectione, si modo conuenientem figuram in parte patiente seruaueris, ex qua figura potes aliquando sinum

ad partem superiorem vergentem, facere ad inferiorem declinare, ac contra vergentem ad ima, conuertere ad superiora, vidisti me igitur sinum in brachio existentem, cuius os erat prope cubitum, figura in superiora tendente sanasse, sine vlla alia facta ex aduerso sectione, & in coxa similiter figura sinus ad ima vergente, cum sinus versus genu quidem terminaret, altius vero os, media coxæ regione superius. sine vlla ex aduerso diuisione, similiter vidisti factam esse curationem, subijciente me popliti cervical molle, vt inferiorem situm haberet inguen quàm genu. Vlcus autem ab ore resecatur, cum tota cauitas sectione nudatur, vt vult Hippocrates. Galenus autem ex aduerso sectionem parat, & in imo emissarium facit, quo humoris effluxum molitur. Solétque fieri hæc ex aduerso sectio, cum vlcus magnum est, & locus totus sine periculo secari non potest. Vbi sectum fuerit vlcus, ea remedia oportet adhibere, quæ vlceri potissimum conueniunt, siue detergentia, siccantia, sarcotica, aut similia.

Ὡς δὲ ταπολλὰ ὅπι παντὶ ἔλκει ὅτι ἀν κοιλίῳ ἔχῃ πρὸς τὸ ὄθῦ, καταφανέα ἰδεῖν, οἰδήματος μὴ πρὸςέοντος, ἢν μὲ εἴη ἐν αὐτῷ σπυγδῶν, ἢ ἡ σάρξ ὑπὲρ μυδῶσα καὶ σατὰρῇ, ἔσαι τοῦτο τὸ ἔλκος, καὶ τὰ περιέχοντα τὸ ἔλκος ἰδεῖν μέλαινα ὑποπέλια, καὶ πῶν ἐοθιομένων ἐλκείων, ὅπη ἀν φαγέδαινα ἐνέη, καὶ ἐσχυροῦτά τε γέμεται καὶ ἐοθίει, καὶ ταύτη τοῦ ἔλκος τὸ περιέχον χροίλῳ ἔξει μέλαιναν ὑποπέλιον.

PLerumque in omni vlcere quod sinum rectum habet, facile perspicitur, tumore non præsente, an sit in eo putredo, vel subsit ne caro hebes & putris, hocque vlcus & vicinæ partes colore nigro & subliuido apparebunt. Inter vlcera verò exedentia, vbi affuerit phagedæna, vehementerque depascitur ac exedit, tunc quæ vlcus continet pars colorem referet nigrum subliuidum.

Rescandum est vlcus profundum, non solum vt sit *εύρονον*, & ad effluxionem accommodatum, sed etiam vt facta sectione idonea remedia possint admoueri, non enim facile est perspicere quid intus in sinu lateat, quod quamuis videri possit in sinu recto, in alijs tamen difficillimum est, neque enim omnis sinus simplex est & rectus, sed variæ sunt differentiæ. Sunt quidam duplices triplicésve, alij tortuosi vel flexuosi, alij ad latus tendentes, alij sursum, alij deorsum, alij altius penetrantes, alij iuxta cutem desinentes, alij magni, alij parui, & plures aliæ differentiæ. Cum ergo in vlcere quod sinum habet rectum, perspicimus tum partem vlceratam, tum partes vicinas nigras, aut subliuidas, indicium erit aut putredinis, aut carnis putrescentis, aut nimia humiditate marcescētis nigrum enim aliquid fit, ἢ διὰ τὴν ψύξιν ἰσχυρὰν, ἢ διὰ τὰς ἐκείνου δερμασίαν, ait Galenus commentario in prognosticum 29. libri secundi, ob vehementem

frigiditatem qua ratione sanguis ingreditur, aut propter exuperantem calorem sanguis enim niger fit, si crematur, quemadmodum & alia omnia corpora, & qui diutius in sole diuersantur æstiuo, nigri redduntur, liuidus autem color indicium est languentis facultatis vitalis, & liuescere ait Galenus commentario in prognosticum octauum libri secundi, signum est extingui calorem natium qui de corde emanat. Quod nos sinum vertimus, dixit Hippocrates κοιλίην ventrem, præter enim alia significata, κοιλίη etiam apud Hippocratem est ἡ τῶν ἐλκῶν κοιλύτης, vlcus cavitatis, apud Erotianum, quamuis apud Hippocratem se legisse neget Foësius in Hippocratis œconomia, μυδάσσει σὰρξ, dicitur caro in vlcibus nimia vligine marcescens, & nimio humore liquescens, fluxa & hebes, σαπρὴν verò est putrida & corrupta. Ἐλκος ἐσθρόμενον, vlcus exedens, est quod partem cui insidet assiduè cauat, exteritque, ἔλκος νομῶδες, vlcus depascens, est quod non solum affectam partem, sedet vicinas integras absumit, & depascendo depopulatur. Contra nomas & vlcera depascentia, postea remedia præscribet sententia 41. φαγέδαινα aliquando generis nomen retinet, & omne vlcus sanas partes vicinas arrodens indicat, quodque semper maius & deterius fit. Veteres aliquando Chironium, aut Telephium nominabant. Galenus ita distinguit ab herpete, quod herpes vicinas partes arrodens sit solius cutis exulceratio, φαγέδαινα verò cum cute subiectam etiam carnem corrumpat, commentario in aphorismum 45. libri sexti, & libro de tumoribus.

Nascitur autem ab humore bilioso, acri, adusto
& maligno.

Καταπλάσματα οἰδημάτων καὶ φλεγμα-
σίνης τῆς ἐν τοῖς ὠρίεχουσιν, ἢ ἐφ' ἡ φλόμος,
καὶ τῆς τριφύλλου τὰ φύλλα ὠμαί, καὶ τοῦ ὀπι-
πέρου τὰ φύλλα ἐφ' ἃ, καὶ τὸ πολιον, ἢν δὲ καὶ
καθαίρεσθαι δέη τὸ ἕλκος, πάντα μὲν καὶ ταῦτα
καθαίρει, ἀτὰρ καὶ τῆς συκῆς τὰ φύλλα, καὶ τῆς
ἐλαίης, καὶ τὸ ὠράσιον, ἔφιν δὲ ταῦτα πάντα,
μάλιστα δὲ τούτων ἔφιν τὸν ἄγνον, καὶ τὴν συ-
κὴν, καὶ τὴν ἐλαίην, καὶ τῆς σίδης τὰ φύλλα
ὠσαύτως ἔφιν, ὠμαῖσι δὲ τοῖσι δεῖν χέεσθαι,
τῆς μαλαχῆς τὰ φύλλα τρίβων ξυνὸν οἶνω, καὶ
τοῦ πηγάνου τὰ φύλλα, καὶ τῆς δευγάνου χλω-
ρῆς, πᾶσι τοῦτοισι χεῖν τοῦ λίνου τὸν καρπὸν
σφύζαντα καὶ κόφαντα ὡς λεϊότατον μινγύναι.

C Ataplasmata tumorum & inflam-
mationis quæ est in partibus cir-
cumpositis. Verbascum coctum, & tri-
folij folia cruda, & epipteri folia cocta,
& polium. Si vero purgari oporteat vl-
cus, cuncta quidem hæc purgant. Sed &
fici & oleæ folia, & marrubium. Coque-
re vero oportet hæc omnia, maxime ve-
rò viticem, ficum, & oleam coquere
conuenit, eodemque modo mali punicæ
folia sunt coquenda. Crudis autem istis

vrēdum est. Maluæ folia cum vino con-
terito, folia item rutæ atque origani vi-
ridis. Omnibus his oportet lini semen
frictum ac tritum quam leuissimè com-
miscere.

VLceribus solent superuenire tumores, &
potissimum inflammatio, contra quam re-
media nunc præscribit, remedia autem phleg-
mones, siccioris sunt facultatis, & compendia-
ria partium phlegmone obsessarum curatio, per
siccantia præsidia perficitur, neque enim sicubi
cataplasmate quod calefaciat, humectetve, illi-
nuntur quæ phlegmone infestantur, ex prima
ratione id fit, hoc est vt remedium affectus, sed
vt symptomatis mitigatio, & curatio phlegmo-
nes per hordei farinam, dolorem lenire studen-
tis est, non medentis, & contra malum pugnan-
tis, siue ἐκ τοῦ παρηγορητικοῦ ἑξόπου τῆς τέχνης ὅτιν,
ἐκ τοῦ διεγερτικοῦ τὲ καὶ ἀγωνιστικοῦ, vt loquitur Ga-
lenus capite quinto libri quarti methodi, vbi
hunc Hippocratis locum citat, dicitque πάντα
ταῦτα ἐκέραιεν στεφάνου, omnia hæc siccandi vim
habere, φλόμος, verbasum vim habet in folijs
desiccandi & detergendi. Galeno libro octauo
de simplicium medicamentorum facultatibus,
cocta verbasci folia in aqua aduersus tumores,
& oculorum inflammationes illinuntur. Dios-
coridi libri quarti capite 99. Vbi etiam scribit
Siluestris verbasci folia ambustis igne cataplas-
mata esse. Τρίφυλλον, trifolium vim habet cali-
dam & siccam, Galeno ibidem. In codice Hip-

pocratis græco Basiliēsi & veneto, legimus φύλλα ἐπιπύρεον. In libro quarto methodi Therapeutice, φύλλα ἐπιπύρεα. Dioscorides, Galenus, Paulus neutrius meminerunt. Non consentiunt etiā interpretes latini. Galeni interpretis epipetri nomen retinet, Cornarius Hippocratis interpretis ligustrum vertit. Vidiū αἰζων. Apud Theophrastum, ἐπιπύρεον βυτάνης εἶδος. Epipetrum autem si cum Galeno retineamus, non est αἰζων, neque ligustrum, cum scribat Plinius capite 15. libri 21. Acinon herbam vocari epipetron. Acinon autem quæ etiam ἀκονος à græcis dicitur, herba est ocimo similis, odorata sed hirsutior, ut ait Dioscorides libri 3. capite 43. Πόλιον, Polium viride magna vulnèra glutinat, aridum cum fuerit rebellia vlcera sanat illitum. Galeno libro 8. de simplicium medicamentorum facultatibus. Dioscoridi duplex polium, vnum montanum, alterum fruticosius, quod illitum vulnèra conglutinat, libri tertij capite 107. Proponit aliud cataplasma ex folijs fici, oleæ & marrubij, quod & vlceris siccandi & purgandi vim habet, folia fici vlcera purgant, desiccant, & carne implent, & potissimum lixiuium & cineribus fici compositum, crematis ramorū cauliculis, quod etiam vim habet medicamenti enæmi. Dioscoridi libri primi cap. 145. ficus arbor, calida, tenuiumque partium temperamenti est. Galeno libro octauo de simplicium medicamentorum facultatibus. Oleæ rami & astrictiōis & frigiditatis sunt participes, galeno ibidem. Dioscoridi vero libro primo, folia oleæ astringunt & vlcera sordida purgavit, & ea quæ serpunt, cohi-

bent. Πέγανον siue marrubium calidum ordine secundo iam completo, siccum vero ordine tertio, medio aut completo, vim habet detergendi & digerendi galeno ibidem, foliacum melle illinantur sordidis vlceribus purgandis: Dioscoridi libro tertio, de prassio sic scribit Apuleius Platonius marrubium in aliquo folio in volue, vt coquatur in cinere, tere cum axungia & impone, omnia vulnera curat. Ἀγρος id est castus, quod matronæ in thesinophorijs, id est sacris Cereris Athenis castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt, vitex latinis, frutex est in arborem assurgens, est autem calidus, siccus, non mediocriter, sed tertio excessu, tum admodum tenuium partium. Galeno libro sexto de simplicium medicamentorum facultatibus, & Plinio libro 24. capite nono. Σίδον ἢ ποία, malum punicum, siue malus punica, cuius folia astringentem vim habent & siccantem, in malo punico multa considerantur, & in medicina locum habent, in quibus priscorum medicorum curam diligentiamque mirari licet, qui omnia scrutati nihil intentatum reliquere, malorum autem punicorum plura sunt genera. Plinio nouem, libri 23, capite 6. Dioscorides vero in tria genera redegit, libri primi, capite 127. & Galenus etiam libro octauo de simplicium medicamentorum facultatibus, nempe in dulcia, acida, & mista siue vinosa. Sunt præterea in malo punico, acinus, nucleus, malicorium, cytinus, ba-laustium. Ex acinis maturis a corio & membrana diligenter purgatis exprimitur vinum ad multa vtile, nuclei acinorum acidi punici, in sole

ficcati, & obsonijs infersi concoctione fluentem aluum sistunt, cælesti aqua madescunt, bibunturque commodè sanguinem excreantibus, expressus nucleorum succus coquitur cum melle, adoris vlcera, malicorium asperum est mali punici putamen, sidion appellat Hippocrates sententiâ 27. huius libri. Cortice punici ex vino decocti & impositi, perniones sanantur. Plinio ibidem. Cytinus flos est sativæ mali punicie, balauustum Sylvestris Dioscoridi. Plinio verso primûs pomi huius partus florere incipientis, cytinus vocatur græcis miræ observationis multorum experimento, in hoc ipso cytino flosculi sunt antequam malum ipsum prodeat erumpentes, quos balauustum vocant, hos quoque experti, inuenerunt sanare oris vlcera, tonsillas, vuam, siccauere etiam, vt sic quoque experirentur & inuenerunt tusorum farina dysentericos a morte reuocari. Postremum cataplasma fit, ex folijs maluæ, rutæ, origani, cum vino tritis, quibus addit lini semen tostum, ac tusum, malua digerentis, & emollientis est facultatis, modicum vero & quasi tepidum quendam calorem obtinet. Ruta tertio ordine calefacit & valenter desiccatur. Galeno 8. libro de simplicium medicamentorum facultatibus. Origanum calefacit & extenuat, ibidem. Lini semen in primo ordine, quodammodo calidum, & in medio est humiditatis & siccitatis, excrementitia tamen humiditate abundat, ex Galeno libro septimo de simplicium medicamentorum facultatibus. Idcirco Hippocrates fricto ac trito vtitur. Proposuit autem tres cataplasmatum formas, quoniam Ascle-

riades contendit ultimæ fortis esse medicum, qui non ad singula quæque vitia, binas ternasve compositiones, & expertas protinus paratas habeat, ait Scribonius Largus in præfatione libri de compositionibus medicamentorum.

Ὅκου δὲ ἐρυσίπελας κίνδυνος ἐφ' ἑλκεσι
γενέσθαι, τῆς ἰσάτιδος τὰ φύλλα τρίβων ὡμα
καταπλάσσειν σὺν τῷ λίνῳ, ἢ τὸ λίνον δέ-
υσαν ἐρύχνου χυλῷ, ἢ ἰσάτιδος καταπλάσσειν,
ὅταν δὲ τὸ ἕλκος καθαρόν μ' ᾖ, φλεγμοναίνει
δὲ τότε ἕλκος, καὶ τὰ περιέχοντα τοῦ ἕλκος,
φακὸν οἶνω ἐψήσας καὶ τρίψας λεῖον, ἐλάϊω
ὀλίγω φυρήσας καταπλάσας ὀπίσκειν, καὶ τοῦ
κυνοσβάτου ἐψήσας τὰ φύλλα ἐν ὕδατι τρί-
ψας λεῖα καταπλάσσειν, ὀθόνιον ὑποτείνας λε-
πτόν, καθαρόν, οἶνω καὶ ἐλάϊω τέγξας, καὶ ὅταν
ξυνάγειν βούλῃ, τοῦ κυνοσβάτου τὰ φύλλα,
ὥσπερ τὸν φακὸν σκευάζειν, σαυεῖδιον, οἶνος,
καὶ λίνου καρπὸς πωδαμίγνυται λεπτός, καὶ τὸδε,
ὁ τοῦ λίνου καρπὸς, καὶ ἄγνος ὡμὸς, καὶ μηλεία
τυπῆσει, ὅξει ταῦτα δευτέντα.

CUm periculum fuerit, ne vulneri-
bus superueniat erysipelas, glasti
folia contrita cruda imposito cum lino,
aut linum subactum cum solani vel gla-
sti succo imposito. Quum autem vul-
nus purum quidem fuerit, sed inflam-

matione tenetur tūm ipsum, tum vicinæ vulneris partes, lenticulam in vino coctam ac bene contritum oleo modico respersam vbi imposueris, alligato. Et rubi canini folia in aqua cocta ac bene trita cataplasmatis modo admoueto, subextento linteo tenui, puro, quod vino & oleo madefeceris. Et cum in vnum adducere voles, canini rubi folia veluti lenticulam præparato. Nasturtium, vinum, lini semen tritum inter se miscentur, & hoc, lini semen, & agnus crudus, & melinum alumen ex aceta subacta.

Erysipelas non longe a phlegmone abest, nasciturque ex bilioso succo, communia phlegmones & erypelatis signa sunt tūm tumor qui præter naturam sit, tum vero calor, dissident vero inter se primūm & maxime colore, quando si is ruber sit, phlegmonem vitium appellant, si pallidus flauūve vel ex pallido flauōve colore mistus, erysipelas, præterea pulsatio magnæ phlegmones proprium est symptoma, quippe quæ alte magis in corpus demittitur, erysipelas vero in cute potius consistit, quàm altè descendit, tenuis namque substantiæ est pallidæ bilis humor, itaque facile ad ipsam cutim transfluit, carnosius, rarīque corporibus transmissis. Cutis vero densitas non est huic bili peruia, nisi si admodum tenuis aquosaque sit, talis namque maxime est etiam quæ quotidie cum sudore exit,
primo

primo capite libri 14. therapeuticae methodi. Cùm autem præcedenti sententia docuerit, quibus remedijs sit vtendum in curanda inflammatione, quæ vulneribus vlceribusve superuenit, nunc declarat quomodo occurrendum sit erysipelati, cum periculum est ne vulnere superueniat. Satiùs est autem imminens erysipelas præcauere, quàm præsens curare. Periculum est ne superueniat erysipelas cùm temperamentum ægrotantis biliosum est, cum anni constitutio bilis est procreatrix, cum humor ad vlcus conflaens, biliosus est, cùm sentitur circa vlcus calor, & color flauus vel pallidus apparet, tunc ex consilio Hippocratis, glasti folia contrita cruda cum lino imponenda sunt. Glastum autem satium quo infectores lanarum vtuntur, facultatis est desiccantis atque astringentis, eius folia illita tumores omnes discutiunt, ignem sacrum sanant. Dioscoridi libro 2. cap. 180. Cùm valentiùs desiccat, quàm laborantis natura requirar, folijs eius tritis miscet Galenus panem, hordeaceam farinam, aut triticeam, aut polentam, libro sexto de simplicium medicamentorum facultatibus. Hippocrates vero lini semē miscet, quod vt diximus, excrementitia humiditate abundat, & ita siccantem facultatem glasti temperat. Glastum contra ignem sacrum radice & folijs prodest. Plinio libri 20. capite 7. vbi glastum quartum lactucæ genus constituit, & istum tertium. Secundum cataplasma ex lini semine subactò cum solani succo, vim habet refrigerandi & leuiter astringendi siue repellendi, cum succo glasti magis desiccat. Τρόχον Galeno, Hippocrati

præposito σ, σπύχων, vt etiam Dioscoridi, & σπύχος, latinè solanum dicitur, sunt autem quatuor genera, hortense, halicacabon, & τρωπικόν, & μαυικόν, hîc autem hortense intelligēdum, quod vim habet refrigerandi, & astringendi ordine secundo, vulgus morellam vocat. Plinio libri 27. capite 13. Solanum græci strychnon vocant, vt tradit Cornelius Celsus, huic vis reprimendi, refrigerandiue; hic locus est apud Celsum libri secundi capite vltimo. Si quis obijciat erysipelata requirere quæ refrigerant cum humiditate, non autem quæ astringunt, quia magna astrictio erysipelata promouet, vt quæ calorem ipsorum cutem densando includat, ex libro primo καταγύν, & idcirco glastum quod desiccet & astringit, minime commodum esse erysipelati remedium. Hippocrates etiam non adhibet erysipelati iam facti, sed cum periculū est ne superueniat, quæadmodum autem inflammationes existimandæ non sunt, quæ duritiem quandam ac nigrorem in partibus reliquerunt, neque erysipelas, si iam liuorem contraxit, sic nec ante generationem aut phlegmone aut erysipelas dicitur, nec vt iam phlegmone aut erysipelas curatur, ex libro secundo ad Glauconem. Haftenus proposuit remedia contra phlegmonem & erysipelas quæ superueniunt vlceribus sordidis, quoniam hæc omnia remedia etiā purgandi vim habēt. Nunc autem præsidia præscribit, quæ inflammationi idonea sunt, cum vlcus purum fuerit, huiusmodi est lenticula in vino cocta, & bene contrita, oleo modico respersa. Lentescunt autem Galeno astringunt & desiccant, & medium tenent cali-

ditatis & frigiditatis, libro octauo de simplicium
 medicamentorum facultatibus, vinum nigrum
 & austerum in quo coquitur lenticula, faculta-
 tem desiccandi & astringendi auget, exiguum
 oleum inspergit, vt melius misceatur, vtque do-
 lorem leniat. Aliud cataplasma describit ex fo-
 lijs rubi canini in aqua coctis & contritis, quod
 vim habet astringendi, & si folia coquantur cum
 vino nigro & austero vim habent agglutinandi.
 Superextendit autem linteam tenue & purum,
 vino & oleo madens, vt temperiem partis con-
 seruet, & vt ex siccitate linteorum minimè in-
 flammetur vulnus, vtque dolor leniatur. Nam vt
 ait Galenus commentario in sententiam 72. li-
 bri secundi de fracturis, oleum dolorem leuat,
 & discutiendi vim habet. Vinum siccare potest,
 repellere, concoquere, item mollire & digerere,
 vt ergo exhauriat, quod in tumida parte subsistit
 præter naturam, vititur digerentibus aut reprim-
 entibus, at lenientibus eo nomine, quod pro-
 hibent, ne materia præ dolore, ad vitiatam se-
 dem concitetur, atque ob hanc causam, lenius
 digerentia ac reprimentia ad inflammata par-
 tem admouemus, nam quæ horum vtrumque
 fortiter præstant, dolorem irritant. Duo postre-
 ma cataplasmata glutinandi vim habent, *σαυρί-
 διον* autem Galeno in exegesi, est, *αρδαμον ἀπὸ
 τῆς κτ' ὁμοιότητος*, a similitudine, quam ha-
 bet cum lacerto, saltem in colore, qui ex virore
 pallefcit, Sauridium est nasturtium, cuius semen
 adurentis & causticæ est facultatis, herba arefa-
 cta similem vim possidet, humida vero adhuc &
 viridis propter aquæ humiditatis admistionein,

multo inferior est semine, quam etiam intelligit Hippocrates, temperatur autem vino austero & lini semine. Στυπτήν, alumen, nomen græcum habet ab astrictione, nam adest illi vehementissima, ait Galenus libro nono simplicium, & Plinio libri 35. capite 15. Omnium generum aluminum vis est in astringendo, unde nomen græcis, optimum ex omnibus, quod Melinum vocant ab insula Melo,

Ὁ μφακα λευκὴν ἐς χαλκείον θλίψας ἐρυθρόν, δι' ἡμέρας πρὸς ἥλιον πηθεῖν τὰς ἡμέρας, τὰς δὲ νύκτας αἶρειν, ὅπως μὴ δροσίζηται, ἀνατρίβων δὲ τῆς ἡμέρας ἀπαύτως, ὡς ὁμαλῶς ξηραίνηται, καὶ ἀπὸ τοῦ χαλκείου ὡς ὅτι πλείστον ἀναλαμβάνειν, πηθεῖν δὲ ἐς τὸν ἥλιον τοσούτου χρόνον, ἕως ἂν παχὺ γένηται, ὥσπερ μέλι, ἔπειτα ἐς χύτριο χαλκῆν ἐγχέας, καὶ μέλι ὡς κάλλιστον, καὶ οἶνον γλυκύν, ἀναφειψάσας πρῶτον ῥητίνην τερμινθίνην, ἔπειτα δὲ τινὶ ῥητίνῃ ὅτι τῷ οἴνω, ἕως ἂν σκληρὴ γένηται, ὥσπερ μέλι ἐφθόν, ἔπειτα τινὶ μὲν ῥητίνῃ ἐξελεῖν, τὸν δὲ οἶνον ξυγχεῖν, ἔστω δὲ πλείστος μὲν ὁ χυλὸς τῆς ὀμφακος, δεύτερος δὲ ὁ οἶνος, τρίτον δὲ τὸ μέλι.

V Vam albam immaturam in vase aris rubri contusam, colatamque, interdiu soli exponito, noctu vero auferto, ne rore aspergatur, interdiu assidue

terito, vt æqualiter siccetur, & ex vase æneo quamplurimum assumat. Tandiu autem soli exponenda est, donec crassa fiat instar mellis, deinde in ollam æneam infundēda, melque quàm optimū, & vinum dulce, sed coquenda prius in vino resina terebinthina donec dura fiat instar mellis cocti, tumque resina eximenda, vinum vero infundendum. Sit autem maxima portio succi vuæ immaturæ, tum vini, deinde mellis.

OMphacij epuleatici descriptio est, quam accurate admodum proponit Hippocrates, *ἐπιουλωτικόν* autem pharmacum, & cicatricem inducens, siccum est & astringens, nam quia cutis carne ficior & densior est, qui carnem cuti per similem reddere cupiet, eam cōtrahat, constringat, dēset & calli instar induret necesse est, quippe cum cutis velut in callum durata caro sit. Epuloticum autem remedium siccius esse debet colletico & agglutinante, capite quinto libri tertij methodi, hæc autem compositio siccans admodum & constringens est, *ἐμφραξ* siue vua immatura & potissimum alba constringens admodum est, ea in prima lanugine demetitur ante carnis ortum, contunditur in vase æris rubri, vt facultatem æris contrahat, quod astringit, reprimit, exsiccatur, vlcera purgat, cicatricem inducit. Dioscoridi libri quinti cap. 6. Colo exprimitur, eiusque melligo colligitur, interdum soli exponitur, vt

coquatur & cogatur, noctu autem summouetur, quia nocturni rores cauendi, Plinio, noctūque a subdialibus locis in tectum referenda, quandoquidem nocturni rores omphaciū concrescere non sinunt, Dioscoridi. Interdiu assidue teritur, ut æqualiter siccetur, & facultatem æris contrahat, semperque quod ceruici vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscendum, tandiu autem soli exponenda, donec mellis crassitudinem habeat, quo tempore in ollam æneam infunditur, & simul mel optimum, & vinum dulce, mel autem Galeno desiccatur & calefacit ordine secundo libro 7. de simplicium medicamentorum facultatibus. Vinum dulce idem præstat, in vino incoquit resinam terebinthinam, ut vinum aptius sit ad glutinandum constringendum & desiccandum. Ita autem miscet hæc tria, omphacium, vinum, & mel, ut maxima sit portio omphacij, deinde vini, tum minimum mellis adijciatur.

Καὶ σμύρναν τὴν σακτὴν, καὶ ἄλλως ὡς βελτίστην τείφας λείψω, καὶ δέσθαι τοῦ οἴνου τοῦ αὐτοῦ παρεγχεόντα κατ' ὀλίγον, ἔπειτα ἔφειν αὐτῇ ἐφ' ἑαυτῆς τὴν σμύρναν. ἔτι τῷ οἴνῳ ἀνακινέοντα, ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη χαλῶς ἔχειν τὸ πάχος, ζυγγᾶσαι ἐς τὸν χυλὸν τῆς ὀμφακος, καὶ ἵπτεον ὡς ἀλεσκον φρύξας ἡσύχως μινύττειν ἐς τὸ φάρμακον, καὶ ἀνθος χαλκοῦ ἔλασσον τοῦ ἵπτεου, ταῦτα δὲ ἐπειδὴν μίξης, ἔφει μὴ ἔλασσον τρεῖς ἡμέρας ξύλοις συκάνοισιν ὡς ὀλίγον.

ὑποχαίοντα , ἢ ἀνθεραξιν , ὡς μὴ φρύγεται , καὶ ἐμβαλλόμενα πάντα ἀνυδρα ἔσω , καὶ τὰ ἔλκεα μὴ τεγγέσθω , ὅπῃ ἀν' ἐπαλείφεται τοῦτο τὸ φάρμακον , ῥηῖοται δὲ τοῦτω τῷ φαρμάκῳ πρὸς πεπαλαιωμένα ἔλκεα , καὶ πρὸς τὰ νεότερωτα , καὶ ἐς πόδιον , καὶ ἐς κεφαλῆς ἔλκεα , καὶ ὠτός.

ET myrrham staten , & alioqui quàm optimam leuiter tritam diluere oportet eodem vino paulatim affuso , deinde ipsam myrrham per se coquere cum vino , agitando. Cum verò ad iustam crassitudinem iam peruenisse videatur, in succum vuæ immaturæ infundito , & nitrum optimum frictum sensim cum medicamento misceto , & floris æris minorem portionem , quàm nitri , hæc vbi miscueris , coquito non minori spatio trium dierum lignis ficulneis leuiter succensis , aut ad prunas , ne torrescant. Et omnia quæ iniiciuntur sine aqua sint , & vlcera ne madescant, cùm hoc medicamentum admouetur. Utendum autem hoc pharmaco in vlceribus inueteratis & recentibus , & ad pudendum , & ad capitis & auris vlcera.

Aliud medicamentum proponit, quod cicatrici inducendæ accominodatissimum est, fitque ex myrrha præparata ex nitro, flore æris & omphacio, myrrha autem calefacit & desiccatur ordine secundo, Galeno libro octauo de simplicium medicamentorum facultatibus. Statim vocant myrrham quam sudant arbores sponte prius quam incidantur, cui nulla præfertur, ait Plinius libri 12. capite 15. alijs stacte est pinguius ille liquor proueniens ex myrrha expressa. Dioscoridi vero libri primi cap. 67. dicitur quædam myrrha *μεδίασιμος* in planicie & solo campestri nata, præpinguis, qua expressa stacte emittitur. Nitrum Galeno desiccatur & digeritur libro 9. simplicium, frictum autem miscet, quoniam vstione tenuius redditur, est vero nitrum succus concretus sali finitimus, & Plinio libri 31. capite 10. nitri natura non multum a sale distans, nitrum autem optimum est, quod est tenuissimum, maxime spongiosum & fistulosum, flos æris, tenuioris est substantiæ, quam æs vstum, & astringendi vim habet, aptum remedium cicatrici inducendæ. Hoc autem remedium conuenit vlceribus inueteratis & recentibus, quibus cicatrix est obducenda, & quia *ἐπουλωτικόν* pharmacum maxime siccatur, potest etiam conuenire vlceribus capitis, & auris, quia siccantia medicamenta requirunt caput, & auris etiam, quæ ex cute & cartilagine componitur circa finem libri 2. de articulis. Aptum est etiâ hoc pharmacum vlceribus pudendi, quoniam vt inquit Galenus circa finem libri noni *καὶ τόπος*, vlcera pudendorum & circa sedem, citra inflammationem

consistentia, resiccantibus valde indigent pharmacis, est autem πένδιον, ut ait Hesychius, αἰδοῖον αἰδορέιον, pudendum virile. Vidius vertit cutem quæ glandē regit, & legisse videtur πένδιν, quam idem Hesychius dicit esse τοῦ αἰδοῖου τὸ δεῖμα, pudendi pellem vel præputium, & glandis tegumentum, vel ἀκροπόδιον, quod Ruffas dicit esse ἕκαστον τῆς πένδης, extremam præputij partem.

Φάρμακον ἕτερον τῶν αὐτέρον ἐλχέων. Χολή βοῶς ξηρή, μέλι ὡς κάλλιτον, οἶνος λευκός, ἀναφεψῆσαι δὲ ἐν αὐτῷ λωτοῦ τορνεύματα, λιθανωτός, σμύρνη ἴση, κρόκος ἴσος, ἄνθος τὸ χαλκοῦ ὁμοίως, τῶν δὲ ὑγρῶν οἶνος πλείστος, μέλι δεύτερον, ὀλίγιτον ἢ χολή. Ἔτερον, οἶνος, μέλι, κέδρινον ὀλίγον, τὰ δὲ ξηρὰ, ἄνθος χαλκοῦ, σμύρνα, σίδιον αὖτον. Ἔτερον, ἄνθος χαλκοῦ ὀπίον, ἡμιμοίειον, σμύρνης δύο ἡμιμοίεια, κρόκου τρεῖς μοῖραι, μέλι ὀλίγον, σινὶ οἶνω ὀπιώμενα, ἕτερον, λιθανωτοῦ μοῖρα, καίδος μοῖρα, κροκοῦ τρεῖς, τούτων ἕκαστον ξηρὸν τρίψαι ὡς λειότατον, ἔπειτα μίξας, τρίβειν ἐφ' ἡλίῳ ὡς θερμοπάτω, πῶδα χέων χυλὸν ὄμφακος, ἕως ἀνῖξωδες γένηται ὅτι τρεῖς ἡμέρας, ἔπειτα ἐν οἶνω αὐτῇρῳ μέλανι εὐώδει πῶδα χέειν κατ' ὀλίγον δίδεσθαι.

Medicamentum aliud ad eadem vlcera. Fel bubulum siccum, mel

optimum, vinum album, in quo loti ramenta sint cocta, thus, myrrha, crocus æquali pondere, flosque æris similiter; ex liquidis vero maxima sit portio vini, deinde mellis, minima vero fellis. Aliud, vinum, mel, oleum cedrinum paucum, arida, flos æris, myrrha, malicorium siccum. Aliud, floris æris cocti dimidium, myrrhæ duæ dimidiæ partes, croci tres partes, mellis exiguum, hæc cum vino coquantur. Aliud. Thuris pars, gallæ pars, croci tres partes, horum vnumquodque aridum leuissimè contunditur, tum mixta in sole calidissimo per tres dies teruntur, affuso vuæ immaturæ succo, donec glutinosa fiant, deinde in vino austero nigro odorato sensim affuso diluuntur.

DVplex est inscriptio huius medicamenti, in exemplari veneto scribitur, φάρμακον πρὸς πάλαια καὶ νεότερα ἔλκεια, medicamentū ad inueterata & recentia vlcera. In codice Basiliensi legitur, φάρμακον ἔπρεον τῶν αὐτέων ἔλκείων, medicamentum aliud ad eadem vlcera, quam lectionem nos etiam retinuimus cum alijs interpretibus. Est autem hoc medicamentum etiam ἐπουλωτικόν, quod ex simplicibus, quibus constat, perspicuum cuius esse potest, fel bubulum calidum est, & siccandi vim habet, fel enim quodlibet, succus est

in quoque animali calidissimus, ouiū fel acrius est suillo, hoc magis caprarum, cui assimile est quodammodo fel bubulum, at taurinum his valentius est. Galeno, libro nono de simplicium medicament. facultatibus, fel vlcera sanat & ad cicatricem ducit, & admisceri consuevit emplastris *ῥεαυματικοῖς* & vulnerarijs. Dioscoridi libro secundo, & præsertim aridum fel, siccañdo magis est idoneum. Siccatur autem hoc modo, fel recens præligato ore folliculi lino, tandiu demissum in feruentem aquam, dum quis spatium trium stadiorum percurset, mox exemptum siccatur vmbroso loco, asperginem non redolentē, de felle animalium sic Plinius libri 28. capite nono, præstantissimi effectus est fel animalium, vis eius excalfacere, mordere, scindere, extrahere, discutere, siccatur autem recens præligato ore lino crasso, demissum in feruentem aquam semichora, mox siccatum sine sole, atque in melle conditum. Lotus arbor est vastæ magnitudinis ferens baccam pipere maiorem. Dioscoridi, libro primo. Loti fructus ceraforum pene natura, Plinio, libro 16. cap. 30. est autem facultatis astringentis, tenuium partium & desiccantis, galeno libro 7. de simplicium facultatibus. Thus ad calefaciendum & astringendum valet, caua vlcera complet, & ad cicatricem perducit, cruenta vulnera glutinat. Dioscoridi libro primo. Galeno autem eodem libro septimo. Thus calefacit ordine secundo, desiccatur primo, paululūque astringit. Crocus, Galeno ibidem, calefacit ordine secundo, desiccatur primo, & paucam habet strictionem, de melle, myrrha, &

flore ceris dictum prius sententia 25. & 26. huius libri. Vinum album vlcerē ad cicatricē iam veniente, quod tenue est & oligophoron, dulci præstat. Galeno libri 6. methodi, cap. 3. Secundum medicamentum ἐπουλωτικόν etiam & cicatrici inducendæ idoneum, quoniam ex calidis, siccantibus & astringentibus componitur, de vino quod album assumi debet & de melle dictum prius, quemadmodum etiam de flore æris & de myrrha. Κέδρεον, oleum cedrinum est, vel ipsa cedria, quæ est pix cedri Dioscoridi libro primo: Plinio autem libri 16. capite 11. Pix liquida in Eurapa è teda coquitur, naualibus munientis, multosque ad alios vsus, lignum eius concisum furnis vndique igni extrâ circumdato feruet, primus sudor aquæ modo fluit canali, hoc in syria cedrium vocatur, cui tanta vis est, vt in Ægypto corpora hominum eo perfusa feruentur, secundus liquor crassior iam picem fundit. Hippocrates libro ἐπὶ γυναικείῃς κρίσεσι, miscet cedrinum cum semine præoniæ & in vino bibendum exhibet, & paulo post, butyrum, κέδρεον ἔλαιον ὀλίγον cum melle liquefacit, & tepidum infundit, & Galenus libro 2. κτ' τοποῦς dicit rusticos homines solere vti τῷ καλουμένῳ κεδρένῳ, Cedrino appellato, eoque illinere sinciput, frōtem, meatus auris ad caput calefaciendum, & si quando careant cedrino, assument πωέλαιον, καλοῦσι δὲ οὕτω, τὸ συγκείμενον ἐξ ἑλαίου καὶ πηλῆς ὑγρᾶς, ita vocant quod ex oleo & pice liquida constat. Cedria autem siue cedrinum oleum vim habet siccandi & calefaciendi σίδηρον, malicorium ob id latini appellant, quia coria maximè vulgus

illo perficere nouit : Plinio libri 23. capite 6. vinum habet siccandi & astringendi, aridum autem sumit, quoniam astrictionem habet imbecilliorē, perit enim humore eius discusso. Galeno libro quarto κτ' γέν. Tertium pharmacum etiam cicatricem inducit, flos enim ætis, myrrha, crocus, mel & vinum astringendi & siccandi facultatem possident, ut antea fuit dictum, memineris autem Hippocratem uti sæpius vino nigro & austero, cum est repellendum, glutinandum aut refrigerandum, dulci autem vel albo cum est inducenda cicatrix. Illud autem ἡμμοίειον quo utitur Hippocrates τὸ ἡμῶν τῆς δεσχυμῆς, dimidium drachmæ exponit Erotianus, hîc autem dimidiatam partem significat. Postremum medicamentum imprimis epuloticum, cum admodum desiccans & astringens sit, ut ex simplicibus patet. Galla autē fructus est quercus præter glandem, eaque vehementer astringit, Dioscoridi libro primo. Galeno autem lib. 7. de simplicium medicamentorum facultatibus. Galla quæ omphacitis nuncupatur admodū desiccat, & astringit, est quæ tertij in desiccando, secundiam autem in refrigerando ordinis. Clarum est autem, gallam, quæ vocatur omphacitis id est immatura, in medicamentis epuloticis semper adiiciendam, auctore eodem Galeno, libro quarto κτ' γέν, cum proponit medicamentum obducendis cicatricibus, ex collectaneis Primionis.

Ἔτερον, ἐν οἴνῳ γλυκεῖ ἑφεῖν λευκῷ πεί-
ου ρίζας, ἐπειδὴν δοκῇ χαλῶς ἔχειν, ἀποχέας
τοῦ οἴνου δύο μοίρας, ποιῆσαι τοῦδε καὶ ἀμύνης

ἐλαίου ὡς ἀνδροτάτου μοῖραν μίαν, ἔπειτα
 ἐψεῖν, ἀνακνέων ὡς μὴ φρυγὴ μαλθακῶ πυεῖ,
 ἕως ἂν δοκῇ τοῦ πάχους χαλῶς ἔχειν. Ἔτερον,
 τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ, ἀντὶ δὲ τοῦ οἴνου, ὅξος
 ὀξύτατον ἔσω λευκόν, ἐμβάψαι δὲ ἐς αὐτὸ,
 εἰρία ὡς οἰουπῶδεια, καίπειτα δέυσας τῇ ἀμύρ-
 γῃ, ἐψεῖν, καὶ ὅππῃ ἐρινεοῦ συγχέαι, καὶ τυπηεῖην
 μηλείῳ, καὶ νίτρον, καὶ ἄνθος χαλκοῦ, μίξαι
 ὅππῃ ἀμφοτέρω, τοῦτο μᾶλλον τοῦ πρῶτου
 κατὰίρει τὰ ἔλκεα, ξηραίνει δὲ τὸ πρῶτον
 οὐχ ἥσσον.

Aliud, radices ilicis in vino dulci
 albo coquito, cūmq̃ue probè tibi
 videbuntur coctæ, vini huius effusi duas
 partes sumito, & amurcæ olei quàm sic-
 cissimæ partem vnam deinde agitando
 coquito lento igne ne vrantur, donec
 iustam crassitudinem habere videantur.
 Aliud. Reliqua quidem eadem sunt: Lo-
 co autem vini acetum sit acerrimum al-
 bum, immergatur autem in illud lana
 admodum succida, deinde infusa amur-
 cæ coquatur, & succus caprifici miscea-
 tur, & alumen melinum, & nitrum, &
 flos æris, vtrumque autem coctum mis-
 cendum est. Istud magis expurgat vlcera
 quam præcedens, verùm & illud non
 minus exsiccat.

Primum hoc remedium siccandis & detergendis vlceribus est idoneum, & quodammodo colleticum est, cū teste etiam Hippocrate, nō admodum purget. Quercus enim omnes partes astringentis facultatis participes sunt, fagus & ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Dioscoridi libro primo. Valentius tamen astringunt fagus & ilex, Galeno libro 6. de simplicium facultatibus, & prater astringentem facultatē desiccant & calefaciunt. Glutinandi etiam facultate præditam esse quercum docet ibidem Galenus, scribit enim se glutinasse vulnus securi inflitum, cū nullū adesset ad manum medicamen prater ipsius quercus folia, terebat ea in leui petra, & vulnus, omnēque vicinum locum contexit. Iligneas autem radices vino albo dulci incoquit dum intabescant, sicque vis siccandi, astringendi & glutinandi vino communicatur, huius vini ita præparati partes duas miscet cum parte vna amurcæ olei maximè siccæ, & lento igne coquit agitando & commouendo, dum ad conuenientem crassitudinem perueniat. Amurca expressæ oliuæ recrementum est: Dioscoridi libro primo. Galeno autem libro 6. de simplicium facultatibus. Amurca terrestris est substantiæ, calidæ, non tamen tantum possidet caliditatis vt mordicet palā. Quod si coquatur, multo magis crassa & sicca redditur, & fuerit sane ex secundo ordine calefacientium & siccantium intenso quodammodo magis, sicque vlcera siccorum corporū curat & glutinat, aliorum vero exasperat. Amurca omnis decocta multo efficacior. Coquitur autē in vase cupreo

ad crassitudinem mellis. Si vero recoquatur cum omphacio ad mellis crassitudinem, casuros dentes extrahit. Plinio lib. 23. capite 3. Secunda cōpositio siccat vlcera & magis expurgat quam præcedens, recipit autem eadem quæ præcedens, nempe radices ilicis & amurcam, verum radices non in vino albo dulci coquuntur, sed in aceto, & eiusmodi acetum transfusum loco vini sumendum est, vt quod expedite permeet & reliquorum simplicium facultates secum ad altiora perducatur. Acetum enim mistæ est substantiæ, nempe frigida pariter & calida, eiusque vtriusque tenuium partium, cæterum calidam frigidam exuperat, porro magnam deficcandi facultatem obtinet, adeo vt sit tertij ordinis deficcantium iam completi. Galeno 8. de simplicium facultatibus. Dioscoridi vero libro quinto, acetum refrigerant & astringit, magna autem est controversia de aceto, alijs frigidum, alijs contra calidum adstruentibus, nonnullis calorem quidem quendam illi concedentibus, sed quendam etiam auferentibus, velut qui acetum vinum esse mortuum concedunt, nam hi propriam quidem vini caliditatem perdidisse, verum ex putredine assumpsisse aliam quandam affirmant, ait Galenus libro primo de simplicium facultatibus cap. 19. quorum laudare sententiam videtur, in eamque promptè accedere. Aristoteles recte dixit, acetum proprio vini calore esse frigidum, adscititio calidum, referente Galeno libri 4. de simplicium facultatibus, capite 12. vbi frigiditatem tenuiorem esse dicit, & ideo transitus celeritatem promouere. Lana succida quæ in acetum immittitur,

zur, facile suum succum aceto communicat. Itaque cum œsypus calefaciat, emolliat, & vlcera sanat. Dioscoridi libro secundo, & præterea repellat & digerat, acetum has facultates contrahens vlceribus siccandis conueniet. *Ἐεινός* & *ἑεινός*, latine caprificus ficus est Syluestris, nunquam maturescens, carpénisque muros ac parietinas, cuius tum liquor tum succus ad omnia, quam satius, vehementior est, ficus autem arbor calidæ tenuiumque partium temperaturæ est, vimque habet vehementer abstergendi & & purgandi. Galeno libro octauo de simplicium facultatibus.

Ἔτερον, τὰ μὲν εἰς αὐτὴν ὡς ἐν ὀλίγῳ ὕδατι, ἔπειτα οἶνον ξυγγέας μέρος τρίτον, ἐψῆιν ἕως ἀνὴ καλῶς ἔχη τὸ πάχος, ὑπὸ πάνδε διαπύσκεισθαι ἐξέσται τὰ νεώτερα τάχιστα.

A Liud. Lanam exigua aqua madefacito, tum vini tertiam partem affundito, & incoque donec iustam crassitudinem habeant, hæc celerrime vlcera recentia suppurant.

M Edicamentum hoc *διαπύστικόν* & suppuratorium est, ea autem quæ puri gignendo conueniunt, oportet proximè ad caloris nostri substantiam accedere, eumque quoad fieri potest, augere, pus enim caloris natui opus est. Lana autem succida vim habet emolliendi con-

coquendi & astringendi & potissimum in aqua madefacta, & admista tertia vini parte, hisque omnibus ad crassitudinem conuenientem coctis. Commodum est hoc remedium carni recenter vulneratæ & contusæ, nam vt ait Galenus libro 14. methodi therapeuticæ, capite 7. contusi musculi debent leniri medicamento, cui mista sit facultas, quæ simul concoquat, digerat, & modice astringat, præterea lana eiusmodi calefacit, sicque partis auget calorem, debet autem esse succida. Hoc vero remedium in inueteratis vlceribus si pus sit mouendum, admoueri non solet.

Ἄλλο, Ἀρόν ξηρόν ὀπιπιάσειν, καὶ τέλλειν
κεράδης ἐν ὀπῶ φλοῖον τρίβων ἐν οἴνῳ, ἐντέλλειν
καὶ ἀνευ οἴνου αὐτὸν, καὶ ξιῶ μέλιτι.

ALiud. Arum siccum inspergito, & rami ficulnei cum succo corticem viridem ex vino tritum imposito, licet etiam sine vino hunc imponere cum melle.

HOc pharmacum vlceribus detergendis aptum est. Arum enim terrena essentia constat sed calida, proinde detergendi vim possidet, estque in exsiccando & calefaciendo primi ordinis. Galeno lib. 6. simplicium. Arum autem siccum vlceribus inspergit Hippocrates, medici enim græci arida medicamenta vlceribus &

cūti inspergunt ad varios vsus , eaque vocant
φάρμακα καταπάσια , ἢ *καταπάσματα* , id est inspersi-
 lia de quibus Paulus lib. 7. cap. 13. *Κράδαι* , expō-
 nuntur Galeno in exegeſi linguarum , *συκῆς οἱ*
ἀκρέμονες , ficus rami aut virgulta , *κράδαις τὰ τῆς*
συκῆς φύλλα , ἢ *τοὺς κλάδους* , hoc est , ficus folia
 vel ramos nonnulli capiunt , apud Hippocra-
 tem , vt ſcribit Erotianus , ficus arboris tempe-
 ramentum præcedenti ſentētia declaratum fuit,
 eius autem tum liquor , tum ſuccus tam vehe-
 menter abſtergit , vt etiam exulceret , Galeno,
 libro octauo de ſimpl. medic. facultat. mel au-
 tem non ſolūm deſiccāt & calefacit , ſed etiam
 detergendi facultatem habet. Galeno, ibidem.

Ἔτερον , ὅξος ἀφεψῶν λωτοῦ τορνεύματα ,
 ἔσω δὲ λευκὸν τὸ ὅξος , καίπειτα μίξαι ἀμόρ-
 γην ἐλαίεων , καὶ ὀρρόν πίσεως ὤμων , καὶ ἐπ' αὐλεί-
 φειν , καὶ κατασάζειν , καὶ ὀπιδεδιμεῖν , ξηρὰ
 ὑποτρέπει τὰ νεότερωτά διαπύσκεισθαι , ἢ ὅξει
 ὑπονίφαις , οἶνω ὑποπνογίσις.

A Liud. In aceto albo loti ramenta
 coquito , deinde amurcam oliua-
 rum , & ſerum picis crudum miſceto ,
 tum ſuperlinito , inſtillato , ac deligato.
 Hæc ſiccantia prohibent ne recentia
 vulnera ſuppurent , vel aceto abluito ,
 & ſpongiam vino madentem ſuper im-
 ponito.

Dixit Hippocrætes ſententia ſexta huius li-
 bri, vulnus acuto telo diuiſum , aut præci-

sum admittere medicamentum enæmon, quod deficcans suppurationem prohibeat, huius medicamenti exemplum nunc proponit. Tale autem pharmacum deficcandi & astringendi vim habet. Aceti albi vires, loti arboris & amurcæ, prius sunt expositæ, ὁρρὸν πίσης, τὸ ὑγρότατον τῆς πίσης exponit Erotianus, intelligitur autem humidum illud picisferosum, aut picis liquidæ recrementum, quod supernatat, veluti lacti serum. Dioscorides libro primo πωτέλαιον id vocat. Galenus vero libro primo κεῖ τρυφύς, capite de tincturis capillorum, picis florem dici scribit πώσαυδος, quod est tenuiorum partium, quam pix ipsa tum compage & συστάσει, tum facultate, quo in loco Galenus pisselæon aliud quid esse a picis flore scribit. Scribonius Largus capite 40. picis florem πωτέλαιον appellat, scribitque florem picis esse id quod excipitur, dum coquitur pix, lana superposita eius vapor, eamque vim habere dicit, ut non patiatur suppurationem fieri, pix autem sicca, plus deficcet, quam calefacit, humida, vero plus calefacit quam deficcet. Galenus octavo libro de simplicium facultatibus. Prohibemus etiam suppurationem fieri, si vulnus recens aceto abluamus, & spongiam vino madentem super imponamus, acetum enim tertio ordine deficcet, ut ante dictum est, & astringit, spongia etiam per se deficcet, & ratione vini, quod nigrum & austerum est adhibendum.

Ἄλλο. Τὸν μόλιβρον τὸν λεῖον ζυῖ τῇ πο-
δῶ τῇ κυπέει λεανθέντα ὀπιπάσσειν, καὶ τοῦ
λωτῆ ταῖ ἰχθυήματα ὀπιπάσσειν, καὶ πλεῖον λε-

πίδα τοῦ Χαλκοῦ, καὶ τινὶ στυπτηρίῳ, καὶ τὴν χαλκίτιν μετὰ τοῦ χαλκοῦ, καὶ μόνῳ, καὶ μετὰ τῶν τοῦ λωτοῦ ἰχθυημάτων, καὶ ἄλλως ὅταν δέηται ξηροῖσι, τοῖσι ποιοῦντοισι χρέεσθαι, καὶ τῇ ἀποδῶ τῇ ἰλυνεώτιδι λείη μετὰ τῶν ἰχθυημάτων, καὶ αὐτοῖσι μόνοισιν ἰχθυήμασι, καὶ ἀντὶ ἀργύρου μόνῃ ὡς λειοτάτῃ, καὶ τινὶ ὠκετολαχίνῃ ξύων τε καὶ τριβῶν λίῳ ὀπιπάζειν.

A Liud. Plumbū tenue cum spodio cyprio contritum inspergito, loti etiam ramenta inspergito & squamam æris, & alumen, & chalcitidem cum ære, & solam & cum loti ramentis. Alioquin cū erit opus aridis, talibus vtendum est, & spodio illyrico trito cum ramentis, & ipsis solis ramentis, & flore argenti solo quā tenuissimo. Aristolochiam item rasam & contritam inspergito.

D Escribit nunc plura ὀπιπασά, quæ etiam καταπασά siue καταπλάσματα vocari diximus. Sunt autem arida ex sicco medicamentorum pulvere conflata, inspersilia dicere possumus, hæc autem quæ nunc proponuntur, suppurationem impediunt, & vlcera conglutinant, μόλιθος ἢ μόλιθος καὶ μόλυθος, plumbum refrigerat & astringit, & ita reprimendo suppurationem fieri non patitur, plumbi item crudi lamina magnopere commendatur non ad simplicia modo, verum

etiam ad maligna & cancroſa vlcera, tum ſananda, tũm etiam cicatrice tegenda, ad eadem omnia multo præſtantior eſt crudi plumbi tenuiſſimus pulvis, multorum experimento, inſperſus enim malignis vlceribus, illa blandè citra vllum doloris ſenſum corrigit, expurgat, & ad cicatricem perducit, Huius conficiendi ratio hæc eſt, plumbum in laminas quam tenuiſſimas ducitur, hæ minutiffimè cõciduntur, aceto quam acerrimo immerguntur, macerantũrque triduo, permutato quotidie ſi videtur aceto, poſtea exẽptæ & igne ſiccatae, citra vſtionem, in mortario laborioſè teruntur, ſic tandem in tenuiſſimum leuiſſimũque puluerem rediguntur, cuius vis eſt, ad ea quæ dixi ſingularis & eximia, *ἡ σποδος* ſive *τὸ σπόδιον* eſt recrementum metallorũ vſtorum, & a pompholyge ſola ſpecie non genere diſtat, & vtrãque ex eadem materia prodeunt, eãque eſt vt plurimum æs, aut cadmia, aliquando tamen ex auro, argento, & plumbo nigro ſecernitur. Spodos lota & à ſordibus, id eſt, a carbonibus, pilis, terra expurgata eaſdem vires habet, quas pompholyx, ea autem ſine morſu deſiccatur. Galeno, libro 9. de ſimplicium facultatib. Spodos hĩc duplex numeratur, vna Cypria quæ eſt optima, altera Illyrica, *ἰλλυριώτις*, ſeu potius *λαυριώτις*, ſit enim in argenti fornacibus ſpodos, quam vocant Lauriotin. Plinio libro 34. cap. 13. De loco arbore quæ astringit & deſiccatur dictum prius. Squama æris vim habet astringentem, extenuantem, reprimẽtem & erodentem. Dioſcoridi lib. 5. Alumen vim habet astringendi, vnde nomen Græcis, de quo dictum fuit ſententia 23.

huius libri. *Æs* vim habet astringendi, desiccandi & reprimendi *Chalcitis* etiam desiccatur & astringit, meliôrque est vsta, quam non vsta, quòd sit partium tenuiorum, libro 9. de simplicium facultatibus. *Ἀργυρίου ἄνθη* vel ἄνθος, a latinis argenti flos siue spuma dicitur, a græcis sæpius *λιθάργυρος*, cuius tres differentias constituit *Dioscorides* libro quinto, quæ sequitur *Plinius* libro 23. capite 6. Spumæ argenti tria genera, optima, quam *Chrysitin* vocant, secunda, quam *argyritin*, tertia quam *molybditin*. Vis eius est astringere, reprimere, refrigerare, cicatricem ducere, explere caua, siccare. *Dioscoridi* ibidem & *plinio*. *Aristolochia*, quam latini *malum terræ* vocant, teste eodem *Plinio* lib. 25. cap. 8. sic nominatur ἀπὸ τοῦ δοκεῖν αἰεὶ βαρύνειν ταῖς λοχίαις, quod existimetur optimè puerperijs opitulari, *Dioscoridi*. Vel quoniam est, αἰεὶ λεγούσιν, optima puerperis, *Plinio* ibidem. Tria eius genera traduntur, στρογγύλη, μακρά, κληματῆς, rotunda, longa, clementis. *Aristolochiæ* radix ad medicationes vtilissima est, & vim habet abstergendi, digerendi, calefaciendi, efficacior est rotunda.

Ἔτερον ἑναιμον, σμύρνα, λιθανωτὸς, κικίς, ἰός, ἄνθος χαλκοῦ ὀπίον, τυπινείη ἀργυρίη ὀπίη, οἰνάνθη, οἰσυνπίδες, μολύβδαινα, τούτων ἴσον ἕκαστου, ἢ διέσις σινὶ οἶνω, ὥσπερ τὸ πρῶτον, καὶ ἄλλη ἐργασίη καὶ τὰ αὐτά, ὅσος ὀξύτατον λευκὸν, μέλι, τυπινείη ἀργυρίη, νίτρον ὡς ἄκρον, ἡσύχως φρίξας, χολῆς ὀλίγον σινίφι,

τοῦτο τὰ ὑπερταρκέοντα καθαίρει, καὶ κοιλαίνει,
καὶ οὐ δάκνει. Ἄλλο. Πόιν ἢ μικρόφυλλος, ἢ
ὄνομα παρθένιον τὸ μικρόφυλλον, ἢ τὰ θύμια
τὰ ὑπὸ τοῦ ποδίου ἀφαιρεῖ, καὶ τυπίνειν ἢ
χαλκίτις, καὶ μυλιάς ὤμη, ἐλατήριον λεπτὸν
ξηρὸν πρετεῖλαι, καὶ τὸ σίδιον λεπτὸν ξηρὸν
ὑδαίνωσι.

Aliud enamon, myrrha thus, gal-
la, ærugo flos æris vstus, alumen
ægyptium vstum, & ænanthe, lanarum
fordes, plumbago, singula pari pondere
diluuntur ex vino. Simile priori, & alius
effectus per eadem. Acetum album acer-
rimum, mel, alumen ægyptium, nitrum
quàm optimum leuiter frictum, fellis
parum, simul coquito. Hoc medicamen-
tum carnem supercrescentem coercet,
cauatque & non mordet. Aliud. Herba
est angustioribus folijs, cui nomen est
parthenion microphyllon, quæ thymia
pudendi virilis aufert, & alumen voca-
tum Chalcitis, idque Melinum crudum,
elaterium etiam tritum aridum inijci-
tur, & malicorium tritum sicum si-
militer.

EΝαιμον pharmacum est illud quod cruentis
vulneribus & adhuc sanguine manantibus
inijciuntur ad ea glutinanda vnde etiā κολλητικόν

nominatur, vimque habet de siccandi & astringendi, cuiusmodi est quod nunc describitur. Myrrhæ, thuris, gallæ vires antea sunt expositæ, quæ desiccant, & astringunt, iæ autem siue ærugo, seu viride æris, est succus concretus ex liquore misto cum metallo æris, describit eius genera Dioscorides, & quomodo paretur libro quinto. Vim autem habet digerendi, astringendi, siccandi, carnem minuendi, adurendi, eaque omnia vehementissime agit non vsta ærugo, mitius autem si vratur. Alumen Ægyptium hîc assumit, paulo ante, melinum, quoniam vt ait Dioscorides libro quinto, alumini somne fere genus in Ægypto inuenitur, gignitur & in Melo insula, Alumenque validius astringens vel natione Ægyptium aut ex insula Melo. Oenanthe, quam hîc intelligit Hippocrates non est herba, de qua Dioscorides libro 3. & Plinius libri 21. capite 24. Sed Oenâthe vocatur vitis sylvestris fructus cum floret. Recondi debet fictili non picato aut calce oblito, colligitur substrato linteo, in vmbraque siccat, vt ait Dioscorides, libri 5. capite 5. *Ὀνάνθης δὲ αὐτῆς συτήκη, καὶ καταπλάσμα-
των ἐναμίων.* Vis eius astringens, estque cataplasma vulnorum recentium. Plinio libri 12. capite ultimo: Oenanthe est vitis labruscæ vva. Colligitur cum floret, id est, cum optime olet, siccat in vmbra substrato linteo, atque in cados conditur, omnis autem ex alba labrusca præstantior, quam è nigra, & eidem Plinio libri 14. cap. 16. sic è labrusca hoc est vite sylvestri vinum, quod vocatur Oenanthinum, flores eius libris duabus in musti cado maccrati, post triginta dies muran-

tur, οἰσινίδες, Galeno in exegeſi linguarum ſunt, περδαίου ῥύπος, ἡχοῦν βειον ῥυπαρόν. Ouium ſordes, aut lana ſordida, μολύβδυνα plumbago & galena, Plinio libri 34. capite 18. eſt plumbi & argenti vena communis, melior hæc, quanto magis aurei coloris, quanto que minus plumboſa & modicè grauiſ. Dioſcoridi libro quinto, vlcera ad cicatricem ducit, glutinantibus tamen medicamentis non conuenit, quod Hippocrati repugnat, qui molybdænam enæmo pharmacō miſcet, verum aliorum mixtura temperatur. Galenus nono libro de ſimplicium facultatib. molybdænam ſcribit ſimilem lithargyro vim poſſidere, lithargyrus autem, ibidem deſiccatur, aſtringit, neque maniſeſte calefacit, neque refrigerat. Hic Vidius molybdænam non diſtinxit à ſcoria plumbi, eſt enim σκωρία μολύβδου plumbi recrementum. Deſcribit Hippocrates aliã compositionem præcedenti ſimilem, quæ conſtat fere iſdem, nempe agglutinantibus & deſiccantibus, quia tamen non ex vino diluitur, ſed in aceto acerrimo coquitur, alium effectum præſtat, carnemque ſupercrescentem coërcet, & exedit, & cauatur ſine morſu. Cum enim alumen, mel, nitrum & fel admodum deſiccant, & acutum ſua tenuitate tranſitus celeritatem promoueat, ſecumque aliorum facultates in altiora perducat, merito hoc medicamentum ſupercrescentem carnem coërcet & conſumit ſua ſiccitate. Proponit deinde, quatuor ſimplicia remedia, quæ vlceris ſupercrescentem carnem coërcere poſſunt, nempe Parthenium, alumen quod vocatur chalcitis, elaterium & malicorium. Par

thenium plurium herbarum nomen est, nam ut ait Galenus in exegeſi linguarum, καλεῖται παρ-
 θήριον, καὶ ἡ ἀνθεμῖς, καὶ ἡ ἐλξίνη, καὶ ἡ λινόζωſτις, καὶ
 τὸ ἀμαράκον, ἀλλὰ καὶ Διοſκορίδης μὴποτε, φησὶν, ἀκου-
 σέον ὅτιν, ἢ τοὶ τῆς ἐλξίνης, ἢ τῆς λινόζωſτεως τὸ εἶδος
 τὸ μικρόφυλλον. Vocatur parthenion & Anthemi-
 mis, & Helxine, & mercurialis & amaracon, ſed nunquam, inquit Dioſcorides, intelligenda
 eſt helxines vel mercurialis ſpecies minuta ha-
 bens folia, ergo Parthenion vel erit Anthemis
 id eſt chamæmelum, vel amaracon id eſt ſam-
 pſuchum ſiue maiorana, vel ipſum Parthenium
 proprie dictum, de quo Dioſcorides libri ter-
 tij capite 138. His enim tribus τὸ μικρόφυλλον
 conuenire poteſt, Anthemis enim habet fo-
 liola parua & tenuia, Sampſuchum ſiue ama-
 racon habet folia ſimilia calaminthæ, quæ tenui
 folio conſtat, Parthenium proprie dictum folia
 habet tenuia, ſimilia coriandro, ex Dioſcoride.
 Anthemis vim habet calefaciendi & deſiccandi
 primo gradu, Sampſuchum calefacit ordine ter-
 tio, deſiccatur ſecundo, ex Galeno, libro 6. de ſim-
 plicium facultatibus. Parthenium proprie di-
 ctum, calefacit & digerit, quod ex ſapore amaro
 colligere licet. Parthenium μικρόφυλλον dicit Hip-
 pocrates ſanare thymia genitaliū virilium. Aiunt
 mercurialis ſuccum illitum genitalium thymos
 curare. Dioſcoridi libro 4. linzoſtis etiam par-
 thenion dicitur, & nonnulli Hermubotanion
 appellant, Plinio libro 25, cap. 5. Linzoſtis ſiue
 parthenion mercurij inuentum eſt, ideo apud
 Græcos Hermupooan multi vocant eam, apud
 nos omnes mercurialem. Helxine etiam Galenō

lib. 6. simplicium medicamentorum parthe-
nium dicitur, vimque habet abstergendi & con-
stringendi, fortasse vitiosus est locus ille Galeni
in exegeſi. Cæterum docet Paulus libri 3. cap. 59.
quibus remedijs carnoſas naturalium excres-
centias, quas thymos græci vocant, compesca-
mus, & in vniverſum thymos, myrmecias, acro-
chordonas per medicamenta valenter exulce-
rantia elidit. Στυπνείη χαλκίτις, ἢν ἀπλῶς οὕτως
ἀνομόζομαι χαλκίτιν. Alumen chalcitis, quam ſic
ſimpliciter vocamus chalcitin, & ibidem, χαλκί-
τις ſτυπνείη, ἴſον τῇ χαλκίτιδι. Chalcitis alumen
idem eſt ac chalcitis. Plinio vero libri 35. capite
15. Concreti aluminis vnum genus ſchiſton ap-
pellant Græci, in capillamenta quædam caneſ-
centia dehifcens, vnde quidam trichitin potius
appellauere, hoc ſit è lapide, ex quo & chalcitin
vocant, vt ſit ſudor quidam eius lapidis in ſpu-
mâ coagulatus, hoc genus aluminis ſiccatur. Dioſ-
coridi libro quinto, optimum eſt ſchiſton ſiue
ſciſſile, præſertim recens candidiſſimum, guſtu
perquàm aſtringens, graueolens, calculorum
expers, in capillamenta quædam caneſcentia de-
hiſcens, quale eſt quod trichites quaſi capillare
nominatur. Ἐλατήριον, οὐμόγον τὸ ἀπὸ τοῦ ἀγρίου
σικκου γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ πᾶν τὸ κατὰ κοιλίαν καὶ δαί-
ρειν. Elaterium non ſolum quod ex cucumere
agreſti ſit medicamētum, ſed & quicquid aluum
inferiorem expurgat. Galeno in exegeſi, hîc au-
tem propriè ſumitur, pro ſucco expreſſo ex fru-
ctu cucumeris agreſtis, & in orbiculos coacto,
quomodo paretur docet Dioſcorides libro 4.
Vim habet digerendi & calefaciēdi præter alios

effectus, quos præstat sumptum per os, aut aliter in corpus intromissum.

Πληροῖ δὲ μάλιχα τὰ κοῖλα τὰ κατὰ τὴν
ποίη, ἡ λαγόπυρος ὄνομα, ἔστι δὲ πιτύροισιν
ὁμοίη, ὅταν ἀναίνηται, μικρὸν τὸ φύλλον, ὡστὶς
καὶ τὸ τῆς ἐλαίας, καὶ μακρότερον, καὶ πρᾶσιον τὸ
φύλλον, σὺν ἐλαίῳ, ἕτερον, ἰσχυρὸς τὸ εἶσω τὸ
πῖα, τὸ μελιτοειδὲς ὡς ξηροτάτης, ὕδατος δύο
μοίρας, καὶ λίνου καρπὸν φρύξας μὴ σφόδρα, ὡς
λεπιοτάτου μοῖραν μία.

Maximè replet vlcera caua cùm
purgata sunt, herba, cui nomen
Lagopyrus, est autem furfuribus similis
quùm inaruit, paruum est folium instar
oleæ, sed longius. Et prasij folium cum
oleo. Aliud, ficus siccissimæ partem in-
ternam pinguem, melli similem, aquæ
partes duas, lini etiam feminis bene triti
& non admodum fricti partem vnam,
simul misceto.

Sarcoticum medicamentum, & quod produ-
cendæ carnis vim habet, nunc proponit, eius-
modi autem medicamentum modicè calefacit,
moderatè deterget & purgat, atque minimùm
siccat, nullòque modo astringit, talem faculta-
tem habet lagopyrus herba, est enim, omnium
fere sententia eadem herba quæ λαγόπυρος Dios-

coridis quæ vim *καταπικρὴν* habet id est compescendi, sistendi aut reprimendi. Galeno vero libro octauo simplicium medicamentorum, facultatis est desiccantis. Lagopi autem nullas notas tradit Dioscorides, tantum nasci in segetibus dicit. Hippocrates autem scribit paruo esse folio instar oleæ, sed longiore, eamque herbam quam inaruit furfuribus esse similem. Suspicio locum in exegesi linguarum mendosum, cum agit de Lagopyro, sicque legendum puto, *λαγώπυρος ἢ λαγώπους καλουμένη βοτάνη*, id est Lagopyrus est herba quæ vocatur Lagopus. Marrubij etiam folia oleo temperata, vlcera caua replent, marrubium autem Galeno libro octauo de simplicium medicamentorum facultatibus, calidum est secundo gradu & siccum tertio, vim habet detergendi & purgandi. Sed quomodo admiscet oleum, ex secundo capite libri tertij methodi therapeuticae, oleum cauis vlceribus sit medicamentum omnium aduersissimum, quia vlcus olei usu & sordidum, & male olens redditur. Sic respondet huic obiectioni Galenus libro secundo *καὶ γὰρ* circa finem, medicamentum sordis *καθαρτικὸν* non potest carnem gignere; nisi oleo liquatum deterfionis vehementiam remittat, & rosionem deponat. Cùm ergo marrubium sit tertio ordine siccum, & gustu amarum, & idcirco detergens, & corpus exedens Celso libro 5. capite 7. carnem producere non potest, nisi oleo temperetur. Aliud medicamentum proponit sarcoticum, quod recipit caricæ siccissimæ interiorem partem pinguem & melli similem, cui adiungit aquæ partes duas, & seminis lini

contriti & leuiter fricti partem vnā, hæcque miscæ & simul coquit, ἰσχός. Carica siue ficus arida vim habet calefaciendi, digerendi, cum quadam partium tenuitate, decoctum caricarum in aqua non solum melli simile est consistētia, sed etiam facultate, ait Galenus octauo libro simplicium medicamentorum. Lini semen additur coctioni, fitque ita medicamentum moderate siccans citra morsum aut rosionem.

Ἄλλο, τῆς ἰσχάδος τὸ εἶσω, καὶ ἄνθος χαλκὸν ὀλίγον λεπτόν, καὶ συκῆς ὀπὸν, τὸ δ' ἐκ τῆς ἰσχάδος, χαμαιλέων μέλας, χολὴ βοῦς ξηρὴ, τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ, τὰ δὲ ξηρὰ, κάρδαμον λεπτόν ὠμόν, ἐρύσιμον, ἑκατέρου ἴσον, τῆς δὲ ἰσχάδος δύο μέρη, λίνου καρποῦ δύο μοίρας, ὀπὸν συκῆς, ὅταν τούτων πινὶ γένη τῶν φαρμάκων, σπλῆνας ἀνωθεν ὀξηροὺς ὀπίθεις, σπύγγον ἀνωθεν τῶν σπληνῶν ὀπίθεις καὶ ὀπίδει, καὶ παρὰ πείσσει ὀλίγω μᾶλλον, τὰ δὲ περιέχοντα ἢ φλεγμαίνῃ, ὅτι αὖ δοκέη συμφέρειν, περιπλάσσειν.

A Liud. Caricæ pars interior, floris æris contriti modicum, fici liquor. Pars eadem caricæ, chamæleon niger, fel bubulum aridum, & alia eadem. Arida vero hæc, nasturtium tritum crudum, erysimum, utrumque pari pondere, caricæ vero duæ partes, se-

minis lini partes duæ, cum fici liquore. Quùm aliquo horum pharmacorũ vteris, splenijs aceto madentibus super positis, spongiam superiniicito, ac deligato, ac paulò aretius comprimito. Si verò circumpositæ partes inflammatione occupentur, quicquid conferre videbitur, imposito.

HÆc pharimaca vim habent siccandi & purgandi, itaque possunt referri ad ea quæ sordida vlcera purgare & siccare solent. Primum constat parte interiore ficus aridæ, modico floris æris contriti, cum liquore fici, de Caricæ viribus, & facultate floris æris dictum prius. Ο' πὺς fici, id est, succus, siue liquor, tam satiniæ quàm sylvestris ἐλκωτικός σωματίων, corpora exulcerat, Dioscoridi libro primo, vbi in græco codice male legitur ἐλκτικός. Idem scribit Galenus libro octauo simplicium medicamentorum, fici tum liquor, tum foliorum succus admodum calidus est, itaque non mordicat tantum, aut absterget vehementer, sed & vlcerat, & purgare potest. Par autem caricarum pinguis & μελιτοειδὲς acrimoniam huius liquoris contemperat. Secundum remedium quod componitur ex parte interna caricarum, & radice chamæleontis nigri, ex felle bubulo arido, cum liquore fici, admodum detergens est, expurgans, & carnem putrem exedens. Chamæleontis albi & nigri historiam vide apud Dioscoridem libri tertij capite 8. & 9. vires explicat Galenus libro octauo simplicium

cium medicamentorum. Chamæleontis nigri radix letale quippiam obtinet, itaque foris tantum adhibetur, ad ea quæ deterfionem postulant, præterea medicamentis digerentibus & emollientibus commiscetur, & phagedænica tetrâque vlcera illitu sanat, est enim sicca tertio ordine, calida vero secundo gradu absoluto. Tertium pharmacum aridum est, neque villo liqueſce. excipitur, vim habet siccandi & carnem hebetem exedendi. Nasturtium enim arefactum vt eius etiam semen, adurentis seu causticæ facultatis est particeps, herba vero humida ac viridis adhuc, quam Hippocrates *ἀκμήν* vocat, multo inferior est semine, aquæ enim humiditatis admistio, mordacitatem eius moderatam reddit. Erysimum siue Irio, sicuti gustum habet in semine similem nasturtio, ita etiam vim habet igneam & calefacientem. Galeno, libro octauo simplicium medicamentorum. Quartum & postremum remedium, quod ex duabus partibus caricarum pinguium, & totidem seminis lini, cum fici liquore componitur, non admodum desiccans aut exedens est. Quoniam medicamenta præscripta calida sunt & acrimoniam in se continent, locum affectum & vicinas partes possent inflammare, ideo huic etiam symptomati occurrendum. Splenia itaque aceto imbuta, aut panni aceto madentes superponuntur, spongiæque ex aqua, aceto aut vino expressa superiniçitur. Quod si ne his quidem impediri possit, ne inflammatio superueniat, tunc medicamentum quod conferre videbitur, est illinendum, talia multa proposuit sententia 23. & 24.

huius libri *σπληνής* hoc loco τὰ σπληνία vocantur Hippocrati, Latine Splenia & panni, siue Linteola.

Ἡ ἂν βούλη ὑγρῷ χεῖεσθαι, καὶ τὸ χρεῖκόν φάρμακον ἐπαλείφειν, ὅππῃ δὲ ὥσπερ τὰ πρῶτερα γέγραπται, καὶ τὸν αὐτὸν λόγον, ἐστὶ δὲ ἐκ πάνδε τὸ φάρμακον ποιούμενον, ἐλλεβο-
ρου μέλανος, στανδαράχης, λεπίδος, μολίσ-
δου κεκαυμένου σὺν πολλῷ γαίῳ, ἀρρενικοῦ,
κανθαρίδος, τούτω ὁποῖω δοκέει συντεθέντι χεῖ-
σθαι, ἢ δὲ δέσις κεδείνω ἐλάω, ἐπειδὴν δὲ
ἄλις ἔχη ἐπαλείφοντι, ἐκβάλλειν τὸ φάρμακον,
ἐπιπλάσων ἄρον ἐφθὸν λεῖον, ἢ τείβων ξηρόν,
τῷ μέλιτι δέυνων. Καὶ ἢν ξηρῷ χεῖ τῷ χρεῖκα,
τούτων χεῖ ἀφεστάνειν, τὸ φάρμακον ὅππῃ πλά-
σων, ποιεῖ δὲ τὸ ξηρόν, ἀπὸ τοῦ ἐλλεβορου μόν-
ον, καὶ τῆς στανδαράχης.

SI liquido velis vti, Caricum medi-
camentum illinito, deligato vero
sicut prius scriptum est eodem modo.
Componitur autem medicamentum ex
elleboro nigro, sandaracha, squama,
plumbo vsto cum multo sulphure, auri-
pigmento, cantharidibus, hoc compo-
sito vbi opus fuerit vtitur, diluatur vero
oleo cedrino, vbi satis illitum manserit
medicamentum, remoueto, & arum co-

etum contusum imposito, vel aridum terito, & melle excipito. Si carico sit opus arido, ab his abstinebis, & medicamentum impones. Paratur autem aridum, ex solo elleboro & sandaracha.

Describit caricum medicamentum quod est catharteticum, sordida ulcera detergens, & carnes exedens, *καρυκόν* melle quidam scribunt, & ex nucibus apparatus dicunt, & tamen nulla hic nucum mentio. Sunt qui putent a Carum gente, quibus in multo usu fuit, appellatum. Dicitur Hesychio *καλεικόν, ἑντελές, μικρόν*, vile & exiguum, quasi compositio sit vilis & exigui pretij. Postquam ulceribus admodum fuerit hoc medicamentum caricum, pānus aceto madens super imponatur, deinde spōgia superinicta paulo arctius alligetur, ut vitetur partium vicinarum & loci exulcerati inflammatio. Elleborus uterque tam niger quam albus, detergentis & calefacientis est facultatis, quin etiam niger, si in fistulam callo obduratam demissus fuerit, duobus tribusve diebus callum detrahit, estque uterque in tertio ordine calidus & siccus, Galeno, libro sexto simplicium medicamentorum. Elleborus niger erodentibus & septicis medicamentis commiscetur, Dioscoridi libro quarto. Ellebori autem radix præcipue utilis. Sandaracha & *ἀρρηνικόν* siue *αρσενικόν*, id est auripigmentum in eisdem metallis gignuntur, differtque tantum Sandaracha ab auripigmento, quod hæc maiori naturæ coctione colorem, rubeum con-

traxit, & tenuior est facta. Arsenicum vim habet astringentem & erodentem, crustas cum vredine vehementi, & violento morsu excitat, reprimat, quæ excrescunt, & capillos euellit. Sandarachæ vis eadem & vstio, quæ arsenici. Dioscoridi libro quinto, λεπὴς simpliciter pro æris squama sumitur hoc loco. Scribit enim Plinius libri 34. capite vndecimo, medicos vocare λεπὴν, squamam æris. Dioscoridi dicitur λεπὴς χαλκῆς, squama æris, vim habet astringentem, reprimentem, extenuantem & erodentem. Μολύβδου πεπλυμένου, plumbi eloti, legunt codex Basilienfis & Venetus ex Restitutione Hieronymi Mercurialis, Vidijs etiam ita legisse videtur, vertit enim plumbo eloto abundè. In exemplari Aldino mendosè scriptum reperitur, μολύβου κατεπλημένου, pro quo restituendum curavi, μολύβδου κεκλυμένου, vt etiam legit Cornarius, quæ est germana lectio, nec multum a vitiosa illa distat, solum enim λ, pro α, & ι, pro υ, fuit immutatum. Miror sane Vidium & Mercurialem viros doctissimos hoc non animaduertisse. Cum enim plumbum vratur substrato & interiecto sulphure, vt docet Dioscorides libro quinto, & Plinius libro 34. capite vltimo, cur elotum plumbum cum multo sulphure, tam oscitanter & imprudenter pro vsto nobis substituunt & supponunt? Plumbum autem vstum acriores habet effectus quam elotum, Astringit enim & vlcerum excrescentem carnem coerces, valet etiam ad vlcera serpentia, sordida, & rebellia. Cantharides causticam habent facultatem, easque enumerat Celsus libro quinto, inter ea medicamenta

quæ corpus adurunt, experientia etiam testatur eas exulcerare, quod in phænigmorum vsu viderelicet. Vbi caricum medicamentum parti satis inhæserit, ipsam adurit, sordemque copiosam gignit, quæ tandem siccanda est, & idcirco arum coctum & contusum, vel aridum tritum & melle exceptum imponit. Arum autem terrena essentia constat & calida, proinde extergendi vim possidet. Galeno libro sexto simplicium medicamentorum. Cum caricum siccum admouetur, tunc ab vsu ari abstinemus, aridum enim hoc pharmacum nō solum carnem exedit, sed etiam purgat, saniemque consumit.

Ἔτερον ὑγρόν. Ποίη, ὥς τὸ φύλλον ὁμοίον ἀρώ-
τιν φύσιν, λευκὸν δὲ, χυνοῦδες, καὶ κισσοῦ
φύλλον τὸ μέγεθος, αὕτη ἡ ποίη συνὸ οἶνω ἔπι-
πλάσσεται, ἢ τὸ ὅριον τὸ πρὸς τὸ τέλος
τρίψας συνὸ οἶνω ἔπιπλάσσει.

Aliud liquidum, herba, cuius fo-
lium aro natura simile est, album
tamen, lanuginosum, hederæ folium
magnitudine æquans, hæc inquam her-
ba cum vino imponitur. Aut, ilicis
quod circum truncum est, vino tritum,
imponito.

Pharvacum humidum quod nunc describit,
refrigerandi vim habet, & repellendi. Itaque
hanc compositionē statim Carico medicamēto

cathartico subiungit, ut excitatam partium inflammationem coerceat & temperet, herba autem quam describit, videtur esse βύχον, siue tussilago, cuius folia Ari naturam habent, sed paulo imbecilliores, est enim tussilago modice acris, eius etiam folia similia sunt hederæ, sed maiuscula, subalbida à terra, supernè virentia, ait Dioscorides libro 3. huius folia cum melle trita, erysipelas & inflammationem sanant imposita, ibidem, folia vero virentia partes phlegmone obsessas illitu extrinsecus adimunt, ob aqueæ substantiæ admistionem, qua omnia viridia, teneraque participant, alia plus, alia minus, nam sicca bechij folia sunt acriora, quam ut phlegmonis conueniant. Galeno sexto libro simplicium medicamentorum. Sic Hippocrates libro 4. de articulis, sententia 22. folia tussilaginis in vino nigro austero semicocta, fracturis cum vulnere imponit, ut repellat & desiccet, & inflammationem impediat. Quid sit autem illud, quod circum truncum ilicis est, ambiguum esse potest. Polypodium enim nascitur in vetustis quercuum caudicibus, Dioscoridi libro 4. muscus etiam, Græcè βρύον in cedro, populo alba, & quercu inuenitur, non tamen circa truncum, sed circa corticem. Itaque fallitur Vidijs, qui per id quod circum truncum ilicis est βρύον siue muscum intelligit, Per id autem quod circum truncum ilicis est, intelligo librum, qui cortici & ligno intercedit, id est, ut ait Dioscorides, τὸ μετὰ τὴν φλοιὴν, καὶ τὸ πρὸς τὸν ὕμνοειδές, membranofum illud medium inter corticem & truncum ilicis, quod μάλιστα σύφει, maxime astrin-

gendi vim habet, eidem Dioscoridi libro primo, & ut ait Galenus libro sexto simplicium medicamentorum, quercus omnes partes astringentis facultatis sunt participes, sed plus tamen habet, quæ in trunci cortice membrana subest.

Ἐτέρον, ὀμφακος χυλὸς, ὅζος ὡς ὀξύτατον, αὐτὸς χαλκῷ, ἥτερον, ὅπως εἰνέῃ, ἐς ὀμφακος χυλὸν συμπιέειν τὲ ἐμβάλλειν ὡς λειοτάτῳ, καὶ θῆναι ἐν χαλκῷ ἐρυθρῷ ἐς ἥλιον, καὶ ἀνακινεῖν, καὶ ἀνελεῖν ὅταν δοκῇ χαλκῷ εἶναι τὸ πάχος.

ALiud, vuæ immaturæ succus, acetum quàm acerrimum, flos æris, nitrum, liquor caprifici. In succum vuæ immaturæ alumen quoque conijcito leuissimè tritum, & in vase æris rubri soli exponito, atque agitato, cumque iustam crassitudinem habere videbitur, remoueto.

Compositio hæc detergens & siccans est, iisque vlceribus admoueri potest, quæ sordida & humida sunt, quod ex simplicibus quibus constat, facile colligitur. Vuæ immatura, & acetum vim habent astringendi & refrigerandi, flos æris, & nitrum astringunt etiã, & digerunt. Succus lacteus caprifici corpus exulcerat, deficcat, & vehementer absterget. Alumen etiã validissimam habet astrictionem, vnde etiã a græcis nomen habet, ut supra fuit dictum, vas etiã

aris rubri facultatem reprimentem & astringentem medicamento auget. Itaque compositio hæc ad detergendum & desiccandum idonea est.

Νέμοντα ξηρὰ ἑαδε , ἐλλέβορος μέλας ὡς
 λειότατος ὀπιπάσεται, ἕως ἂν τὶ τῷ ὑγρῷ ἐνέη
 καὶ νεμομένη , ὀπίδεσις δὲ ἡ αὐτὴ , ἢ ὥρ ὀπί
 τοῖσιν ἐμπλάστοισιν , ἕτερον ὁμοίως. Ἄλως χόν-
 δρος ὡς ξηροτάτους ἐς χυτρίδιον χαλκεον , ἢ κε-
 ραμεῖον κενεὸν ἐμβάλλειν, ἴσως ὡς μάλιστα τὸ
 μέγεθος , μὴ ἄδρος , καὶ μέλι ὡς χέλλιστον δι-
 πλάσιον τῶν ἄλων εἰχάσας , ὀπιχέαι ὀπί
 τοὺς ἄλας , ἔπειτα ὀπιθεῖναι ὀπί τοὺς ἀνθρα-
 κας τὸ χυτρίδιον , καὶ εἰν , ἕως ἂν κατακαυθῇ
 πᾶν , ἔπειτα ἀνασπύγγισας τὸ ἔλκος καὶ ἐκκα-
 θῆρας , ὀπιπάσας , καὶ ὀπιδῆσαι ὥσθ τὸ πρῶ-
 τερον , καὶ πῖσαι ὀλίγω μᾶλλον , τῇ δ' ὑπεράμνη,
 ὅπῃ ἂν μὴ λάβηται τὸ φάρμακον, ὀπιπάσας,
 πρῶσιέζειν καὶ ὀπιδεῖν , ὅταν δὲ βύλει ἀφι-
 σάναι τὸ φάρμακον , ὅξος θερμὸν ὀπιχέειν , ἕως
 ἂν ὀποσῇ , αὐτὴς ἑα αὐτὰ ποίειν , ἢν δέηται
 ἀνασπύγγισας.

EXedunt arida hæc. Elleborus niger
 tenuissimè tritus inspergitur, donec
 humidi aliquid inerit ac depascentis.
 Deligatio verò eadem quæ in empla-
 stris. Aliud simile. Salis grana quàm sic-
 cissima in ollam æneam , aut fictilem

nouam inijcito , maximè magnitudine æqualia , non maiuscula , & super salem mel optimum affundito duplum salis , quantum coniectura poteris assequi , dein ollam supra prunas imponito , & dum totum vltum fuerit , finito , tum per spongiam deterſo ac purgato vlcere , inſpergito , atque vt prius deligato , ac paulo arctius comprimito , poſtridie quâ non admiſſum medicamentum fuerit , inſpergito , tûmque comprimito ac deligato . Cum vero medicamentum abſcedere voles , acetum calidum affundito , donec abſceſſerit , ac ruruſum eadem facito , ſi opus fuerit , vlcere per ſpongiam deterſo ,

INſcriptio huius pharmaci in codice Aldino eſt , *ἔλαιον ἐνὲ τὰς* . In exemplari Baſilienſi legitur , *ἔλαιον ἐνὲ τὰς* , quam lectionem retinet codex venetus à Mercuriali reſtitutus , vtrâque lectio mendoſa eſt , itaque legendum eſt , *ῥέμονον ἐνὲ τὰς* . Eſt autem compositio hæc depaſcens & exedens carnem humidam , ſupercrescentem , inutilem ac putridam . Primum remedium eſt elleborus niger tenuiſſime tritus , cuius vires in explicatione carici paulo ante fuerunt explicatæ . Deligatio eadem quæ in emplaſtris , quam propoſuit ſententia 35. huius libri , vt nempe ſplenia aceto madentia ſuperpo-

nantur, spongiâque superiniecta deligetur, ac-
 tiusque cõprimatur, quam etiam deligationis
 speciem repetit in admotione sequentis phar-
 maci. Illud autem pharmacum quod fit ex gra-
 nis salis, & ex melle simul vstis, ea proportione
 quam describit Hippocrates, valet ad carnem
 humidam & putrem exedendam, vnde Doctis-
 simo Fernelio, sal torrefactus, melléque duplo
 exceptus in olla noua, inter cathæretica medica-
 menta numeratur. Sal autem omnis siue fossilis
 sit, siue marinus, sub quo continetur fluuiatilis
 & lacustris astringit, reprimat, absterget, crustas
 inducit, omnesque *ὅλῃς περὶ κῆρας* tollit, teste Dios-
 coride libro quinto, & Galeno libro vndecimo
 simplicium medicamentorum, sal quicquid in
 corporibus humidum inest, id quodammodo
 absorbit, & quod reliquum est substantiæ soli-
 dæ astrictione contrahit, ac proinde etiam con-
 ditura sua carnes seruat & a putredine tuetur.
 Sal autem vstus digerit potentius, quàm vstionis
 expers, ibidem. Plinio libri 31. capite 9. Salis na-
 tura per se ignea est, omnia erodens, in meden-
 do vero mordens, adurens, repurgans, extenuas,
 dissoluens. Celsus libri quinti capite 8. Salem
 recenset inter ea quæ corpus adurunt. Mel au-
 tem abstergendi facultatem habet desiccat etiam
 & calefacit ordine secundo. Galeno libro septi-
 mo simplicium medicamentorum. Vstum autem
 cum sale potentius digerit & desiccat, & super-
 fluam carnem exedit. Si medicamentum hoc
 vlcera partibus ita inhæreat, vt ægræ subtra-
 hatur, acetum calidum affundit, quod non so-
 lum abluendo deterget, sed etiam, vt ait Diosco;

rides libro quinto , Phagedænas vlcerum , nou-
mâsque foru continuo cohibet. Cæterum *ρυ-
τείδιον κενόν* est olla inanis , vacua , hoc est pura
& noua, vel fortasse , *κὺ νέον* , aut vnica dictione,
καινόν scriptum fuit ab Hippocrate, præterea post
ἐκκαθίστας , *ἐπιπιάσαι* , restituiimus, vt legisse etiam
videtur Cornarius.

Α'λλο ξηρὸν δάκνον , μύσιος ὡς λειοτάτου
'ἐπιπιάσειν' ἐπὶ τὰ ὑγρὰ καὶ σαπερὰ , καὶ ἄνθος
λεπτόν μὴ παντελῶς λείον. Α'λλο ξηρὸν ὁμοίως
δάκνον , ἀνασπογγίστας ὡς οἰσυνπαδέστατα εἶσαι,
ἐπ' ὀφθαλμοῦ κατακαῦσαι δαιδίῳ περὶ σίχων
ἕως ἂν πάντα κατακάυσῃς, τὸ το λείον τέλειον,
καὶ 'ἐπιπάττων , τὴν αὐτὴν 'ἐπιδεῖν' 'ἐπιδεσιν ,
ἕτερον ξηρὸν 'ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἐλκέων. Χαμαι-
λέων μέλας , τυπτήνῃ ἢ τῷ ὀπῷ τῆς συκῆς
δεδευμένη , δένειν δὲ ὀπίω , καὶ ἀγχύσαν μί-
γειν , ἀναγάλλῃς καὶ τυπτήνῃ ὀπί , 'ἐπίπατον
ὀρχομένιον' ἐπιπιάσειν.

Aliud aridum mordax. Myfi te-
nuissimè tritum inspergito ad vl-
cera humida & putria , & florem æris
tenuem non omnino tritum. Aliud ari-
dum similiter mordax. Vlcere per spon-
giam deterfo , lanas admodum succidas
in testa exurito teda admota, donec to-
tas combufferis , hoc bene contritum

inspergito, & eodem modo deligato. Aliud aridum ad eadem vlcera. Chamæleon niger, alumen fici liquore dilutum, diluendum est autem vstum, & anchusa miscenda. Anagallis & alumen Ægyptium vstum, Aridum etiam in pollinem redactum orchomenium inspergito.

Medicamentum *ἰσχυρὸν* siue mordax, id dicitur quod calidum est, tenuium partium, & acrimonie particeps, frigidum etiam mordax dici potest, sed in frigidis tardior & cunctantior est mordacitas, at in calidis celerior & promptior, ex Galeno secundo capite libri quarti simplicium medicamento. *Μίση* & sæpius *μύση*, cum Chalcitide nascitur, eademque vim habet, adurit enim, crustas inducit, purgat & non nihil astringit, ex Dioscoride & Galeno. Misy tenuissime tritum vlceribus hoc loco inspergit, quia quæ in tenuissimum redacta sunt pollinem, cum insperguntur, minus rodunt, si spissiora, magis, idque vrendo, faciendoque crustam. Vide Paulum capite 13. libri 7. de flore æris dictum fuit sententia 26. huius libri. Secundum pharmacum fit ex lana succida vsta, quæ, vt ait Galenus libro vndecimo simplicium medicamentorum, vim habet acrem & calidam, vna cum partium tenuitate. Itaque molles nimirumque humidas vlcerum carnes, celerrimè eliquat. Vrit autem eam tanquam alia plurima, ollam implens nouam, quam tegat operculum multis foraminibus pertusum, hinc alio modo comburit Hippocrates.

alij assulis tedæ subiectis & subinde inter stratis oleo aspersam accendunt, cineremque in libellis aqua addita confricant manu, & confidere patiuntur, idque sæpius, mutant aquam, donec linguam astringat leniter, nec mordeat, tùm cinerem reponunt. Vis eius septica est, ait Plinius libro 29. cap. 2. Chamæleontis nigri facultates dictæ sunt sententia 35. huius libri de alumine & fici liquore alibi etiam dictum. Anchusæ quatuor species recenset Galenus libro sexto simplicium medicamentorum, prima dicitur onocleia, secunda lycopsis, tertia onochelos, quarta parua & innominata. Hic videtur intelligere primam & secundam, quæ refrigerat, desiccant, & astringunt, radicis autem potissimum hæc sunt opera, & operum facultates, nam folia radicibus sunt imbecilliora. Miscetur autem anchusa, ad chamæleontis & aluminis vsti & fici liquore diluti acrimoniam temperadam, ut etiam anagallis, tam ea quæ flore cæruleo, quam quæ phæniceo, utraq; enim mitigandi vim habet, & inflammationem arcet. Dioscoridi libro secundo. Quid autem ἐπίπαισον ὀρχομένιον vocet, non ita manifestum, vult autem denotare aridum aliquod medicamentum in pollinem redactum. Sunt qui per orchomenium adarceon vel adarcion intelligant. Variè autem hoc nomen scribitur apud authores. Apud Galenum libro vndecimo simplicium medicamentorum, ἡ ἀδάρκη, ὁ ἀδάρκος ἔχ, τὸ ἀδάρκιον, Apud Dioscoridem ὁ ἀδάρκης, latine adarca Plinio dicitur, & græcè χαλαμύχος quasi arundinum Lanugo, quod in arundinibus concretæ lanuginis modo inuenitur,

nascitur enim eidem Plinio libri 32. cap. 10. circa
 tenues arundines è spuma aquæ dulcis & mari-
 næ, vbi se miscēt, vimque habet causticam. Idem
 fere scribit Galenus eodem libro vndecimo sim-
 plicium medicamentorum, adarca est spuma
 aquæ salis concreta, circa arundines concre-
 scens, éstque acerrimum & calidissimum medi-
 camentum. Dioscoridi vero libro quinto est tan-
 quam falsilago humidis & palustribus locis sic-
 citate emergens, & arundinibus ac herbis agglu-
 tinata. Ego per orchomenium, malo intelligere
 puluerem vstum calami orchomenij, qui pulvis
 vt ait Galenus libro septimo simplicium medi-
 camentorum, admodum tenuium est partium,
 digerentis facultatis, adiunctum habens abster-
 sorium quiddam, vt exsiccet & calefaciat tertio
 ordine, plus tamen desiccet, quàm calefaciat.
 Plinius enim scribit libri 16. capite 36. orchome-
 nium esse calamum cōtinuo foramine peruium,
 quem auleticon vocant, quod sit tibijs vtilior.
 Dioscoridi hæc arundo fœmina vocatur, qua ti-
 biarum linguas efficiunt, libro primo, hic autem
 calamus dicitur orchomenius, quod in orcho-
 menij lacus arundinetis plurimus nascatur.

Πρὸς δὲ ταῖς νομάς, τυπνέειν ἢ τε αἰγυπλίην
 ὀπτήν καὶ ἢ μηλείην, πρῶτον δὲ ἄπονι τρώσασθαι
 ὀπτήν, καὶ ἀνασωγίσσασθαι, καὶ ἢ χαλκίτις τυπνέ-
 εῖν ὀπτήν, ὀπτήν δὲ ἕως ἀν φλογεῖσθαι γένεταί.

AD nomas autem, alumen & aegy-
 ptium vstū & melinum. Sed prius

nitrum vstum inspergatur, spongiâque detergatur, alumen etiam vstum quod chalcitis vocatur, vratur autem dum flammeum fiat.

Nomas sunt vlcera depascentia & serpentina, vel sunt vlcera putredinosa, quæ vicinas partes serpendo depascuntur. Plinius passim nomas vocat. Contra nomas eiusmodi nunc remedia præscribit. De alumine ægyptio & melino dictum fuit sententia 23. huius libri, de nitro etiam sententia 26. de alumine quod vocatur Chalcitis vide quæ notata sunt circa finem sententiæ 33. nitrum autem inspergitur prius, vt vlcus putredinosum abstergatur & expurgetur, quod tamen rursus spongia detergendum, vt alumen vstum carnem putrescentem facilius absumat. Alumen vri & torrerî debet Chalcitidis modo. Dioscoridi libro quinto. Torretur autem Chalcitis fictili subditis candentibus prunis subinde versata, donec igni conflagret & colorem mutet.

Τῶν παλαιῶν ἐλχέων τῶν ἐν τοῖσι ἀντικνη-
μίοις γινομένων, αἵματόδεα δὲ τοῖ γίνεται καὶ
μέλανα, μελιλότῃ ἄνθος τείψας, μέλιτι φυ-
ρῶν ἐπιπλάσσω χρῆσθαι.

AD inueterata vlcera quæ in ante-
riore tibiæ parte fiunt, sunt autem
ea cruenta & nigra, meliloti florem tri-

tum & melle exceptum cataplasmatibus
modo imposito.

AΝΤΙΚΗΜΙΟΝ appellatur quod ex carne & te-
nue in antica est tibia, vel medium & mi-
nimè carnosum in tibia, à summo deorsum in
longitudinem protensum, in gracilibus conspi-
cuum, eadem pars quia sit multum acuta, a qui-
busdani ἀγνῶστα & spina dicitur. In ea parte sunt
ulcera diuturna, ob partis situm decliuem, &
quoniam maximam corporis partem sustinet
os, quod ab interiori parte tibiæ situm est, præ-
terea ut dicet postea sententia 49. varix est in an-
teriore parte tibiæ, aut sub carne, qui vlcus fo-
uet, illudque reddit non solum sanguine suffu-
sum, sed etiam nigri coloris ob sanguinem me-
lancholicū in varicibus contentum. Huic vlce-
ri inueterato cataplasma imponit ex meliloti
floribus tritis & melle exceptis, quod vim habet
purgandi astringendi, digerendi & concoquen-
di. Μελίλωτος, latinis fercula campana, nomen
autem ferculæ occupauit, quod antiquitus coro-
næ ex hac fierent, campanæ vero, quod in cam-
pania Italia laudatissima nasceretur, mistam ha-
bet facultatem, astringit enim, digerit & conco-
quit. Galeno libro septimo simplicium medica-
mentorum. Locum istum non legerat Matthio-
lus, dum scribit capite de meliloto, neminem ad-
huc inuenisse è græcis auctoribus, qui explicaue-
rit, quæ meliloti pars in vsum medicinæ recipia-
tur, an radices, an folia, an flores, vel semina.

Ἐπὶ νεῦρα δὲ διατμήθεντα ὀπίδῃν μυρρί-
νης ἀγρίας ρίζας κόψας καὶ διαθήσας, καὶ φυρήσας
ἐλαίῳ, καὶ τὴν ποίην τὴν πεντάφυλλον, λευκὴν
δὲ ὅτι καὶ χλοώδης, καὶ ὑψηλότερα ὑπὸ τῆς
γῆς, ἢ τὸ μέλαν πεντάφυλλον, ταύτῃν τρίψας
ἐν ἐλαίῳ ὀπίδῃν, ὁπολύειν δὲ τεταῖον.

AD nervos præcisos alligato myrti
sylvestris radices contusas, cribro
traiectas, oleoque subactas, & herbam
quinquefolium, quod est album, ex vi-
rore pallescens, elatius à terra, quam
quinquefolium nigrum, hanc inquam
herbam in oleo tritam alligato, & tertia
die soluito.

NErui vulnerati curatio medicamenta po-
stulat, quæ valenter desiccant citra tamen
dolorem & molestiam, calorémque debent ex-
citare tepidum, & suæ substantiæ natura trahen-
di vim habeant, sintque tenuium partium. Gale-
no libro sexto methodi medendi. Eiusmodi phar-
maca duo nunc proponit ad nervos præcisos.
Μυρρίνη ἀγρία, vel Dioscoridi, μυρσίνη ἀγρία, Pli-
nio est myrtus sylvestris, quam quidam oxymyr-
sinem vocant, alij chamæmyrsinen. libri 15. capi.
7. & capite ultimo libri 23 ruscum vocat, ex quo
fiunt ruri scopæ. Radix myrti sylvestris in hono-
re est, ibidem, decocta enim cum vino & pota
valet contra renum dolores, vrinam difficilem,
& morbum regium, itaque tenuium est par-

tium & temperata in calore. Contunditur autem radix, cribróque secernitur, & exactè lænigatur, vt arida collyria, quod enim crassis constat partibus, nernos vulneratos nihil iunat, quia subtilia pharmaca requirunt, vt docet Galenus libro 3. *κτ' γένη*. Oleo vero diluitur & maceratur, quia medicamenta omnia, quæ nervorum vulneribus adhibentur, liquida & mollia esse convenit, molliem autem quoduis oleum conciliat. Galeno ibidem. Pentaphyllum autem siue quinque folium tenuium est partium, minimum habens euidentis caliditatis, & citra morsum deficcat. Galeno libro octauo simplicium medicamentorum. Hippocrates hoc loco duplex quinquefolium agnoscit, album & nigrum, quamuis vnus tantum quinquefolij meminerit Dioscorides, eius tamen interpretes Matthioli quatuor se genera vidisse in Italia scribit, describitque secundum genus, quod constat folijs albicantibus, hirsutis, & flore candido, album autem quinquefolium assumit Hippocrates ad nervos præcisos, illudque depingit quod sit album, ex virore pallescens, aut pallido colore infectum, & procerum, magisque distans a terra, quam nigrum pentaphyllum. Puncti autem nervi & cæsim vulnerati curationem copiose docet Galenus cap. 2. & 3. libri sexti methodi therapeutice, & libro 3. *κτ' γένη*.

Φάρμακα μαλθακάδεα, ἃ καὶ αὐτὰς καλὰς ποιεῖ, τοῖσι δὲ καὶ τοῖσι φαρμάκοις χρῆσθαι ἐν χειμῶνι μᾶλλον, ἢ ἐν ἔρει. Σκύλλης τὸ εἶδος

τὸ μῆζωδες τρίψας, ἢ πένκλιω σιὺ σιεύω γέαρ-
 πι νέω, ὀλίγον ἔλαμον, καὶ ῥητίνης ὀλίγον, καὶ ψι-
 μυθίς, καὶ γέαρ χινὸς, καὶ σὺς νέον, καὶ σκίλλαν,
 καὶ ἔλαμον ὀλίγον, κηρός ὡς λευκότατος, γέαρ
 πρῶσφατον καθαρόν, ἢ σκίλλαν, ἔλαμον λευ-
 κόν, ῥητίνης ὀλίγον, κηρόν, γέαρ σὺς παλαμόν,
 καὶ νέον, καὶ ἔλαμον, καὶ ἴος, καὶ σκίλλα, καὶ ῥητίνη,
 ἔγω δὲ δύο μοῖραι τῷ παλαμῷ γέατος πρὸς τὸ
 νέον, πῶν δὲ ἄλλων ὅκοσον δοκέη χαμὸς εἶναι,
 γέαρ σιυτήζας πρῶσφατον ὀποχέας εἰς ἑτε-
 ρὸν χυτρίδιον, καὶ τῆς μολυβδαίνης τρίψας ὡς
 λειότατον διατῆσας, συμμίζας, ἐφείν, καὶ κυ-
 χῆν τὸ πρῶτον, ἐφείν δὲ ἕως ἂν ὀπίσθῃ δέπῃ
 γῆς πηγυτοῖ, ἔπειτα καθελὼν ὀποχέας τὸ
 ἄλλο, πλὺ τῆς λίθης τῆς ὑποστάσης, καὶ ἐμ-
 βάλλειν ῥητίνην καὶ ἀνακινέειν, καὶ κέδρινον ἔλαμον
 ὀλίγον συμμίζας τὸ ἀφρημένον, πᾶσι χεῖρ τοῖσι
 μαλθακοῖσιν ὅκου ἂν ῥητίνην συμμιγνύης, ἐπει-
 δὲ ἀφελὴς ὀπὸ τῷ πυρὸς τὸ φάρμακον, εἰς
 θερμὸν ἐπὶ ἔδν καθεῖς τίω ῥητίνην κυχῆν. Ἔτερον,
 γέαρ σὺς παλαμόν, καὶ Κηρός, καὶ ἔλαμον, ταῦ δὲ
 ξηρά, ἰχθυήματα τῷ λατῷ, λιβανωτός, μο-
 λυβδαῖνα, ἥρωι τῷ μὲ μοῖρα, καὶ τῆς δὲ μοῖρα,
 καὶ τῷ ἰχθυήματος μοῖρα, ἔγω δὲ τῷ παλαμῷ
 γέατος δύο μοῖραι, κηρὸς δὲ μία, καὶ ἔλαμος μία,
 ἕτερον, ἢ γέαρ μόνον παλαμόν ὕειν, σιὺ τῷδε,
 γέαρ αἷος πρῶσφατον, ὡς ἥμισυ ξιὺ τῷ ὕμει
 κατακαθῆρας, μικρὰ τρίψας, ἢ κατακόφας

λεῖα, ἔλαμον πῶς θέλειν καὶ πῶς παύσειν τοῖς
 μόλιβδον ζυῖ τῇ ποδῶ, καὶ λωτὸν ἰχθυημάτων
 τὸ ἥμισυ, ἕτερον, τέαρ αἰγῆς, ποδὸς, χαλκίτης
 κυανέης, ἔλαμον.

Medicamenta lenia, quæ cicatrices
 decoras faciunt, potius hyeme
 quam æstate admouenda sunt. Scillæ
 interiorem partem mucosam contun-
 dito, aut piceam cum adipe suilla recen-
 ti, paucum oleum, resinam paucam &
 cerusam, & adipem anserinam, & suil-
 lam recentem, & scillam, & oleum pau-
 cum. Cera albissima, adeps recens mun-
 data. Aut scilla, oleum album, paulum
 resinæ, cera. Adeps etiam suilla vetus ac
 recens, oleum, ærugo, scilla, resina, sint
 autem duæ partes adipis veteris ad re-
 centem, aliorum vero quantum oppor-
 tunum videbitur. Adipem recentem li-
 quefacta in aliâ ollam effundito, ac mo-
 lybdenam diligenter tritam, ac cribro
 traiectam ubi miscueris coquito, ac pri-
 mum agitato. Coquito autem donec in-
 stillatum in terram conctescat, deinde
 tollens effundito reliquum, præter lapi-
 dem subsidentem, & resinam adiucito ac
 dimoueto, & modicum oleum cedri-
 num misceto cum ab igne detrahatur.

Omnibus lenibus quibus resinam admisces, vbi phārmacum ab igne sustuleris, necesse est in calidum adhuc, resinam immittere, ac agitare. Aliud, adeps suilla vetus, & cera, & oleum: Arida vero, loti ramenta, thus, molybdæna, videlicet thuris pars vna, molybdænae pars vna, & ramenti pars vna. Sint vero adipis veteris partes duæ, ceræ vna, & olei vna. Aliud, aut adeps suilla vetus dumtaxat, & cum hac, adeps caprina recens curata, vt sine membranulis sit, quam vbi parum contriueris aut læuiter contuderis, oleum infundendum est & plumbum inspergendum cum spodio, & loti ramentorum dimidium. Aliud, adeps caprina, spodium, Chalcitis cærulea, oleum.

P Rincipium huius sententiæ in codice græco & mendosum & transpositum legitur, nos ita restitutumus, quemadmodum etiam legisse videtur Vidius. Vulneribus autem recentibus & fordidis, medicamenta lenia, quæ vocant *μαλδακάδες* minime conuenire dixit, sententia nona huius libri, nunc quis sit horum medicamentorum vsus, quoque tempore sint admouenda, demonstrat, & lenium medicamentorum formulas nonnullas recenset. Lene autem siue *μαλδακάδες* vocat Hippocrates omne genus pharmacorum, quæ *ὑγερτὰ σμυρτον* & connatam hu-

miditatem habent, qualis in pingui est, singulisque oleosis medicamentis, & quidem in ipso oleo & aqua: quin & resina ceræque aliquid *μαλ-
δακάδες* habent, ait Galenus libro 4. *κ' γένη*, hæc autem lenia medicamenta decoras & venustas cicatrices inducunt, differunt autem ab ijs quæ cicatricem generant, quæque ob id *ἐπουλωτικά* vocantur, quod hæc valde sicca sint & astringentia, illa vero emolliant, relaxent, detergant & discutiât, potiùsque cicatrices reparant & emendant, quam generant. His lenibus medicamentis potius hyeme quàm æstate vtendum est, quoniam Hippocrates in calidioribus anni temporibus, ijs quibus frigidior sit facultas medicamentis vitur, calidioribus vero per frigora, vt ait Galen. libro tertio methodi medendi capi. 8. & ex admotione medicamentorum calidorum, cuiusmodi sunt ista lenia ex adipibus & oleis, periculum est ne pars computrescat, si anni tempus calidius sit, ex secundo capite eiusdem libri. Omnes istæ lenium medicamentorum formulæ decoras cicatrices generant, vel emolliendo, vel discutiendo, vel detergêdo, quod ex simplicium medicamentorum facultatibus perspicuum esse potest. Cicatrix autem turpis est, cum excreuit, vel nigra est, itaque venustas cicatrici acquiritur, cum aut reprimitur, aut colorem maxime sano corpori similem accipit. Scilla incidentem admodum facultatem obtinet, & secundo fere ordine calida est, itaque resoluit & deterget. Interior pars scillæ sumitur, quoniam vt ait Dioscorides libro secundo. Sumi solet, quod est maxime medium, directis viuo tenuis tunicis. Ad ri-

mas etiam pedum, interna pars crudæ scillæ in oleo feruēfacta, aut cum resina liquefacta imponitur. Pix omnis siue sit ex pinu siue ex picca, siue sit liquida, siue arida, calefacit & desiccatur, sed arida magis desiccatur, humida plus calefacit, Galeno octauo lib. simplic. medicament. Dioscoridi libro primo discutiēdi & emolliēdi vim habet. Πικρα siue picca hoc loco significare potest corticem piceæ arboris, qui tritus & illitus prodest vlcēribus summum corpus occupantibus, vlcera etiam delicatulorum acrimoniam recusantium, cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit. Vel quod magis verisimile est, significat liquidam resinā è picea, vt vertit etiam Cornarius. Omnibus autē resinis natura est calefacere, mollire, discutere, expurgare. Dioscoridi libro primo. ^{στέαρ} siue adeps est elcosa & pinguis in animalibus substantia, quæ vim habet calefaciēdi & humectandi. Adeps autem suilla largius humectare potest. Calor autem eius nostro similis est, recens omnis adeps minus calefacit, dum enim inueterascit, seipsa & calidior & tenuior efficitur, validiusque desiccatur. Galeno libro vndecimo simplicium medicament. Adeps anseris calidior est suilla. Cerussa vim habet refrigerandi, emolliēdi, insuper excrescentia leniter reprimi, & ad cicatricem perducit, miscetur ceratis & emplastris, quæ liparæ vocantur, Dioscoridi libro 5. Cera omnis mollit, calefacit. Candida quomodo fiat docet Dioscorides libro 2. & Plinius libri 21. capite 14. Cera quæ ablutione fit candida, deponit quam à melle habet acrimoniam. Galeno libri 4. de simplicibus me-

dicamentis, capite 6. Cera quædam alba est, quæ sua natura talis prouenit, qualis est pontica, in ponto enim plurima alba nascitur, quædam albicans ablutione efficitur, non autem sua sponte talis nascitur. Galeno, libro primo *κτ' γένν*, cum agit de emplastris albis, quæ ex argenti spuma & cerussa fiunt. *Μολυβδæνα* duplex est, vna factitia, quæ fit arte, dum eliquatur plumbum, vel dum argentum vel aurum admixto plumbò funditur, quod crassum remanet in fornacibus, molybdæna est, quam Plinius Galenam vocat, & ideo Dioscoridi dicitur gigni ex auro vel argento, non quod aurum & argentum sint materia molybdæna, sed quod cum argento vel auro plumbum reperiatur, vel auro & argento ad eliquationem, plumbi aliquid admisceatur, & excrementum illud quod fornacibus adhærescit, molybdæna est. Altera est fossilis & naturalis, quæ est vena plumbi, quæque rara est, molybdæna vim habet desiccandi, & vlcera ad cicatricem perducit, misceturque conuenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant. Dioscoridi libro 5, Plinio vero libri 34. capite 18. molybdæna vsus, in liparis, ad leniendam refrigerandamque vlcera. Vidius semper molybdænam malè confundit cum plumbi recremento, plumbum autem mirifice cicatrices reprimat. Itaque suadet Celsus lib. 5. cap. 26. vt super cicatricem plumbum album deligetur, quo & reprimatur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit, monetque vt lenibus medicamentis in facie cicatrix vngatur, in alijs vero corporis partibus emplastrum imponatur, quod idem suadet Plinius

lib. 34. dum vult ne alligentur emplastra lenia, sed illinantur in teneris corporibus, mollissimis-que partibus. Animaduerte autem miram Hippocratis diligentiam, dum admonet quomodo miscenda sit resina lenibus medicamentis. Sequens pharmacum lene, quod constat adipe suilla vetere, cera, & oleo, humidis medicamentis: & tribus alijs aridis nempe, loti ramentis, thure, & molybdæna, mira fuit arte ab Hippocrate descriptum, & singulorum mensura præscripta, quod tamen hæctenus a nemine intellectum puto, interpretes enim Latini male vertunt, mendumque in exemplari Græco manifestum non animaduertunt, quod tamen facile deprehendet qui medicamentorum simplicium ordinem & symmetriam ab Hippocrate propositam considerare voluerit. Cum enim tria humida proponat, & statim subiungat tria alia arida, aridorum mensuram primum describit, nempe thuris partem vnam, molybdænæ partem vnam, & ramenti partem vnam, definit deinde & quantitatem humidorum, assumitque veteris adipis suillæ partes duas, ceræ partem vnam, & olei, quod solum restat, partem vnam. Hic omnes codices mendosè legunt, νέυ σέατος μία, nos pro νέυ, ἐλαίς restituimus, & illud σέατος, quod male fuit additum, deleuimus, facilis fuit lapsus, dum fortasse ἐλαίς sine prima syllaba legerent, νέυ restituere voluerunt, σέατος addiderunt, quod initio huius compositionis σέαρ παλαιόν assumat Hippocrates. De loti ramentis, & thure vide commentarium in sententiam 27. huius libri. Plinius simile medicamentum lene ex tribus tantum.

recenset, libri 34. capite 18. Cuius compositio est ex molybdænæ libris tribus, ceræ libra vna, olei tribus heminis. Vidius nec vidit, nec vertit huius pharmaci maximam partem. Sequuntur duo alia pharmaca lenia, prius recipit adipem suillam vetustam, quæ minus humida est, adipem etiam caprinam a membranis expurgatam, quæ ob crassitiem citius concrescit, adipis autem membranulæ eximuntur ipsaque adeps leniter contunditur, ut liquari facile possit, libro primo *κ^η γ^ην*. Galeno, infunditur deinde oleum, tum inspergitur plumbum, non autem plumbi recrementum, ut male vertit vidius, cum spodio, quod idem interpretis prætermisit, & dimidium ramentorum loti. Cæterum *σποδίου* siue *σπόδιον* a pompholyge sola specie non genere distat. Vtrâque enim in fornacibus in quibus æs vritur, colligi solet, sed pompholyx est fauilla quæ rectis & parietibus adhærescit, spodium vero est purgamentum, quod in officinarum pavimentis colligitur, nemo autem spodio uti debet, cui suppetit pompholyx. Galeno libro nono simplicium medicamentorum. Postremum pharmacum recipit adipem caprinam, spodium, chalcitim cæruleam, & oleum. Quid autem sit *χαλκίτις κυανή*, chalcitis cærulea, non facile est dictu, nisi forte chalcanthum intelligas, quod in chalcitim transire Galenus observauit, libro nono simplicium medicamentorum. Chalcanthum autem cæruleum optimum esse creditur Dioscoridi libro 5. atque hoc constringit, desiccatur, & calore suo carnis humiditatem absorbit, vel fortasse *χαλκίτις κεκαυμένη*, non *κυανή* legendum est, quod chalcitis

vista melior sit quàm non vista, minus enim mor-
dicat, nec minus desiccet, & astrictionis parum
retinet. Galeno ibidem. Vidi^{us} non *κωαχέν* legisse
videtur sed *κώανος* præter omnium exemplarium
Græcorum fidem.

Περὶ πνευμάτου, ἐφεῖν καὶ ὀρίνου ῥίζας
ἀπάλας, ὧν εἰ ὁ φλοιὸς ἐστὶν παχύτατος καὶ χλο-
ρώτατος, καταταμῶν μικρά, οἶνον λευκὸν ὀπι-
χέας, μάλθακῶ πνεῖ κατεφεῖν, ἕως ἂν δοκέῃ
καλῶς ἔχειν τὸ πάχος, ὡς ὑπαλείπειρον, καὶ ὅν
ἔδαπιν τὸν αὐτὸν τρόπον, ἕτερον μὴ δάκνον. Τὸς
τέαρ μόνον παλαιὸν ὑπαλείφειν τήζας αὐτὸ,
ἀνωθεν δὲ τῆς σκίλλης τιμὴ ῥίζας διαρῶν καὶ
πρεσπιθεῖς καταδεῖν, τῇ δὲ ἐξῆς ἐπαιονᾶν τήζας
τέαρ τὲ ὑὸς παλαιόν, καὶ κηρὸν, καὶ ἔλαμον συμ-
μύζας καὶ λιθανωτὸν, καὶ λωτῶν ἰχθυήματα, καὶ
μίλτον, τέτω ὑπαλείφας, ἄρου φύλλα ὅν οἶνω
καὶ ἐλαίῳ ἐψήσας, πρεσπιθεῖς καταδεῖν, ἕτε-
ρον, ἐπειδὴ, τῷ σுவέῳ τέατι ὑπαλείφης τῷ
παλαιῷ, καταλείφειν ἀσφοδέλου ῥίζας ὅν οἶνω
τρέψας καὶ λειώσας. ἕτερον. Τήζας τέαρ σὺς
παλαιόν, συμμύζας ῥηκίνην, καὶ ἀσφάλτῳ, καὶ
αὐτὸ ἐπαλείφας ἐς ὀθόνιον, θερμύνας πρὸς πῦρ,
ὀπιθεῖς ὀπιδεῖν.

De adustis.

OPortet ilicis radices teneras inco-
quere, quarum corticem, si maxi-

mè crassus, maximèque viridis sit, in tenues partes dissectum, vino albo affuso, lento igne coquito, donec iustam crassitudinem habere videatur, vt illini possit, eodem modo & infusa aqua potest coqui. Aliud non mordax. Adipem suillam veterem liquefactam solam illinito, supernè verò scillæ radicem dissectam imposito, ac deligato, postridie vero superfundito liquatam suillam adipem veterem, vbi miscueris ceram, oleum, thus, ramenta loti, ac minium, hoc vbi illeueris ari folia in vino ac oleo decocta imposito ac deligato. Aliud. Postquã adipe suilla vetere inunxeris, asphodeli radices in vino contritas donec læues fiant, super illinito. Aliud. Adipem suillam veterem liquato, cum resina & bitumine misceto, hæcque linteolo excepta & ad ignem calefacta imposito ac deligato.

Πυρίγυσον combustio, non solum significat quod igne ambustum est, sed etiam quod est aqua feruente exustum. Galeno libro primo *κτ' γένν*, cum agit de pharmaco ex chalcitide confecto. Paulus tamen libri quarti capite vndecimo. *Πυρίγυσον* vocat ambustum igne, vstionem vero ex aqua calente nominat *καταγυσμα ἀπ' ὕδατος*. Quæ oleo feruente aut simili materia combusta sunt, sub hoc etiam genere continentur.

Hippocrates hîc ambustorum remedia proponit, quod in his etiam vlcera fiant, vel fortasse, quod ego mihi persuadeo, titulus hic *ἀπὶ πύων* *ἡγούσων*, non est Hippocratis, sed ab aliquo appositus, & ambustorum nulla in his remedijs mentio, quamuis ea indigeant medicamentis lenibus vt turpis & indecora emendetur cicatrix. In membris autem adustis tria potissimum sunt obseruanda, primùm empyreuma, inflammatio & dolor, deinde pustulæ, tum vlcus siue excoxiatio. Ad inflammationem extinguendam, empyreuma euocandum, dolorémque sedandum statim ab initio admouenda sunt, quæ vim habent refrigerandi, cuiusmodi est aqua, acetum, oxycratum, oui albumen, succus lactucæ, aizoi, solani, & quæuis terra læuis, vt bolus armena, & Galeno terra selinusia & chia, aquâ, oxycrato, aceto, succis aut aquis stillatitijs soluta & tepidè admota, pro ratione corporum mollium aut durorum, hæc autem omnia pennis illinenda sunt, a manu autem contactu prorsus abstinere oportet, ex Ætio, neque vero solis frigidis in ambustis circa initia vtendum, sed quemadmodum ignis si propiùs ipsi pars exusta admoueatur, fit proprii iniusti mali alexiterium, partémque reuocato empyreumate, dolore leuat, sic nonnulla impresum partibus ardorem foras calore prolestant, atque ita sedata inflammatione ambustis menderent. Sic cæpæ cum sale contusæ, ambustæ parti impositæ, miraculo persanant, at ex aqua calente vstiones, priùsquàm pustulæ oriantur, oliuarum salutarum aquâ continuè superfunduntur, ipsæque oliuæ salæ cum polenta contritæ indu-

cuntur, aut fel taurinum cum aqua copiosiore
liquatum inungitur. Paulo, ambusta denique
aquis feruidis, si ouo statim occupentur, pustulas
non sentiunt. Gluten etiam ex tergoribus boum
pellucens & candidum dilutum aqua, ambustis
illitum pustulas prohibet. Pustulæ cum iam ex-
citatae fuerint non sunt statim distumpendæ, sed
cum durauerint, tunc sunt aperiendæ, antequam
rumpantur fel porci coctum, aut hyosciami viri-
dis succum assidue illine, & pustulæ marcescent,
Ætio. Excoriatis pustulis betæ folia in vino cocta
& trita imponantur, aut calx aqua rosarum aut
plantaginis lota, & rosaceo vnguento subacta,
blandum est excoriatis pustulis remedium. Sed
in facie hoc vnguento ex calce composito non
vtendum, ne cicatricem nimium contrahat. La-
ridum etiam ad flammam liquatum, aut ferro
ignito superpositum dum destillet, aqua rosacea
exceptum, ambusta sanat, hordeum tostum tri-
tum ex oui candido vtiliter illinitur, frumentum
etiam tostum & tritum è vino vlceratis præstan-
tissimo est remedio; folia myrti puluerata aqua
rosarum perfusa blandè exsiccant, & cutim nu-
triant. Corticis vitis cinis ex oleo illitus pilos
reddit, frigoris autem adustionē rutæ folia cum
vino & oleo cocta, & trita impōita persanant.
Denique ambusta, medicamenta requirūt, quæ
modicè abstergant, & non multum desiccant,
citra manifestam calefactionem aut refrigera-
tionem, sic enim generabitur caro, & implebi-
tur vlceris cavitās. Curationem ad. Morum pau-
cis perstringit Celsus libri quinti cap. 27. circa fi-
nem. Dum inflammatio est, impone cum melle

lenticulam, vbi ea declinarit, farinam cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crustæ cadant, tum eruum cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam donec vlcus purum sit, nouissimè siccum linamentum. Hippocrates hîc quatuor pharmaca proponit. Primum vim habet refrigerandi & repellendi, siccandi etiam & glutinandi, de radicibus ilicis in vino albo coctis, dictum est commentario in sententiam 28. Secundum pharmacum, quod primo statim die imponitur, vim habet sedandi doloris & euocandi foras caloris. Scillæ enim radix vim acrem & feruentem habet. Quod vero postridie illinitur, vim habet leniendi, astringendi, detergendi, & desiccandi. De cera, oleo, thure, & loti ramentis dictum prius, *μεικτος* Plinio libri 33. capite 7. minium vocatur, vim habet siccandi & astringendi, Dioscoridi libro quinto. De aro dictum fuit commentario in sententiam 20. huius libri. Huius pharmaci verba Græca non expressit Vidijs in sua interpretatione. Tertium etiam pharmacum dolores lenit, & empyreuma prolicit foras, hîc etiam oscitanter Vidijs *νέον* pro *παλαιόν* legit. Radix autem asphodeli gustu acris est & calefacit Dioscoridi, ideóque astringentis & discutientis est facultatis, Galeno. Plinio autem libro 22. decoctæ radicis asphodeli succus ambusta emendat. Postremum remedium lenit desiccatur. De resina præcedenti commentario dictum. *Ἀσφαλτος* autem siue bitumen, Galeno libro vndecimo simplicium medicamentorum vim habet siccandi, valétque ad vlcera glutinanda, & ad alia omnia quæ siccari debent cum modico calore.

Ὅταν ἐν τῷ νῶτῳ ὑπὸ πληγῶν ἢ ἄλλως
 ἔλκος γένηται, τῇ σκίλλῃ διέψῃ, τρίψας καὶ
 ἐπ' ὀρόμιον ἀλείψας, ὅπιδ' εἶν, ὑπερον δὲ σέαρ
 αἰρὸς, καὶ σὺς νέον, καὶ ἀπόδον, καὶ ἔλαμον, καὶ λι-
 βανωτὸν ἐπαλείφειν.

CVm in dorso ex ictu, aut alio quouis
 modo vulnus fuerit, scillam coctam
 tritam ac linteo illitam deuincire opor-
 tet, deinde vero caprinam adipem, ac
 suillam recentem, spodium, oleum, ac
 thus inungere.

Νῶτος siue νῶτον dorsum Rufo dicitur poste-
 rior corporis pars a ceruice ad metaphrenum vs-
 que nonnulli ἀντίσερρον vocant, vt enim σέρρον est
 thoracis pars anterior, sic νῶτος posterior. Ari-
 stoteli autem latius patet, diciturque pars tota
 posterior ab occipite ad extremum vsque coccy-
 gem. Vulnere autem dorsi medicamentis etiam
 lenibus curantur, ideoque meminit hoc loco
 vulnere dorsi, quod quia nervis abundat &
 exquisiti sensus est, medicamenta requirit quæ
 dolorem leniant. Nervorum enim vulnerato-
 rum curatio medicamenta postulat, quæ calo-
 rem tepidum excitent & valenter siccent, tum
 quæ ex substantiæ suæ natura trahendi vim ha-
 beant, & tenuium sint partium, quæque dolo-
 rem mitigent & exitum saniei patefaciant, libri
 sexti methodi medendi capite secundo. Idem
 Galenus libro 3. κατὰ γένη, medicamenta omnia
 quæ

quæ nervis adhibentur mollia esse vult, oleum-
que dicit molliciem cōciliare. Hippocratis phar-
macum vulnere in dorso videtur accommoda-
tum, quod scilla vim habeat incidentem, & non
admodum calidam, præsertim cocta, coctione
enim facultatis vehementia exoluitur, deinde
quod admouetur, ratione olei, adipis caprinæ &
suillæ vim habet leniendi, ratione spodij & thu-
ris vim habet desiccandi citra morsum. Spodium
enim citra calorem manifestum tenuium est
partium. Galeno libro 3. κτ' γένη. Itaque totum
hoc pharmacum, dolorem mitigat, exitum san-
iei præbet, desiccatur citra morsum, nec admo-
dum calefacit.

Οἰδήματα ἐν τοῖσι ποσὶ γινόμενα, αὐτόμα-
τα καὶ μὴ αὐτόματα, οὐδὲν ὑπὸ τῶν καταπλα-
σμάτων κατὰ τὰ μέλη, τά τε οἰδήματα, καὶ ἡ
φλεγμασίη, καὶ ἡν ἀπόρρους ἐπιδέη τις ἢ εἶεα,
ἢ τί ἄλλο ἐπὶ τὸ ὑγρὸν, ἔπειτα ἀνοιδισκῆται
αὐτόματον καὶ ἀναφλεγμαίνει, καὶ φλέβας ἐπὶ ῥ-
ρους αἱπὸν ὅστιν αἵματος, ὥστιν μὴ φλόγμα αἱ-
πὸν ὅστις, καὶ ἡν πρὸ ἄλλοι τῶ σάματος τοιοῦτον
τί γίνηται, ὁ αὐτὸς λόγος.

TVmores pedum siue sponte aut ali-
ter orti, si nihil à cataplasmate re-
mittantur, & ipsi tumores, & inflamma-
tio, quamuis aliquis vel spongiam, vel
lanam, vel quid aliud ad sanitatem con-

ferens deligarit , si postea sponte intumescant ac inflammentur, causa est fluxio sanguinis per venas , vbi contusio causa non fuerit , eadēque ratio est, cum tale quid in quacumque corporis parte contigerit.

PEdes cū sint partes decliues, & onus totius corporis sustinentes, facile intumescunt, & inflammantur, sponte sua, & citra occasionem manifestam, corpore nempe superfluum humorem in eos fundente. Sæpius vero excitantur hi tumores in pedibus, ex vulneribus, vlceribus, contusionibus, fracturis, luxationibus & similibus causis. Cataplasmata proposuit Hippocrates sententia 23. huius libri, quibus eiusmodi tumores & inflammationes sedari & sanari possint, quibus si non cesserint, quamuis spongia sit imposita, vel lana, vel pannus cum aqua, oxycrato, vino austero, aut aliquo alio astringente & repellente, vel etiam herbarum conuenientium folia: vel si his remedijs impositis, non nihil remissior factus tumor, & sedata quodammodo fuerit inflammatio, postea tamen sponte, & citra occasionem manifestam reuertuntur, sanguinis è venis fluxum causam esse dicit, cur eiusmodi tumores & inflammationes recurrant. Itaque aliud querendum remedium est, quàm vel cataplasmata, vel alia repellentia, quod sequenti sententia patefaciet, neque verò solū id in pedibus obseruandum, sed in alia etiam quacumque corporis parte.

Ἀλλὰ τὸ αἷματος ῥῆν ἀφίεναι, μάλιστα μὲν
 ἐν φλέβαις ταῖς ἐπιρρέουσας, ἢν καταφανέες
 εἴωσιν, ἢν δὲ μὴ, κατακρούειν τὰ οἰδήματα βα-
 ρύτερα καὶ πυκνότερα καὶ ἄλλο πᾶν ὃ, τὶ ἂν κα-
 τακρούης, οὕτω ῥῆν ποίειν, καὶ ὡς ὀξύτατοις
 σιδηρείοις, καὶ λεπτότάτοις, καὶ ὅταν ἀφαιρῇς τὸ
 αἷμα τῇ μήλῃ, μὴ χάρτα πρίζειν, ὥς μὴ φλά-
 σις προσγίγηται, ὅξει δὲ κατανίξειν, καὶ θρόμ-
 βον αἷματος ἐν τοῖσι. Χάσμοις μὴ εἰς ἐγκυ-
 τα λείπεσθαι, καταχρίσας τῷ ἐνόμῳ φαρ-
 μάκῳ, εἰρία οἰστυπύῳτα, κατεξασμένα, μαλ-
 θακὰ ἐπιδῆσαι ῥεύας οἶνω καὶ ἐλαίῳ, καὶ ἐχέτω
 τὸ σχαθὲν ὅπως ἀνάρρους εἴη τὸ αἷματος, καὶ μὴ
 χαθάρρους, καὶ μὴ τεγγέτω ὅλως, καὶ ὀλιγοστιτέτω,
 καὶ πινέτω ὕδωρ, ἢν δὲ σπολύων, εὐείσκης τὰ
 σχάσματα φλεγμαίνοντα, καταπλάσσειν τῷ
 ἐκ τῶ ἀγνου, καὶ λίνου καρποῦ καταπλάσμα-
 τι. ἢν δὲ ἐλκωθῇ τὰ σχάσματα καὶ συρραγῇ,
 πρὸς σχημα ὀρέων, ἔπειτα προσφέρων ὃ ἂν δέη,
 τὰ λοιπὰ ἰητέυειν.

Verum sanguinem mittere oportet,
 potissimum ex venis quæ sangui-
 nem fundunt, si conspicuæ sint, sin-
 minus pertundendi sunt tumores altio-
 ribus ac frequentioribus vulnusculis, &
 ita agendum est, quodcúmque aliud per-
 tundas, idque acutissimis & tenuissimis

ferramentis. Cùm sanguinem detrahis specillo, ne nimium comprimas, ne forte contusio superueniat, tùm aceto perfundito; nec in fissuris sanguinem concretum remanere finito, cùmque medicamento enamo inunxeris; lanam succidam, bene carptam, mollem superalligato respersam vino atque oleo. Locum autem scarificatum ita collocato, vt refluxio sit sanguinis, non defluxio, nulloque modo madefacito. Parum autem cibi assumat æger, & aquam bibat. Vbi solueris, si cutis incisiones inflammatione teneri deprehendas, cataplasma ex vitice & lini semine imposito. Si vero exulceratæ fuerint ac confractæ, considerata rei occasione & statu, quod commodum erit impones, & ad sanitatem perduces.

TVMores qui per se & sponte suboriuntur in pedibus, aut in alia corporis parte, vel qui sequuntur vulnera, vlcera, fracturas, luxationes, vel à causa aliqua externa dependent, si adhibitis idoneis cataplasmatibus & alijs remedijs non cedant, vel si cesserint, rursus sponte reuertuntur, verisimile est eos excitari a sanguine per venas diffuente. Itaque suadet Hippocrates, vt in eiusmodi tumoribus sanguinem detrahamus ex ijs venis, ex quibus confluit sanguis, si sint ma-

nifestæ, sin minus tumores ipsos pertundamus altioribus & frequentioribus incisionibus. Memineris autem istorum remediorum vsum non esse vsurpandum, nisi prius vacuato vniuerso corpore, & per sanguinis missionem, & per idoneam purgationem. Sic Hippocrates sententia 10. & 17. huius libri purgationem vlceribus conferre scripsit. Sit Galenus in arte medica docet per partem affectam vacuandum non esse, si vniuersum corpus plenius fuerit, nam si manifeste scarificationibus & sectionibus vacuemus, dolorem excitabimus, proindeque fluxionem maiorem aduocabimus. Si vero calidis medicamentis digerere tentemus, plus in affectum locum ob calorem attrahemus, quàm per halitum dissipari possit, at si retorquere quod influxit velimus, corpus plenum non excipiet, duabus igitur his de causis, totum corpus vacuare oportet, deinde in contrarium omnino quod influit retrahere. Idem Galenus libro 14. methodi medendi, post sanguinis missionem, quæ ad animi defectum vsque sit adhibita, scarificare carbunculum, alienum non putat, vultque vt incisiones sint mediocribus altiores, ex venis autem vicinis sanguinem fundentibus sit detractio, cum id quod laboranti parti impactum est, euacuare oportet. Vacuatur id optimè, per venas vicinas & coeuntes cū ijs quæ in partibus ipsis sitæ sunt, sic in anginis ambas sub lingua venas incidimus, sic in oculis induratas inflammationis reliquias, vena quæ ad magnum est angulum secta iuuat. Sic in vlcere varicoso venam ipsam vlceri suprapositam incidimus. Vbi verò conspicuæ nō sunt

venæ, quæ sanguinem fundunt, tumorem ipsum scarificamus, fit autem scarificatio, cum sanguis in aliqua parte ita inhæsit, ut nec medicamento, nec phlebotomia possit reuelli aut educi, tunc scalpello inciditur cutis, & nonnunquam adigitur scalpellum in subiectam carnem, & quò altior fuerit incisio, eo plenior est sanguinis effusio. Scribit Galenus libro de scarificatione, partes corporis phlegmone laborantes, aut induratas, aut tensas, aut dolore vexatas, aut fluxione quæ iam firmata est, tentatas, scarificandas esse, quod ex hoc Hippocratis loco desumpsit. Incisiones præcipit fieri ferramentis acutissimis & tenuissimis, ut minori cum dolore fiant, facilius sanescant, ut etiam vitentur magnæ incisiones, quæ partibus & turpes cicatrices & imbecillitatem etiam aliquam relinquunt. Horum vulnuscule scalpello excitatorum curationem statim præscribit, primò leniter specillo sanguinem detrahit, ne forte in sectionibus remanens inflammationem pariat, locumque scalpello exasperatum perfundit aceto, quod repellendo, desiccando, grumumque sanguinis dissoluendo inuat, præterea sanguinis profusionem, si forte sit vehemens, suppressit, acetum enim quidam vulneri infundunt ad sanguinem suppressendum, ex Celso libro quinto de curatione profusionis sanguinis in vulneribus. Vbi incisiones aceto perfudit, pharmaco aliquo enæmo inungit, ut desiccando & astringendo vulnera conglutinet. Enæam autem pharmaci formam vide sententia 33. huius libri, tum lanam succidam respersam vino atque oleo super alligat, eamque bene

carptam & mollem, vt astringat modicéque calefaciat, dolorem leniat, nec duritie sua partem lædat. Locus autem scarificatus sublimis sit, ne sanguinem aliunde fluentem recipiat, ita tamen collocandus eger, vt dolorem non sentiat, membrum vulneratum certa ratione collocari debet, ex Celso libro quinto, si glutinandum est, superius sit, in inflammatione, in neutram partem inclinatum sit, si iam pus profluit, sit de uexum. Locum hunc scarificatum madefacere nõ oportet, ex sententia prima huius libri. Sed cur meminit hîc diætæ tenuis, quam præscripsit sententia tertia in hunc modum. Abstinere acibo quantũ vires patiuntur & aquam bibere, cunctis vulneribus prodest, magisque recentioribus, quàm vetustioribus, ne quis arbitretur morbum hunc esse inueteratum, & putet victum esse præscribendum, antiquo tumori & inflammationi conuenientem. Curationem enim incisionis persequitur, & vt ait Celsus libro quinto, Vetus vlcus vbi scalpello incisum est, & emissus sanguis, notatum est vulnus, eique eadem curatio adhibenda, quæ recentibus vulneribus. Post resolutum vinculum partibus inflammatis admouet cataplasma ex vitice & lini semine, de quo vide sententiam 23. & 24. huius libri vbi multa similia cataplasmata proponuntur. Scarificationes si exulcerentur, & ex multis vulnusculis fiat vlcus vnum lacerum, con fractum, & commistum, tunc considerata vlceris specie, statu & conditione, quod opportunum videbitur remedium erit accommodandum, siue enæmon, siue detergens siue exedens, siue sarcoticum, siue epuloticum, aut

aliud quippiam. Cæterum hoc loco duplex est lectio, Codex enim Basiliensis legit *περίχημα*, Aldinus *περίσχημα*, est autem *περίχημα*, ἢ *περίσχημα*, occasio, rei status, forma & figura, *περίσχημα* est id quod utile & operæ pretium videtur, quasi ad rem faciens. Cornarius diuissum legisse videtur *περὶ χεῖμα*, vertit enim ad rem respiciens.

Ὁκου δὲ κίρσος ἐνεστὶν ἐπ' ἀντηνήμιον, ἢ πε-
 ριφανής, ἢ χεῖ τῆς σαρκὸς, καὶ ἐπὶ μέλαν τὸ ἀν-
 τηνήμιον, καὶ δοκέει δεῖσθαι αἵματος ἀπ' αὐτοῦ
 σπορρύνεντος, καὶ χεῖ τὰ τοιαῦτα σποκφεῖν ἔδα-
 μως, ὥς γὰρ ἐπιτοπολὺν ἔλκεα μεγάλα γίνε-
 ται ἐκ τῆς σχασμάτων, ἀφ' ἧς κίρσου τίω
 ἐπιρρόην, ἀλλὰ χεῖ αὐτὸν τὸν κίρσον σποκεν-
 τέειν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, ὅπῃ ἀν δοκέει κίρσος εἶναι.

CUm autem varix in anteriore tibia
 inest, aut conspicuus, aut in carne,
 estque tibia nigricans, & indigere vide-
 tur sanguinis detractio, talia nequa-
 quam pertundere oportet, plerumque
 enim ulcera maiora fiunt ex incisionibus
 ob varicis influxum, sed varicem punge-
 re conuenit varijs locis, vbi opportu-
 num esse videbitur.

Varix est immodica venæ dilatatio, in tibijs,
 quam in cæteris partibus frequētior, quod
 sanguis melancholicus propter suam grauitatem,

in partem decliuem & a fonte caloris longe dif-
fitam facilius delabitur. Generari solet etiam va-
rix in ima ventris parte, sub vmbilico, circa te-
stes & scrotum, in ipsis inguinibus, in tēpori-
bus & in palpebris, *Ætio.* Varices plerūque à
succho melancholico, interdum etiam ab alijs
crudis crassisque humoribus concitantur. Vari-
ces & hæmorrhoides, si in sanientibus superue-
niant, insanix solutio, aphorismo 21. libri 6. &
rursum aphorismo 34. eiusdem libri. Qui calui
sunt, ijs varices magni non fiunt, quibus vero
caluis existentibus varices superueniunt, ij rursus
capillati fiunt, præterea ex fine sexti commenta-
rij in librum sextum epidem. Varices melancho-
liam, lienem scirrho tentatum, podagras & ar-
thritides discutiunt. Curationem varicum hic
proponit Hippocrates, nō autem temere secan-
di, extrahendi, aut adurendi sunt varices, & ho-
rum curationem non suscipiet Chirurgus, nisi
admodum pateant, & vasis fracturam minen-
tur, dolorēque excitent acerbum, aut adsit vl-
cus magnum & malignum, tuncque satius est
Hippocratis curationem adhibere, quam Gale-
ni, Pauli, *Ætij*, aliorūve medicorum, qui se-
ctionem, ablationem aut adustionem præcipiūt,
quæ curationes aliquando sunt ipso morbo gra-
uiore. C. Marius cum utrūque crus varico-
sum haberet, eamque deformitatem moleste
ferret, vnius cruris varices medico sanandos præ-
buit, & dum secaretur, neque suspirans, neque
supercilia contrahens pertulit sectionem, fixis-
que oculis, cruciantem se medicum spectauit,
quūque medicus alterum crus secare vellet,

minime assensum præbuit, dicens ἐγὼ τὸ ἐπιπρόσθεον τῆς ἀληθείας οὐκ ἄξιον. Video hanc directionem siue in naturalem statum restitutionem dolore non dignam. Galenus circa finem libri 13. methodi therapēticæ, varicum excisionem probat, libro 4. καὶ γὰρ capite 2. eorumdem vel excisionem vel scarificationem, quomodo varices excindantur docet Paulus libri 6. capite 82. Varicum sectionem & vstionem demonstrat Ætius capite penultimo libri 14. Rationem adurendi & excidendi varices explicat Celsus libri 7. capite 31. Miror nemini placuisse Hippocratis curationem, cum sit tutior, facilior, breuior. Albucasis Arabs ad Hippocratis mentem propius accedit, tibiam fouet aqua calida, vt sanguinem crassum ac melancholicum attenuet, deinde femur ab inguinibus ad genu vsque constringit & deuincit, tūc vniuersam venam in tibia pungit duobus tribusve locis, satis amplo foramine, sanguinemque detrahit, quantum ægrotantis vires patiuntur, demum sectionem constringit, vt in venæ sectione fieri solet. Hippocrates hoc loco varicem non vult pertundere & scarificare, cum indigere videtur sanguinis detractio, ne ob varicis influxum vlcera amplientur & maiora fiant, sed tantum diuersis in locis vt opportunum videtur, pungit & aperit. Scribit libro ἀπὸ ἰντρεῦ, in varicibus debere fieri τομαὶς στενὰς, id est angustas sectiones, quia non facile sanguinis fluxus sisti possit. Ante hanc particularem apertionem, memineris cubiti venam secandam esse, & purgandum corpus pharmaco melancholicum humorem & petuitosum educente, ex quarto

libro χ^{v} γένη cap. 2. Rasis etiam 9 libro ad Al-
manforem circa finem, varices ita curat, vt sta-
tim initio basilicam aperiat, & melanogogum
medicamentum exhibeat, hocque sæpius repe-
tit, victumque conuenientem præscribit, cum-
que diu hoc regimē adhibitum fuit, ex venis in
crure conspicuis sanguinem detrahit, a quibus
tandiu fluere dimittit, donec quicquid in eis est
euacuetur. Alij incipientes varices malunt me-
dicamentis astringentibus prohibere, vt Ætius
& Auicenna.

Ὅταν δὲ φλέβα τῆς ἀμης, ἐπειδὴν ὁ αἷμα-
τος ἀφῆς, καὶ λύσης τὴν ταινίαν, καὶ μὴ ἴσῃται,
τὰ ἀντία, ὅπως ἀνάρρους γίνῃται ὁ αἷματος,
ἐχέτω, ἢν τὴν χεῖρ, ἢν τὸ σκέλος ἢ, ὥσεί ρέον-
τος ὁ αἷματος ὀπίσω, καὶ ὅπως ὀπομείνας χερόν
πλείω ἢ ἐλάσσω κατακείμενος, ἔπειτα ὅπι-
δῇται αὐτὸν ὅπως ἔχοντα, μὴ ἐνεόντος πινὸς θρόμ-
βου ἐν τῇ τομῇ, ἔπειτα σπλινδίον διπλόον
προθεῖς, τέγξας οἶνω, καὶ ἀνωθεν εἰσιον ἐλαψά-
σας καθάρων, καὶ ἐν γὰρ ὀπίρρευσις ὁ αἷματος
ἐν βιάνῃ, σχέσις γίνεται ὀπίρρέοντος, καὶ ἐν θρόμ-
βου ὅπι τῇ τομῇ γινόμενου, ὅτω φλεγμῆνι,
ἀφαιπύσκειται, ἡετῆκότα δὲ χερὶ πλέον ἢ
ἐλάττω, καὶ πεπωκότα φλεβοτομέειν καὶ ὑποτε-
ρμασμένον, καὶ ἡμέρης θερμότητος ἢ ψυχρο-
τέρης.

QUum vena incisa sanguinem mise-
ris, & fasciam solueris, si non sista-

tur, vt refluxio fiat sanguinis, & aduersa parte collocetur siue manus, siue crus, sicque sanguinis fluentis impetus retrocedet, atque ita plus minúsve temporis iacens maneat, eoque in statu deligetur, modò nihil concreti sanguinis in sectione relinquatur, duplèxque linteolum vino madens imponatur, supràque id lana lota, oleoque imbuta, nam etsi vehemens fuerit sanguinis profusio, suppressio fit effluxionis. Si vero in sectione sanguis concreascit, & ita inflammetur, in pus verti solet. Vena autem secanda est, cum homo plus aut minus pransus fuerit, ac biberit, cùmque leuiter calefactus fuerit, & die calidiore potius, quàm frigidiore.

Sanguinem mittendum esse dixit antea ex venis sanguinem fundentibus si conspicuæ sint, in tumoribus pedum & aliarum corporis partium, varicem etiam pungendum varijs in locis, proximè proposuit, nunc quid obseruandum sit, post sanguinis eiusmodi detractionem docet. Neque enim hîc commune præceptum describitur, quod in sanguinis missione & venæ sectione, vel in brachio, vel in crure obseruandum sit, non enim tam curiosus in venæ sectione fieri debet apparatus, sed tantùm deligatur brachium vel tibia, super imposito penicillo sicco, vel ex-

presso ex aqua frigida, celerrimèque venæ cicatricula confirmatur, ergo si nō supprimatur sanguis soluto vinculo, mutandus est partis situs in cōtrarium, vt fiat sanguis ἀνέρρπος, qui prius erat χερτερρπος. Hīc autem in codice Græco vitiose legebatur αὐ ὁ πόρς, nos restituimus ἀνέρρπος, & Paulo post legendum duximus, ῥέοντος pro χέοντος, quamuis legi etiam possit χερτερρτος, Cubans autem in eo situ tandiu detineatur, quandiu profusionis sanguinis imminebit periculum. Stare enim in vulneribus nō conducit, sed neque sedere, nec ambulare, ex sentētia quarta huius libri, ita decūbens alligetur, vt nihil in sectione sit sanguinis concreti, quod etiam in scarificationibus prius obseruandum iussit, vtque sanguinis eruptio citius supprimatur, postquam fasciæ sectionem deligaris, super imponendum linteolum duplex vino imbutum. Sit autem vinum nigrum & austerum, vt cursum sanguinis fluentis repellat & vlcus deficcat. Lanam lotam oleo respersam superaddat, vt locū muniat & vinculi dolorem leniat, Paulo ante in scarificationibus lanam succidam vsurpabat, quia in his dolor grauior, lana etiam succida magis lenit. Sic Galenus libello de hirudinibus, foraminibus ex quibus cruentæ lachrymæ effluunt, amotis hirudinibus, oleo madidam lanam imponit, si vero sanguis cum impetu erumpat, linteolum aceto imbutum iniicit, aut gallam vltam, aut spongiam pice liquida madentem ac postea vltam superponit. Quod in fine præcipit, vt pransis, potis & leuiter calefactis mittatur sanguis, Hippocrate est indignum, si per phlebotomiam, intelligas venæ se-

ctionem, quæ solet fieri in brachio, ad deplendam plenitudinem, aut ad vacuandam humorum in vasis contentorum labem. Solent omnes medici in missione sanguinis diligenter observare, ne sit in ventriculo & in primis venis humorum cruditas, & noxiorum excrementorum colluvies, neve sit astrictior alius. Crudiore enim ventriculo secta vena & euacuata, crudorum humorum plurimum in sanguinis locum rapiet, & si suppressa alio, venam incidas, hepar & exhaustæ venæ sordidum & impurum quiddam è fecibus exsugēt, ergo præceptum hoc de particulari missione sanguinis est intelligendum, quæ fit in varicibus, aut in tumoribus pedum & aliarum corporis partium, qui excitantur a sanguine in partem affectam per venas fluente, hîc enim nulum periculum est, ne ex ventriculo crudiore, aut impuriore prima regione, hepar & venæ aliquid crudum aut impurum attrahant, partem enim affectam tantum euacuat hæc venæ sectio, aut certè minimum è vicinis, nihil vero prorsus ex alto aut ex distantiore loco prolicet. Ad idem refertur quod scribit, die calidiore potius, quam frigidiore secandam esse venam, cum enim in his tumoribus secantur varices aut venæ conspicuæ & vicinæ sanguinem impurum crassum & fere iam à nativo calore destitutum continent, qui non facile profundetur, si accesserit frigus externum, diei autem calor eum tenuiorem & ad fluendum aptiorem reddit.

Σικύλω δὲ περιβάλλοντα χεῖρ, ἢν ὀπίρρην
τὸ αἷμα, ἀφαιρεμένης τῆς σικύης καὶ πολὺ ῥέη,

ἢ ἰχώρ ῥέη, αὐτοῖσι ταχέως ὥρην ἢ πληοῦσιν, αὐθις
 πρὸςβάλλων, ἐπεξέλκειν τὸ λειπόμνον, ἣν δὲ
 μὴτρόμβοι ἐνεχόμενοι ἐν τοῖσι σχασμασιν, ἔπειτα
 ἀναφλεγμύναντα ἔλκεα γίνεται ἐξ αὐτῶν, ὅξει
 δὲ λη πάντα τὰ τοιαῦτα καθαρίζειν, καὶ ὑπε-
 ρον μὴ τέγειν, μὴ δὲ καθακέεσθαι ἐπὶ ταῖς σχά-
 σμασι, τῷ δὲ ἐνάμω πινὶ φαρμάκων κατα-
 λείσαι τὰ σχάσματα, καὶ ὅταν κείτωθεν ὁ γή-
 ναιος δέη πρὸςβάλλων ἢ πρὸς τὸ γόνυ, ἐπι-
 κόπι ὀρθῶ, ἣν δύνηται ἐστῆναι.

Cucurbitulam autē admouere oportet si profluat sanguis, eaque remota si copiosè fluat sanguis, aut tenuis & serofus humor, oportet cito priusquam impleatur, rursus imponere, & quod reliquum est extrahere. Alioquin concretus sanguis in locis scalpello concisis retinetur, indeque vlcera cum inflammatione exoriuntur. Aceto vero hæc omnia perfundere conuenit, & postea non madefacere, neque in partem scalpello exasperatam decumbere, sed eam illine medicamēto aliquo ex his quæ cruentis protinus vulneribus iniiciuntur. Quūque sub genu, vel ad genu cucurbitula admouenda fuerit, id fiat stante recto homine, si modo stare possit.

Non hîc cucurbitularum generalem vsum docet, neque præcepta communia de ad-
mouendis cucurbitulis proponit, sed demon-
strat quomodo cucurbitulis vtendum sit, in tu-
moribus scarificatis aut scalpello cōcisis, in qui-
bus cucurbitulæ idcirco admouentur, vt sangui-
nem qui inhæret, exhauriant forasque attrahant.
Cucurbitularum autem plura sunt genera, fieri
enim possunt ex qualibet ferè materia, suntque
æneæ, corneæ, terreæ, vitreæ, & vitreis sæpius
vtimur in locis scalpello exasperatis, vt sangui-
nis qui vacuatur mensura in extractione pellu-
cescat. Cucurbitulæ etiam aliæ magnæ sunt, aliæ
paruæ iuxta corporis partes, quibus admouere
oportet, ex Hippocrate libro de medico, siue de
chirurgi institutione, vbi etiam alias circulum
latum & amplum habere dicit, alias breuem &
angustum, hæcque humores distantes in directum
ad carnem attrahere scribit, illas vero ex pluri-
mis partibus id quod dolorem facit, elicere, præ-
terea quædam exiguum foramen habent, quæ
vbi corpori impositæ sunt, ea parte qua foramen
illud est, ore spiritus adducitur, superque cera id
clauditur, tuncque corpori inhærescit, aliæ fora-
men nullum habent, in quas candela cerea ar-
dens vel στήπα, ἐλέγχιον aliquod vel linamentum
conijcitur, sicque corpori aptatur & imprimitur,
donec inhæreat. Imponitur autem partibus cor-
poris cucurbitula duobus modis, vel cute inte-
gra, quam κοίφην σκύναν, lenem cucurbitulam vo-
cant, vel cute scalpello concisa, quam μετὰ κατὰ-
σχισμῶν, cum scarificationibus nominant. Levis
inflammationes discutit, & doloribus a spiritu
flatuosa

flatuoso concitatis, incantamenti cuiusquam si-
 mile quid efficere videtur, illicò enim admota
 cucurbitula, qui spiritu flatuoso cruciantur, tùm
 a dolore liberi, tùm omnino sani redduntur, ex
 ultimo cap. libri 12. methodi medendi, errabun-
 dum etiam vterum hæc cohibet, levis etiam cu-
 curbitula imponi solet oppositis partibus, ad
 sanguinem attrahendum, & ad profluentē rur-
 sus sistendum, estque hæc etiam reuulsorium re-
 medium, ex Galeni libro de cucurbitulis, & ex
 aphorismo 50. libro 5. Cucurbitula verò cum
 scarificatione, a parte læsa efficacius sanguinem
 & alios humores euacuat, & validissimè trahit,
 præsertim si cum flamma ampliore admovea-
 tur. Denique cucurbitularum medicinaliũ vsus
 est, ait Plinius libri 32. capite 10. ad corpora le-
 uanda sanguine, & spiramenta laxanda. Sed lon-
 gius labi uideor, quam expositionis ratio requi-
 rat, eorum tamen quæ dicta sunt consequutione
 impulsus hæc adieci, nunc ad Hippocratis verba
 redeamus. Si locis scalpello exasperatis admota
 fuerit cucurbitula, profluâtque sanguis, remo-
 uenda breui est cucurbitula, si vero ea remota,
 copiosior videatur sanguinis eruptio, aut alte-
 rius tenuis & serosi humoris, rursus admouenda
 est, ad sanguinis reliquias exhauriendas, eam ta-
 men repleti sanguine non permittas, impleta
 enim non modo non euocaret sanguinem, sed
 eum in incisionibus retineret, ibique concre-
 ret. Concretus autem sanguis, qui Græcis *θρόμβος*
 dicitur, prius nigrescit, deinde putrescit, tuncque
 vlcus inflammatum excitat, cuius generationem
 impedit, si in scarificationibus concretum non

finas, sed prius exhaurias admotione cucurbitulæ. Tempus definit Guido, vultque ut per semihoræ spatium ibi relinquatur cucurbitula, quousque sanguine fuerit semiplena, sed cum impares magnitudine sint cucurbitulæ, cumque copiosius, aut parcius profundatur sanguis, certum tempus definiri non potest. Vbi sanguinis satis effluxerit, neque *ὑπόμεινον* in fissuris fuerit, tunc partes omnes quæ scarificatæ, cucurbitulam admiserint, aceto perfundendæ sunt, ut Paulo ante tumores scarificatos, detracto prius leuiter per specillum sanguine, perfundebat aceto, cuius perfusionis ibi rationem reddidimus, has etiã partes nullo modo madefaciendas esse imperat, ut eodem etiam loco, neque in partem scarificatam decumbendum esse, ne fiat in eam partem sanguinis defluxio, quam siccare volumus & conglutinare, idcircoque superimponendum pharmacum aliquod ex his quæ cruentis vulneribus accommodata sunt, de quibus sæpius antea, dictum est. Sed cur cucurbitulã priusquam impleatur, remouet, iterumque vacuam imponit? quoniam cucurbitula vacua sanguinem attrahit, flamma enim ubi aerem consumpsit, in eius locum sanguis attrahitur, ne sit locus inanis & vacuus, a quo natura penitus abhorret, ut docet Aphrodis, problemate 56. lib. 2. Hippocrates tamen libro de veteri medicina, causam attractionis cucurbitularum pendere dicit a figura excavitate & amplitudine in arctum & in angustiam coacta, idque non solum agnosci posse ex rebus externis, ut ex cucurbitulis, quæ corpori solent apponi ad attrahendum & eliciendum,

verum etiam ex internis quæ in hominis corpore sunt, cuiusmodi sunt vesicæ, caput & uterus, quæ manifeste figuram talem habent, eaque trahunt & semper plena sunt attractæ humiditatis. Si quando autem ad genu vel sub genu, cucurbitula sit admouenda, imponatur homini stanti & erecto, si modo stare possit, sic enim particulæ in rectum figuratæ affigetur, nullo enim modo flecti & curuari potest genu, quin musculi alio atque alio modo figurentur, ex fine secundi commentarij de fracturis, præterea laborat homo, si flectere poplitem cogatur, in fine tertij commentarij de articulis, & quæcumque in corpore ad aliquem usum fabricata sunt, bene valent, quando in eo usu moderatè continentur, cui singula assueuerunt, ibidem, in eo etiam statu facilius erit & sanguinis defluxio, & humorum deorsum inclinatio, cum in stantibus humores sua gravitate deorsum ferantur, potissimum cucurbitula circa genu attrahente. Cæterum si cute concisa circa genu cucurbitulæ admoucantur, tunc altiores incisiones fuge, propter multitudinem nervorum, ligamentorum, tendonum, originum & insertionum musculorum in his autem partibus excitata vulnera periculi sunt plena, afferuntque symptomata gravissima, nempe lipothymiam, syncopen convulsionem, & similia, à quibus pauci liberantur. Ait Avicenna in fine tertij capituli libri quarti, sententia 4. tract. 1. si stare non possit, collocetur ea ratione genu, qua nervi & musculi minimum tenduntur, aut flectuntur,

tuncque ex facili accommodari poterit cucurbitula. Cùm autem in hoc contextu bis ~~περὶ~~

~~ἑλάνων~~ repetatur, suspicor illud quod initio legitur ~~περὶ ἑλάνωντα~~, mendo-

sum, & ~~περὶ ἑλάνωντα~~

esse restituendum.

dum.



Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Π Ε Ρ Ι
αἱμορροΐδων.

Αἱμορροΐδων τὸ μὲν νόσημα ὧδε γίνεται,
ἐπ' ἰὺ χολὴ ἢ φλέγμα ἐς τὰς φλέ-
βας τὰς ἐν τῷ ἀρχῷ καταστρέψῃ,
θερμαίνει τὸ αἷμα τὸ ἐν τοῖσι φλε-
βίοισι, θερμανόμενα δὲ τὰ φλέβια ὅπισ-
πᾶται ἐκ τῆς ἐγγίστα φλεβίων τὸ αἷμα, καὶ
πληρεύμενα, ἐξοιδέει τὸ ἐντὸς τῷ ἀρχῷ, καὶ
ὑπερίσχυσιν αἱ κεφαλαὶ τῆς φλεβίων, καὶ
αἷμα μὲν ὑπὸ τῆς κόπρου ἐξίσσης φλάμενα, αἷμα
δὲ ὑπὸ τῷ αἵματι ἀτροιζομένου βιαζόμενα,
ἐξηκοντίζουσιν αἷμα, μάλιστα μὲν ἐκ τῷ ἀπο-
πάτῳ, ἐνίοτε δὲ, καὶ ἐκ τῷ ἀποπάτῳ.

*Hippocratis liber de hamor-
rhoidibus.*

Hæmorrhoidū morbus sic nasci
solet. Quum bilis aut retorri-
dus humor ad venas quæ sunt
in ano, decubuerit, sanguinem
in venulis calefacit, calefactæ autem ve-

nulæ ex vicinis sanguinem trahunt, & impletæ partem ani internam in tumorem attollunt, venarumque supereminent capitula, quæ dum ab exeunte stercore opprimuntur, & simul à coaceruato sanguine coguntur, eiaculantur sanguinem, potissimumque cum alui deiectionibus, & aliquando sine his.

H Vnc libellum Hippocratis esse nemo negabit, qui vel stylum considerarit, vel λέξις aut τὰς observarit. Omnium etiam medicorum consensus hunc germanum esse Hippocratis librum fatetur. Galenus genuinum esse Hippocratis fœtum agnoscit in exegesi linguarum duobus in locis, nempe in dictione πτερυα, & in dictione σποδία, quibus in locis hunc libellum cum sequenti de fistulis coniungit & præponit. Ætius etiam libri decimi quarti capite sexto, admirandum Hippocratis pharmacum ad hæmorrhoidas excidendas ex hoc libro desumptum proponit, hoc autem pulcherrimo libello, hæmorrhoidum causas, signa, multiplicemque curationem breuiter docet. Est autem hæmorrhoidis aliquando sanguinis profluvium ex venis quæ sunt in ano, aliquando vero vena in ano dilatata. Celsus hæmorrhoidas vocat ora venarum tanquam ex capitulis quibusdam surgentia, quæ sæpe sanguinem fundunt, easque non in ano tantum nasci, sed in ore vulvæ fœminarum dicit generari consuevisse. Hæmorrhoidum duæ summæ sunt dif-

ferentiæ, aliæ enim sunt cœcæ, aliæ apertæ. Cœcæ dicuntur, quæ vel intus latent, nec videri possunt, vel quæ nihil sanguinis excernunt. Apertæ sunt, quæ vel conspicuæ sunt & tument extra sedem, vel quæ sanguinem certis circuitibus effundunt. Quinque alias hæmorrhoidum differentias recenset author definitionum medicarum, quæ sumuntur a magnitudine, multitudine, figura, loco, constitutione siue more a magnitudine quidem, quod aliæ sint magnæ, aliæ parvæ, quædam mediæ. A multitudine siue numero, quod in quibûsdam plures sint, in quibûsdam pauciores. A figura, quod aliæ basi sint angustæ, aliæ vero latæ, a loco, quod aliæ sint, in podice, aliæ in sphinctere, aliæ in recto intestino. A constitutione denique quod aliæ sint mites, aliæ malignæ. Auicenna præterea lib. 3. fen. 17. tracta. 1. capite 2. quatuor constituit hæmorrhoidum differentias ex materia desumptas. Sunt quædam morales dictæ, quæ fiunt a sanguine crasso, quædam verrucæ, quæ generantur a sanguine melancholico, aliæ vesicales, a sanguine pituitoso, aliæ verò dicuntur vnales, quæ fiunt ex mediocribus humoribus. Sed has differentias hæmorrhoidum non agnoscunt Græci, nam ut ait Galenus commentario in aphorismum duodecimum libri sexti, propter multitudinem & crassitudinem sanguinis, ora quædam venarum aperiantur, unde hæmorrhoides excitantur, hepate in ipsas sæculentum & melancholicum sanguinem reiiciente. Hippoc. etiam hoc loco hæmorrhoidas oriri dicit, quum bilis aut retorridus humor ad venas quæ sunt in ano decubuerit, hic

enim φλέγμα sumitur pro humore retorrido, & ad inflammationem accommodato, quemadmodum, & libro de vlceribus sententia tertiâ φλέγμα, φλέγμασιν ἢ φλόγῳσιν indicare videtur. Quomodo autem excitentur hæmorrhoides & intumescant, earumque venularum quæ sunt in ano capita promineant, sanguinemque aliquando profundant, tam dilucide describit, vt explanatione non sit opus. Controuersum tamen est, vnde venæ quæ circa sedem intumescunt, prodeant, an à vena caua, an vero à ramis venæ portæ, fere omnes in eam inclinant sententiam, vt putent a ramis venæ portæ deriuari hæmorrhoidas, anatomica tamen inspectio, & profluentis sanguinis copia & qualitas facile conuincunt aliquando venas istas pendere a ramis venæ portæ, aliquando a vena caua exoriri, easque non solum corporis expurgare cacochymiam, sed & plenitudinem deplere. Portio enim rami mesenterij recto intestino & sedi inferitur, & ramulis aliquot venas hæmorrhoidas excitat, per quas venas expurgatur corpus, sanguisque qui profunditur, sæculentus & melancholicus apparet, neque per venas istas fieri potest copiosum sanguinis effluuium. Hypogastria etiam vena, constituens tertium ramum diuisionis venæ cauæ, cum ad crura fertur, in recti intestini musculos, & musculosam cutim spargitur, ibique hæmorrhoidas etiam producit, per quas sanguis purus & copiosus aliquando excernitur, quique sola quantitate peccat.

Θεραπεύειν δὲ δεῖ ὥδε, πρῶτον μὲν ὑπαρχέ-
τω εἶδεναι ἐν οἷῳ χεῖω γίνονται, ἀρχὸν γὰρ καὶ
τάμνων, καὶ ἀποτάμνων, καὶ ἀναρράππων καὶ δαίων,
καὶ ἀποσέπων, ταῦτα γὰρ δοκέει δεινότερα
εἶναι, ὃ δὲν ἂν σίνοιο.

HÆmorrhoidas hac ratione curare
conuenit, primùm equidem nosse
oportet, qua in parte sint. Anum enim
& excidens, & consuens, & vrens, & pu-
trefaciens, grauissima enim hæc esse vi-
dentur, nihil detrimenti afferes.

Curationem hæmorrhoidum variam pro-
ponit, per vstionem, per præcisionem, per
auulsionem siue detractionem, per ferramen-
tum candens fistulâ immissum, per medicamen-
tum hæmorrhoidas consumens & extirpans, &
tandem per balanos & glandes. Cæterùm vt te-
merè hæmorrhoidibus non est assuescendum, sic
neque temere hæmorrhoidum fluxus suppri-
mendus, in quibusdam enim parum tutò suppri-
mitur, qui sanguinis profluvio imbecilliores nō
sunt, habentque purgationem, non morbum.
Ideoque curati quidam cum sanguinis exitum
non haberent, inclinata in præcordia ac viscera
materia, subitis & grauissimis morbis correpti
sunt. Si ora venarum sanguinem solita fundere,
subito suppressa sint, aut aqua inter cutem, aut
tabes sequitur, ex aphorismo 12. libri 6. Quibus
etiam naturis salutaris est hæc euacuatio, vt me-

lancholicis, nephriticis, epilepticis, quartana aut lepra laborantibus, in his non est suscipienda hæmorrhoidum curatio, sed in ijs tantum quibus nocet, hæc enim affectio malorum plurimorum quibusdam occasio est, nam ut ait *Ætius* libri 14. capite quinto, deformitatem & miseram vitam hæmorrhoides inducunt, multos etiam vita priuant, & deformitatem quidem propter totius corporis fædum colorem ex euacuatione succedentem, miseram & infelicem vitam, propter corporis debilitatem, quandoque autem & de vita periclitantur sic affecti, quum ob immodicam euacuationem labefactatur hepatis αἷματις, in talibus hæmorrhoidas curare conuenit. Hæmorrhoidum autem curatio propriam hanc animaduersionem desiderat, ut prius sciamus, quam in parte consistant hæmorrhoides, nam ut ait author definitionum medicarum, αἱ μὲν ἐν δακτυλίῳ γίνονται, αἱ δὲ ἐν σφιγκτῇ, αἱ δὲ ἐν τῷ ἐπιπυθυσμένῳ, quædam fiunt in ano, quædam in sphinctere, quædam vero in recto intestino. Hic primum agit de curatione earum hæmorrhoidum quæ in ano, sede, aut podice consistunt. Αἰσχρὲς enim hoc loco ἀπὸ τῆς ἑδρας sumitur, pro sede & podice, quamuis apud Hippocratem aliquando sumitur pro recto intestino, ut patet ex aphorismo 58. libri 5. & ex Galeni libro πρὸς μίτηρας ἀνατομῆς. Itaque inconsideratè vertit hoc loco interpretes, rectum intestinum. Cum enim sphincter & rectum intestinum nervosa constent substantia, neque vstionem neque sectionem, sine conuulsionis periculo sustinent, podex autem cum sit carnosus & ignobilis ea remedia per-

ferre potest. Intestina quidem inter partes principes numerantur *Ætio* libri 14. capite 8. externa tamen recti intestini extremitas princeps pars non est, sed & dum vritur aut secatur nulum periculum inducit, velut ipsa experientia testatur. Curationem per incisionem, vstionem, & consumptionem persequitur hoc libro, quomodo confluantur, aut per futuram extirpentur, non docet, quod paucis perstringit in fine de dieta acutorum. Paulus etiam libro tertio acu compungit hæmorrhoidas. Cæterum quod nos vrēs, vertimus, est in codice Aldino, *δαίω*, id est *καίω* Hesychio, in codice Basiliensi, & veneto ex restitutione Mercurialis, legitur *δέω*, ligans, quæ lectio etiam non reiicienda, cum Paulus libro sexto hæmorrhoidas lino quintuplici astringat, ut hoc ligamine decidant, quo ab Hippocrate desumptum est libro de fistulis. Est autem hæmorrhoidum, ut & aliarum sedis affectionum curatio *ἐργώδης*, laboris tædiique plena, nam ut ait Galenus libro nono *καὶ τόπος*, sedis vitia ob multas causas sunt *δυσάτα*, difficilēque curam accipiunt, quod multo sensu hæc pars prædita sit, facileque per acria & austera medicamenta irritetur, tum quod excrementorum transitus per se mordax, tūcque potissimum magis quando vna cūm excrementis fertur bilis aut ichor siue serosus humor, præterea cūm ad excrementorum excretionē impellantur ægrotantes tempore minime conuenienti, non habent medici certum tempus ad imponenda pharmaca, quin & humiditas & caliditas ipsius loci, siccantibus simul & refrigerantibus opus habens, non pa-

rum confert, & vitia hæc sint ægrè curabilia, mordent enim astringētia locus autem hic morsum ferre non potest. Locus etiam cum sit declivis, multasque venas eò peruenientes habeat, fluxionibus excipiendis est opportunus, vnde difficilis etiam curatio, quam difficultatē etiam auget fœditas partis, quam inuitissimus quisque alteri ostendit.

Παρασκευάσασθαι δὲ κελύω ἐπὶ ἡ ὀκτὼ σιδήρεα σπιθαμίαια τὸ μέγεθος, πάχος δὲ ὥσπερ μύλης παχείης, ἐξ ἄκρου δὲ κατακαμψαι, καὶ ὅτι τῷ ἄκρῳ πλατὺ ἔστω, ὡς ὅτι ὀβολὸς μικρὸς, περιχαῖνης δὲ φαρμάκῳ τῇ πρῶτον, αὐτῇ δὲ ἡ ἀν' ἐπιχειρέης καῦσαι, ἀνακλίνας τὸν ἀνθρώπον ὑπὸ πῦρ, καὶ περικεφάλαιον ὑπὸ πῦρ ὀσφυῖ ὑποθεῖς, ἐξανγκάζειν ὡς μάλιστα τοῖσι δακτύλοισι πῦρ ἔδρῳ ἔξω, ποιεῖν δὲ καὶ λιβανῶνα τὰ σιδήρεα, καὶ καῖν ἕως ἀν' ἀποξηράνῃς, καὶ ὅπως μὴ ὑπαλείψῃς, καῖν δὲ καὶ μηδεμίαν εἶσαι ἀκρυτον τῇ αἰμορροΐδων, ἀλλὰ πάσας ἀποκαύσεις.

FErramenta septem octoſue parare iubeo, quæ magnitudine ſpithamam & craſſitudine ſpecillum craſſum exæquent, ſumma parte recurva, ſitque in extremo latitudo, qualis in paruo obolo, præcedenti die, corpore per pharmacum præpurgato, eâ ipſâ qua adurere

aggrederis, resupinum hominem inclinato, puluinumque lumbis subiicito, sedemque digitis quantum poteris foras attrahito, datoque operam ut adsint candentia ferramenta, quibus hæmorrhoidas adurito, donec resiccaueris, non autem ut leuiter attingas. Vrere vero oportet, nullamque hæmorrhoidem sine adustione relinquere, sed omnes adurere.

Ad miratione dignus Hippocrates ut in omnibus operibus artis sic & in hæmorrhoidum vstione, primo docet quibus ferramentis instructus esse debeat chirurgus, secundo corpus ante vstionem purgandum esse, deinde qua figura collocandus æger, quid circa sedem moliendum, quæ cum omnia rite comparata sunt, tum deinde candentibus ferramentis hæmorrhoidas adurit non leuiter, sed tum adurendi finem facit, cum exsiccatae fuerint, omnesque hæmorrhoidas adurendas esse, nullamque prorsus relinquendam censet, ferramenta vero septem octo-ve parari iubet pro multitudine hæmorrhoidum quæ vstionem desiderant, quorum magnitudinem siue longitudinem vult esse vnus spitamæ, aut dodrantis, ut loquitur Plin. li. 7. ca. 2. Est autem *σπιταμή* Hesychio τὸ μέτρον, τὸ ἀπὸ τοῦ μεγάλου δακτύλου ὅπῃ τὸν μικρὸν διάστημα ἐκτείνειν, mensura, nempe à magno digito ad minimum interual- lum extensum, vel mensura duodecim digito-

natio, perfecta liberatio & legitima curatio;
 rum. Latitudinem in extremo partis recurvæ
 requirit, qualis est in paruo obolo, est autem
 obolus genus numismatis minimi, estque sexta
 drachmæ pars, vel scriptuli dimidium. Plinio
 enim libri 21. capite ultimo, drachma sex obolos
 pondere efficit. Cum ferramenta διαφανέα trans-
 lucida esse vult, intelligit ἱκανῶς διάπνεα, abun-
 de ignita & candentia, vt docet Gal. commen-
 tario in sententiam 43. sectionis primæ de arti-
 culis. Quod Hippocrates subiungit, καὶ ὅπως μὴ
 ὑπαλείψῃς, & vt non sublinas, vertimus, non au-
 tem vt leuiter attingas, quod facere solent qui
 partem aliquam oleo illinunt, vel qui fucum
 parti admouent, vel qui parietem calce deal-
 bant, ὑπαλείφειν enim propriè est oleo illinere;
 deinde etiam fuco vti, dicitur etiam ὑπαλείφειν
 καὶ τοῖχος κονία ἢ ἐτέρα ὅλη, paries dealbari calce,
 aut alia materia, ex commentarijs Eustathij. ξ.
 ἰλιάδ. Vult ergo Hippocrates vt hæmorrhoidas
 ferro candente adhibito aduramus, dum resic-
 centur, & breui decidant, hunc autem locum sic
 vertit Cornarius, hoc ita vt non contingas. Da-
 lechampius vero, admouendo tantum ferrum
 candens, non autem tangendo, Hollerius dixit
 Hippocratem, vrere hæmorrhoidas, non adhi-
 bito venæ ferro, sed admoto. Hic autem Hippo-
 vere adurit, & contra hanc vstionem remedia
 præscribit, sententia quinta huius libri. In con-
 dylosis tamen extractione si profluat sanguis, ve-
 nam adurit, sed cauet diligenter ne ferro contin-
 gat, sed tantum propius admouet ferramentum

ad deficcandum, quod interna sit ibi vena & in recto intestino. Ætius tamen libri 14. capite octavo, de prolabentis sedis perustione, inurit extremam & externam sedis partem per cauteria πυρλωρεῖν nuclei formam referentia, moderatis interuallis quod, nullum periculum inducit. Hippocrates hîc ter repetit, vt omnes aduramus, nullamque relinquamus sine vstione, quoniam vt ait Galenus libro 4. κτ' ἔνν, circa initium, τὰ δ' ἀναγκαῖα καὶ μεγάλῳ φέροντα βλάβην, εἰ παροφθῆν, βέλπτον ὅτι καὶ δις καὶ τοὺς λέγειν, quæ necessaria sunt, & maximam noxam afferunt neglecta, satius est bis terve repetere. Sed huic Hippocratis præcepto de adurendis omnibus hæmorrhoidibus repugnat aphorismus duodecimus libri sexti. Diuturnas curanti hæmorrhoidas, nisi vna quæpiam seruetur, periculum aquæ inter cutem vel tabis impendet. Hic non leuis est controuersia inter Galenum & Ætium, an ita scripserit Hippocrates hunc aphorismum. Galenus sic legit, optimaque ratione, ait, consulit Hippocrates in curatione diuturnarum hæmorrhoidum vnâ esse seruandam, vt per hanc scilicet sæculenta hepatis cacochymia vacuari possit. Ætius vero sic legit, Diuturnas sananti hæmorrhoidas, nisi seruetur, periculum aquæ inter cutem, aut tabis impendet, nec enim velut quidam opinantur, dixit, nisi vna seruetur hæmorrhoids ad sanguinis excretionem, sed dixit, nisi seruetur, hoc est, nisi conuenienti diætâ utatur. Quod autem sic velit Hippocrates, ipsa aphorismi distinctio ostendit, ait enim hic vir, diuturnas sananti hæmorrhoidas, est autem sa-

quare iuxta Hippocratem non oportet aliquam hæmorrhoidem relinquere, sed omnes excindere, & post perfectam ipsarum curationem, per conueniētem diætā ad naturalem statum corpus curatum reducere; incideréque cubiti venam tempore opportuno, quo videlicet coaceruatus in corpore sanguis euacuetur, hætenus *Ætius*. Vtra autem lectio retinenda sit, quidque de hac controuersia sit sentiendum, non facile est, statuere, expositoris tamen officium cogit me quid sentiam dicere. Cum Hippocrates hoc libello suadeat hæmorrhoidas omnes esse aduendas, excindendas aut putrefaciendas, mihi sit verisimile, Hippocratem non consuluisse, vt in curatione hæmorrhoidum etiam diuturnarum, vna quæpiam relinquatur ad sanguinis excretionem, malóque cum *Ætio* legere, ἢν μὴ φύλαχθῇ vel vt alij legunt διαφυλαχθῇ, quam cum *Galeno* & alijs, ἢν μὴ μία φυλαχθῇ, quod ratio & experientia conuincit, alioquin diuturnam fluxionem nemo sanare auderet; ne humor qui fluere solebat, in aliquam partem principem decumbat, quamuis enim periculum imminere videatur, ne graues & subiti morbi superueniāt, id tamen præcautione fugiendum, præterea dictio qua vtitur Hippocrates, non relinquere, sed seruare & cautionem adhibere significat, φυλάττεσθαι enim proprie est φυλαχθῆναι, ὁππότερον, φερεσθῆναι ἀσφαλίζεσθαι, sibi cauere, custodire, obseruare, tutum se reddere. Sic Hippocrates γ. ὁππότερον hoc verbo vtitur, βέλτιον δὲ μέχρι τῶν τεσσάρων φυλάττεσθαι, melius est ad decimū quartum vsque sibi cauere, & libro de ære, locis,

& aquis,

& αἰσῖς, φυλάττειται καὶ μάλιστα τὰς μεταβολὰς τῶν
 ὡρίων μεγάλαις, obseruare oportet maxime, ma-
 gnas temporum mutationes. Paulus etiam cum
 dicit ex sententia Hippocratis vnam hæmor-
 rhoidem relinquendam esse purgationis gratia
 libro tertio, non dicit φυλάττειν, sed ὑπελείπειν.
 Idem libro sexto, dum scribit hæmorrhoidas fu-
 ne esse constringendas, vna duntaxat relicta,
 καταλείψαντες μίαν dixit. Itaque cum in aphorif-
 mo scribatur διαφυλαχθῆναι, videtur Ætius in pro-
 pria significatione accepisse suspicor autem Ga-
 lenum hunc de hæmorrhoidibus libellum non
 accurate legisse, neque enim pharmacum ex hoc
 libello vllum desumpsit, quamuis multa recen-
 seat contra hæmorrhoidas ex Asclepiade, Ma-
 gno Tarsensi, Diogene, & Scribonio largo, cir-
 ca finem libri noni κε' τοπικῶς. Hollerius Hippo-
 craticæ medicinx, si quis alius, studiosus ita hunc
 locum conciliat, vt dum incipit medicus hæmor-
 rhoidibus manum admouere, post conuenien-
 tem dietam, missionem sanguinis & purgatio-
 nem non protinus & simul omnes exurat aut ex-
 cindat, si plures sint, sed vna relinquatur, vt pau-
 latim, non temere & præcipitanter fluxus cohi-
 beatur, tandem verò dum per sanare vult cele-
 bratis vniuersalibus remedijs tum demum nul-
 lam relinquat. In annotationibus eiusdē capitis
 de hæmorrhoidibus, Paulo aliter rem istam di-
 stinguat, & tamen ad huius libri sententiam ma-
 gis accedit, in hæmorrhoidum fucata & non le-
 gitima curatione vna relinquenda est hæmor-
 rhois, in artificiosa, omnes sunt adurendæ & ex-
 cindendæ. Itaque in aphorismo videtur agere de

fucata curatione, in hoc libello curationem artificiosam docet. Postremo Celsus ipse Hippocratis interpres libri secundi capite septimo, aphorismum illum latinū reddens de relinquenda vna hæmorrhoidē ne verbum quidem facit, sic autem vertit. Si ora venarum sanguinem solita fundere subito suppressa sint, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur. Sed subito supprimi putat in eo qui sibi probe non cauet. Idem libro sexto circa finem hæmorrhoidum curationem proponens, primum leuioribus remedijs sanguinem supprimentibus pugnat contra profluvium sanguinis, inflammationi etiam medetur admotis quibusdam pharmacis & conuenienti præscripto victu, si ista parum iuuant, solet aduentia medicamenta imponere, vt hæmorrhoidum capitula absumat, adustis capitulis fit cicatrix, quæ sanguinem fundi prohibet, & ne quid periculi afferat suppressus sanguis, multa exercitatione materiam digerendam esse suadet, & præterea interdum ex brachio sanguinem esse mittendum, vnā autem relinquendam esse non præcipit, libro etiam septimo circa finem agens de hæmorrhoidum capitulis alligandis & incidendis, si duo triāve sunt, inquit, imū quodque primum curandum, si plura, non omnia simul, ne tempore eodem vndique teneræ cicatrices sint. Non suadet relinquendum esse aliquod venarum capitulum: sed tantum ne omnia simul incidantur, vt facilius cicatrix induci possit.

Γινώσκει δὲ ὃ χαλεπῶς τὰς αἰμορροΐδας, ὑπε-
ρέχουσι γὰρ ἐς τὸ ἐντὸς τῷ ἀρχῷ, οἷον ῥάγες πε-
λιδναί, καὶ ἅμα ἐξαναγκασμένου τῷ ἀρχῷ,
ἐξακοντίζουσιν αἷμα, κατεχόντων δ' αὐτῶν ὅταν
χαίηται, πρὶν κεφαλὴν καὶ τὰς χεῖρας, ὥς μὴ
κινέηται, βοάτω χυρόμηνος, ὃ γὰρ ἀρχὸς μάλ-
λον ἐξίσχει.

FAcile cognosces hæmorrhoidas, in
interna enim ani parte prominent
velut vuæ acini liuidi, & simul dum pre-
mitur anus, sanguinem eiaculatur. Dum
autem vritur nonnulli caput contineât,
manúsque, ne dimoueatur. Clamet au-
tem ipse qui vritur, anus enim magis fo-
ras sese exhibet.

QVibus signis hæmorrhoides quæ aduren-
dæ sunt, deprehendantur, nunc docet,
proponit autem tantum duo signa, quæ visu
percipi possunt, nempe venarum capitulum in
ano surgens simile acino vuarum, & profusio-
nem sanguinis in coactis deiectionibus alui &
aliquando sine his. Cætera signa non recenset,
quia medico in adurendis capitulis hæmorrhoi-
dum occupato non ita protinus occurrunt. Hip-
pocrates hoc loco dicit hæmorrhoidas in ano
prominere, tanquam vuarum acinos liuidos, vin-
de Arabes diuisionem & differentiam illam hæ-
morrhoidum quadripartitam excogitarūt à ma-

teria desumptam, sed non ea fuit mens Hippocratis, signum enim externum & similitudinem quandam cum acino aut grano vix ad dignotionem affert, ut etiam postea curatione tertia dicit adnasci hæmorrhoidi extuberanti veluti fici fructum. Cætera facilia sunt, & ad adurendi viam faciliorem pertinent. Cæterum in exemplaribus Græcis male legebatur τῆς κεφαλῆς, quod autem scribit ἐξίχει, sese exhibet, vertit Celsus, relaxatur & foras prodit.

Ε'π' αὐτῷ δὲ χεύουσιν, φακοὺς καὶ ὀρόβους ἐψησας ἐν ὕδατι, τρίψας λείους, κατὰ πασσέ πέντε ἢ ἑξ ἡμέρας, τῇ δὲ ἐβδόμῃ ἀπόγνον μαλθακὸν ἱκνεῖν ὡς λεπτότατον, πλάτος δὲ εἶναι τῷ ἀπόγνῳ, ὅσον ἑξ δακτύλων πάντη, ἔπειτα ὀπιθεῖναι ὅππῃ τὸν ἀπόγνον, ὀθόνιον ἴσον τῷ ἀπόγνῳ, λεπτὸν καὶ λεῖον, ἁλεῖν μέλιτι, ἔπειτα ὑποβαλὼν τῷ δακτύλῳ τῷ λιχνῷ τῆς ἀριστερῆς χειρὸς, μεσὸν τὸν ἀπόγνον ὥσαι χάτω τῆς ἔδρης ὡς προσωτάτω, ἔπειτα ὀππῇ τὸν ἀπόγνον προσθεῖναι εἰεῖον, ὡς ἂν ἐν τῇ ἔδρῃ ἀτρεμίζῃ, ἀφ' ὧσας δὲ ἐν τῇσι λαγύσι καὶ ὑφεῖς ταινίην ἐκ τῆς ὀππιδειν, ἀναλαβὼν ἐκ τῶν σκελέων τὸν ὀππιδεσμον, ἀναδῆσαι ἐς τὸ, ἀφ' ὧσας παρὰ τὸν ὀμφαλόν, τὸ δὲ φάρμακον ὃ εἶπον ὀππιδεῖτο πυκνῶ τιῶ σάρκα ποίειν, καὶ ἰσχυρῶ φύειν, ταῦτα δὲ δεῖ ὀππιδεῖν μὴ ἑλαστον ἡμερῶν εἴκοσι.

Vbi combufferis, lentem ac eruum coquito in aqua, eaque bene contrita quinque sexve dies imposito, septima vero die spongiam mollem quàm tenuissime concidito, sitque spongiæ latitudo sex digitorum omni ex parte, deinde super spongiam imposito linteolum æquale spongiæ, tenue, læue & illitum melle, postea sinistrae manus indice digito subiecto, mediam spongiam deorsum in sedem quàm longissimè impellito, tùm super spongiam lanam apponito, vt in sede immota permaneat. Vbi autem ilibus zonam admoueris, fasciamque submiseris ex posteriore parte, per crura vinculum receptum, ad zonam circa vmbilicum deligato, pharmacum autem quod dixi alligatur ad gignendam celerem carnem, eamque firmam producendam. Hæc autem non minus quam viginti diebus deligare conuenit.

A Dustio hæmorrhoidum partibus ani vim infert, inflammationem enim relinquit, crustas siue *εσάρεις* inducit, & his solutis remanet vlcus, quibus omnibus remedia præscribit Hippocrates. Cataplasma enim ex lente & eruo in aqua decoctis, benèque contritis *πυλὺρον*

& his omnibus affectibus conueniens est. Lens enim cum astringat, & desiccet, mediūque teneat caliditatis & frigiditatis inflammationi medetur. Sic Hippocrates lentem in vino coctam & bene contritam imponit, cum periculum est ne superueniat vlceribus erysipelas, sententia 24. libri de vulneribus. Sic Celsus in curatione adustorum dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam præcipit, ad crustas resoluendas lenticulæ cum melle farina conuenit, Celso libri quinti, capite decimo & vigesimo septimo. Paulo etiam libri sexti capite 66. *φαρμάκω* *μελι* pharmacum est, quod post vstionem crustam adimit, est autem *φαρμάκω* *μελι*, farina lentis cui mellis aliquid adiectum est. Plinio etiam libri vigesimi secundi capite vltimo, lens aqua semicocta, postea trita & per cribrum effuso fure, curat quæ sunt ambusta, eruū vero desiccans secundo gradu, calefaciens primo, & quatenus amaritudinis est particeps, vim detergendi habens, sarcoticum est, itaque merito dicit postea Hippocrates pharmacum hoc valere ad celerem carnem gignendam, eamque validam producendam. Hoc remedio sex primis diebus vtitur ad eos quos dixi vsus, septimo vero die spongiam mollem quam tenuissime incidit sex digitorum latitudine, cui superponit linteolum tenue, læue, spongiæ equale, illitum melle, quam deinde spongiam in sedem quantum potest impellit. Spongia cum sit vulneraria & *τελευματικὴ*, vulnera non solum conglutinat, sed & partes fluxione laborantes desiccet, sanguinis profluvium sistit, Dioscoridi libro quinto, linteolum

superponit spongiæ, vt siccandi facultatem augeat, sic sententia vndecima libri de vulneribus, sæpius spongiam vulnere admouet, rursusque linteam purum & siccum sæpius adhibet, melle autem illinit, vt melius adhæreat, & vt sordes, si quæ sint, vim detergendi habeat, similem spongiæ admotionem & ijsdem fere verbis iterum tradet sententia quinta libri de fistulis, cur lanam superponat, ipse declarat, hæc omnia vinculo conuenienti deligat, non minus quam viginti diebus. Hoc vinculum repetit sententia decima libri de fistulis, vbi ijsdem fere verbis vtitur, meminit etiam sententia quinta eiusdem libri Vinculum autem hoc ex duabus fascijs componitur, prior fascia zonæ modo cingitur huic mediæ assuitur alterius fasciæ caput, & ambæ simul literam T, referunt, hæc altera fascia a dorso demittitur, & per crura porrigitur, atque ad priorem circa vmbilicum deligatur. Cæterum quod dixit Hippocrates πυκνὴ τὴν σάρκα ποιεῖν, nos vertimus ad celerem carnem gignendam, nam vt ait Galenus commentariorum de diætâ in morbis acutis sectione tertia, apud veteres horum nominum τὸ πυκνὸν καὶ τὸ ταχέος vsus confunditur, quamuis etiam πυκνὴν σάρκα conuenienter dicere, duram & densam possimus.

Ποφείν δὲ ἅπασι τῆς ἡμέρης ἄλευρον, ἢ κελεύρον, ἢ τὸ ὑπὸ τῶν πιτύρων, καὶ πίνειν ὕδωρ, ἢν δὲ ἐς ἀφοδὸν ἴξῃται, ὕδατι θερμῷ ἀγνίζεν, λούεσθαι δὲ ἀπὸ τρίτης ἡμέρης.

Semel autem die assumenda est sorbitio facta ex farina, aut ex milio, aut ex furfuribus. Aqua potui danda. Si ad aluum exonerandam desideat, aqua calida abluere oportet. Tertio autem quoque die lauare conuenit.

Hæmorrhoidibus vltis aut quouis modo exulceratis conuenit victus *ὀλίγαιμος* paucique sanguinis efficax, minimèque recrementitius, quique siccet & astringat, vt docet Paulus libri tertij cap. 60. Suadet Celsus vt in ani vitijs per primos dies sorbitionibus ægrum sustineamus, quam victus rationem hic præscribit Hippocrates, sic enim vlcera desiccantur, aluóque astricta pauca excrementa ad anum feruntur, quæ pharmacorum vires alioquin infringerent sorbitiones autem siue *ροφήματα* veteres medici inuenerunt vt paucam valentioris cibi quantitatem multa aqua diluentes, ei vim mixtura & coctione detraherent, ait Hippocrates libro de veteri medicina. Apud Celsum ex frumento, milio & panico fiunt potiones, sorbitiones, pulticulæ, panes, quæ sunt infirmissimi, mediij, aut firmissimi alimenti, potiones quidem & sorbitiones, imbecilliores sunt cibi, pulticulæ, mediocres: panis autem alimentum est valentissimum, *ἄλευρον κρείων τὸ τῶ σιτῶ σιτῶ*, Aleuron proprie est farina tritici, Hesychio, quamuis apud Hippocratem *ἄλευρον φακῶν*, farina lentium & aliorum passim dicatur. Galeno vero in expositione linguarum Hippocratis, farinæ tenuiores ἄλνεα

nominantur, crassiores κείμενα, mediocres ἀλφίτα,
 Sorbitio autem ex quacumque farina fiat, mini-
 mi est alimenti, aluūmque astringit, vt etiam ea
 quæ fit ex milio, milium enim Dioscoridi. minus
 cæteris frugibus alit, aluūmque sistit, τὸ ὑπὸ τῶν
 πι-τύρων, est decoctum furfurum, quod est mi-
 nimi alimenti. Aqua autem omnium potionum
 imbecillima est, quam idcirco bibendam suadet
 Hippocrates post deiectionem sedes aqua cali-
 da est abluenda, ad detergendas & expurgandas
 sordes. Quod subiicit tertio quoque die lauan-
 dum esse, id intelligendū est, quamuis non deij-
 ciat, nihilominus tamen tertio quoque die anus
 est subluendus, ad dolorem leniendum, tensio-
 nem minuendam, & ad humores qui in ano coa-
 ceruantur extenuandos & detergendos λούσσει
 autem non solum lauare aut balneo vti signifi-
 cat, sed etiam perfundere & humectare, vt scri-
 bit Galenus in expositione linguarum.

Ἐτέρη μέθοδος, ἐμβαλὼν τιτὺ ἔδρην ὡς μά-
 λιστα ἀνοῶν ὕδατι θερμῷ, ἔπειτα σποτάμνειν
 τῶν ἡμορροΐδων τὰ ἄκρα, φάρμακον δὲ πρε-
 σκατασκευασθῆναι πρὸς τιτὺ τομίλιν, τὸδε,
 οὐρήσας ἐς χαλκῆιον ὀπίπασσον ὅππὶ τὸ οὖρον,
 χαλκῆ ἄνθος ὀπιοῦ καὶ τεττειμένον, ἔπειτα διείς
 καὶ κινήσας τὸ χαλκῆιον, ξήρανον ἐν τῷ ἡλίῳ,
 ὅταν δὲ ξηρὸν γένηται, συνξέσας τείψον λεῖον,
 καὶ πρὸς τίθει τῷ δακτυλίῳ, καὶ σπλινῖα ἐλα-
 γώσας πρὸς τίθει, καὶ ἀπόψιν ἐπάνω ὀπίδει.

Alia methodus. Sedem quam maxime extractam aqua calida foueto, deinde hæmorrhoidum capitula resecato, pharmacum autem hoc sectioni aptum præparatum sit. In vas æneum vbi minxeris, urinæ inspergito florem æris vsti tenuissimè contriti, deinde vbi dilueris, vāsque æneum agitaues, in sole ficcato, vbi inaruerit, deradito, tenuissime conterito, sedique apponito, pannosque in oleo tinctos superponito, spongiāmque super deligato.

Aliam hæmorrhoidum curationem, proponit, quæ fit per excisionem, in qua purgandum corpus, vt in prima curatione, quæ fit per adustionem, ijs denique cibus ac portionibus vtendum. Aqua vero calida imprimis sedes fouenda, vt relaxetur & foras prodeat, vbi conspicuæ fuerint hæmorrhoides, earum capitula scalpello excidito. Leonides apud Paulum forcipe præhensas hæmorrhoidas scalpello deinde excidit. Celsus & Ætius hæmulo excipiunt, linóque alligant, tum demum incidunt, post incisionem imponit pharmacum detergens, astringens & cicatricem inducens. Vrina enim hominis extergendi vim habet, ex æneo vase facultatem æris contrahit, quod astringit, desiccatur, & cicatricem inducit, huic urinæ inspergitur flos æris vsti, qui tenuioris est substantiæ, quam æs vstum, estque pulcherrimum cicatrici inducendæ re-

medium, absumit etiam carnosæ sedis vitia, Dioscoridi. Sæpius agitatur, ut plurimum ex ære contrahat, interdiu soli exponitur, ut siccetur, aut si sol absit, calidas esse ædes saltem conuenit, sic omphacium in vase æris rubri contundit, soli exponit interdiu, noctu vero summonet, ne rore madefiat, sententia vigesima quinta, libri de vulneribus. Vbi hæc sole siccata fuerint, deradit, tenuissimæque conterit, tum demum puluerem illum tenuissimum sedi imponit, pānόςque oleo madentes superdat, ad leniendam & temperandam medicamenti acrimoniam, his omnibus superponenda & deliganda spongia, ut siccet & sanguinem excipiat si forte profluat. Cæterum initio huius sententiæ in Aldino codice scribitur, *ἑτέρα μέθοδος*, in Basilienfi & Veneto ex restitutione Mercurialis, legitur, *ἑτέρα θεραπεία*.

Ἄλλος τρόπος, προσφύεται πρὸς τὴν αἵματι πρὸς τὴν κονδυλώδει, οἷον συκαμίνου καρπὸς, καὶ εἰ μὴ ἔξω σφόδρα ἢ ἡ κονδυλώσις, περιπέφυκεν αὐτῇ χαλυπτήρ ὁ τῆς σαρκὸς, καθίστας οὖν τὸν ἄνθρωπον οὐκ ἀξ' ὅτι ὀλμων δύο, σκόπει, εὐρήσεις γὰρ πεφυσιμένα τὰ μεσσηνὶ τῆς παρὰ τὴν ἑδρῆν, τὸ δὲ αἷμα ἐκχωρεῖν ἀποδοῖν, ἢν γὰρ οὐκ ἴδωσιν ὑπὸ τῷ χαλυπτήρ τὸ κονδυλωμα, τῷ δακτύλῳ ἀφελῆν, οὐδὲν γὰρ χαλεπώτερον, ἢ ὅτι τῷ τραύματι δειρομένου τὸν δακτύλον μεταξὺ τῷ δέρματι, καὶ τῆς σαρκὸς ἀφελῆν, καὶ ταῦτα διαλεγόμενος ἅμα λαίθανε ποίειν, ἐπ' οὗ δὲ ἀφελῆς τὸ κονδυλωμα, ἀνάγκη

ῥέεσθαι δρόμους αἵματος ἀπὸ πάνσι τῆς ἀφαι-
 ρέσιος, τάχα γὰρ ἀποπλεῦσαι οἶνω αὐτῆρῳ κη-
 κίδας ὑπερέχας, καὶ ἥτε αἵματις οἰχίσεται
 σὺν τῷ κονδυλώματι, καὶ τὸ κέλυμμα κατα-
 γήσεται, καὶ ὅσω ἂν παλαιότερον ᾖ, ῥηίδως ἔσται
 ἢ ἱήσις.

Alius modus. Adnascitur ad ve-
 nam sanguine fluentem collosam
 & eminentem, tanquam fici fructus, & si
 exterior admodū fuerit callosa illa emi-
 nentia, velum carnosum circa ipsam ad-
 hærescit, hominem igitur ubi colloca-
 ueris genibus flexis super duas clunes,
 anum inspicito, reperiēs enim inflatas
 partes inter nates iuxta sedem, sangui-
 nem vero ex interiori loco procedere. Si
 sub velamento remittatur condyloma,
 digito demendum est, neque enim ma-
 iore negotio id fiet, quam si digitum in-
 ter pellem & carnem ouiculæ dum ex-
 coriatur ad extremum perducas. Atque
 hæc inter loquendum latenter perage,
 postquam condyloma abstuleris, neces-
 se est ex tota illa excisione sanguinis im-
 petum fluere, statim, vino austero in quo
 gallæ maceratæ fuerint, abluere oportet.
 Atque tum vena ipsa sanguine fluens

cum condyomate euanesceat, tum etiam velamentum ipsum subsidet, quantòque id vetustius fuerit, tanto facilius erit curatio.

Tertiam hæmorrhoidum curationem proponit, in qua potissimum condylomatis curandi rationem explicat. Tuberculum autem quod condyloma appellatur in sede fit ruga aliqua corporum in ano re duplicatorum insurgente, ac præter naturam intumescente. Cum enim sinuosus sit anus, rugas coagmentatas habet, ubi vero amplius intumuerit ruga, tunc condyloma nascitur, fitque aut præcedente inflammatione, aut rhagade, Paulo. Hæmorrhoides vero aliquando inflammationem in ano excitant calefacto in venulis sanguine, aliquando verò dum finduntur rhagadas generant, indeque condyloma producitur. Hippocrates hic circa hæmorrhoidas callosas & eminentes adnasci dicit *σύνκωσιν* ficum aut mariscam, *συγκέμνον χερσὶν*, fici fructum non autem mori conuertimus, ut alij vertunt interpretes, ficus enim & condyloma, ani sunt affectiones, quæ eandem curationem requirunt, & Guido de utroque hoc affectu simul agit, iisdemque curat remedijs, proprie autem ficus est eminentia tuberculosa, aspera, subrubra, oblonga, magnitudine thymum excedens, tuberculum autem in ano cum callum obduxit & induruit sæpius condyloma appellatur. Qui *συγκέμνον* morum vertunt. Celsum habent authorem, qui libro tertio cap. 18. Græcos mo-

rum συκάμινον appellare scribit, verum idem Celsus libri quinti capite 18. sycaminum alias sycomorum vocari dicit dum malagmatis Andree compositionem recenset. Præterea Dioscorides libro primo, sycomorum a quibusdam sycaminum vocari testatur. Est autem sycomorus ficus Ægyptia, quæ folio magnitudine & aspectu similis est moro, eiusque pomum ficus est prædulcis Plinio libri 13. capite 7. In externis illis eminentijs callosis adhæret operimentum & operculum quoddam carnosum quod *καλυπτήν* & *κέλυμμα* Hippocrati dicitur, Celso velum libro septimo circa finem, apud alios authores huius mali ne nomen quidem legi, fitque cum hæmorrhoidum externarum capitula surgunt, simul enim partem ani in tumorem attollunt, cutisque carnosæ excrescens eminentia fit hæmorrhoidum *καλυπτήν* siue velum. Ut autem commodè curari possit condyloma, quod ad cibos potionésque pertinet, eadem seruari etiam debent quæ prius scripta sunt, collocandus autem est æger super duas clunes genibus flexis, ut ani eminentiæ illæ callosæ conspicuæ sint, ἐπὶ ὀλμων *δύο* dixi super duas clunes, non super mortaria duo, aut super lapides duos, ut alij interpretes, & certe sæpius miratus sum situm illum insolitum. Cum enim in adustione hæmorrhoidum resupinum hominem inclinarit, puluinumque lumbis subiecerit, cur in condylomatis excisione super duo mortaria, aut super lapides duos ægrum collocat? Itaque cæpi diligentius vim vocabuli ὀλμων explorare, ut ab Hippocratis mente non discederem, ὀλμος autem præter cætera signifi-

cata est aliquando τὸ ὑπὸ ταῖς ὑπογλοτίσιν ἐκ-
 τέρων κοῖλον, Hefychio, idest, cauitas illa quæ
 carnosæ natiū parti versus femur subiacet vtrim-
 que, vel vt ait Aristophanis interpres, τὸ μέρος ἐν
 ᾧ κείνηται, καλεῖται ὄλμος pars sedendi officio de-
 stinata, vocatur ὄλμος, quod hîc exprimere vel-
 le videtur Hippocrates. Cum autem ait sub ve-
 lamento condyloma remitti, cessare aut mollius
 reddi denotat. Sic enim solet Hippocrates τὸ ἐν-
 δύναι de affectionibus aut symptomatis efferre,
 & ἐνδοσις apud Galenum est febrium continua-
 rum remissio. Digito condyloma illud auferre,
 difficilius non esse, quam digitum inter carnem
 & pellem ouiculæ dum excoriatur, ad extremum
 perducere, verisimile fortasse non videbitur,
 Hippocrates tamen mentiri nescit, imo quæ-
 cūmque ipse ad curationem excogitauit, prius-
 quam nos doceat, experimento comprobat,
 non sicut nonnulli ex iunioribus medicis, qui in
 scriptis de ratione medendi, nobis ea imperarūt,
 quæ ipsi nunquam ante sunt experti, vt ait Gale-
 nus commentario in sententiam tertiam libri
 primi de articulis. Sanguinem post ablationem
 condylomatis profluentem abluuit vino austero,
 in quo gallæ maceratæ fuerint, vinum enim ni-
 grum austerum astringit, repellit & glutinat, gal-
 larum item vis vehementer astringit, itaque hac
 ablutione sanguinis profluuium facile suppri-
 mitur. Suadet Celsus, si post excisionem capitu-
 lorum hæmorrhoidum profluat sanguis, vt ex-
 cipiatur spongia, deinde linamentum impo-
 natur.

Ἦν δὲ ἀνώτερος ἢ ἡ κονδύλωσις, τῷ κατὸ-
 πτήρει σκέπτεσθαι, καὶ μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τῆς
 κατὸπτήριος, διηγέμενος γὰρ ὁμαλιύει τὴν
 κονδύλωσιν, ξυναγέμενος δὲ πάλιν, δείκνυσιν
 ὁρθῶς ἀφαιρέειν δὲ καὶ ἐλλεβόρῳ μέλαινα ὑπα-
 λείφοντα τὸν δακτύλιον, ἔπειτα τριτάτῳ,
 οἶνω κλύζειν αὐτηρῶ, τὸ δὲ αἷμα ὅταν ἀφέλῃς
 τὴν κονδύλωσιν, ὅτι ἔρρει, μὴ θαυμάζειν,
 οὐδὲ γὰρ ἦν ἐν τοῖσιν ἀρθροῖσι διατάμης τὰς
 χεῖρας ἢ τὰ σκέλεα, ἔρρυσεται αἷμα, ἢν δ'
 ἀνωθεν ἢ κατωθεν τᾶμης τῆς ἀρθρῶν, εὐρήσεις
 κοίλας φλέβας καὶ αἰμόρρους, καὶ χαλεπῶς ἀν-
 ἰσχοῖς εὐπόρως, οὕτω καὶ τὴν ἐν τῇ ἔδρῃ αἰμόρ-
 ροῖδα, ἢν μὲν ἀνωθεν ἢ κατωθεν τᾶμης τῆς ἀφαι-
 ρέσιος τῆς κονδυλώματος, αἷμα ῥεύσεται, ἢν δὲ
 αὐτὴν ἀφέλῃς τὴν κονδύλωσιν ἐν τῇ περ-
 σφύσει, ἔρρυσεται, ἢν μὲν οὖν ἔτω καθίσταται,
 χαλῶς ἀνέχοι, ἢν δὲ μὴ, καῦσαι, φυλακασό-
 μενος ὥς μὴ ἄψῃ σιδήρῳ, ἀλλ' ἐγγὺς περσφέ-
 ρων τὰ σιδήρεια ἀποξηρεαίνειν, καὶ περπιθέναι
 τὸ τῆς χαλκῆς αἶθος τὸ ἐν τῷ ἔρω.

SI vero altior fuerit callosa eminentia,
 per catopterem inspicere oportet, ca-
 ue autem ne à catoptere decipiaris, ex-
 plicatus enim eminentiam illam exae-
 quat, contractus rursus, recte demon-
 strat. Auferre autem couenit sublinen-
 do anum

do anum elleboro nigro , tertio postea die, vino austero subluere oportet. Neque mirandum est, si sanguis non profluat, cum eminentiam callosam detraxeris. Non enim si in ipsis articulis manus aut crura præcidas, effluet sanguis. Sed si supra infrave articulos dissecueris, inuenies venas insignes & sanguinem effundentes, nec facile citò suppresses. Sic etiam in ano hæmorrhoidem si supra vel infra condylomatis detractionem secueris, sanguis profluat, sin autem ipsam callosam eminentiam in ipsa connexione detraxeris, minime fluat. Si igitur ita cōquiescat, benè se res habet, sin minus, adurito, cauens diligenter ne ferro contingas, sed propius admoue ferramenta ad desiccandum, tuncque florem æris ex vrina imposito.

C Allosa eminentia quæ hæmorrhoidibus adnascitur vel exterior est, & patet conspicua foris, vel interior, & penitus intus delitescit, quid molendum sit circa exteriorem condylosim iam exposui, nunc docet quænam curatio interiori sit adhibenda, primùmque vsum catopteris admouet ad explorandam internam condylosim, est autem *κατὰ τὴν* instrumentum chirurgicum ad sedem dilatandam & aperiendam idoneum, quæ quæ recondita sunt, & intus la-

tent, in conspectum veniunt, dicitur etiam Galeno & Paulo ἰσχυροδυστολὺς, & vulgo speculum ani nominatur. Catoptræ autem dilatatus & apertus anum nimium dilatat, & ita obscuram reddit eminentiam, dum verò contracto catoptræ anus ad suam redit formam, apertè patet & conspicua est eiusmodi condylosis. Per κοινδύλωσιν autem hoc loco σύκωσιν & ficum intelligere videtur, ad eam verò detrahendam, anum subliniit elleboro nigro, qui cum sit detergentis facultatis, fistulam etiam callo obduratam impositus purgat, callumque duobus tribusve diebus detrahit, ait Galenus libro sexto de simplic. facultatibus, vult etiam Dioscorides ut tertio die detrahatur, & ideo Hippocrates hoc loco, anum tertio die vino austero subluat post detractiōnem huius condyloseos, non est metuenda sanguinis profusio, cum tamen detracto condylo-mate profluere soleat sanguis, quod minimè mirum videri debet; cum videamus crura aut brachia in ipsis articulis dissecta sanguinem non profunderè, quod obseruandum etiam admonet Guido in sectione membri emortui, si gangræna sit articulo vicina, aut articulum ipsum occupet, tractatu sexto doctrina 2. cap. 8. neque verò metuenda tunc venit conuulsio propter neruorum incisionem, quoniam cum præcisus totus neruus est, nullus conuulsionis metus instat, ex tertio capite libri sexti methodi therapeuticæ. Si quis autem extra articulos disseccauerit artus ipsos, maior sanguinis profusio imminet propter amplas & insignes venas, quod idem in hæmorrhoidum excisione contingit. Si enim hæmorrhoi-

dem detrahas per excisionem, emanat sanguis, si vero detrahas eminentiam illam in connexione non profuit. Si tamen in detractiōe vulneretur hæmorrhoids, profundetur sanguis, cui profusioni medetur vstio, cicatrix enim quæ fit adustis capitibus, sanguinem fundi prohibet, hæc autem adustio quia propius accedit ad rectum intestinum, quam ea de qua dictum est sententia tertia huius libelli, in qua sedis externas hæmorrhoidas adurit, idcirco etiā monet ne ferro candente partem contingat chirurgus, sed propius admouēdo eam exsiccet, mortificatur enim ita hæmorrhoids, & deinde resiccata decidit, velut cutis ambusta, ut docebit statim sententia vndecima, post casum imponit pharmacum ex flore æris & vrina compositum, de quo dictum fuit sententia septima præcedenti.

Ἄλλος τρόπος ἰσχυρὸς αἱμορροΐδων. Καυσθῆναι
 δεῖ ποιῆσθαι, οἷον χαλαμίσκον φαρμακί-
 τῳ, σιδήριον δὲ ἐπαρμόσαι καλῶς ἀρμόζον,
 ἔπειτα τὸν αὐλίσκον ἐνθεῖς ἐς τὴν ἑδρῆν, δια-
 φαῖνον τὸ σιδήριον καθίεναι, καὶ πυκνὰ ἐξαίρειν,
 ἵνα μᾶλλον ἀνέχῃται θερμανόμενος, καὶ ὅτε ἑλ-
 κος ἔξει ὑπὸ τῆς θερμασίης, ὁμῖα τὴν ξηρανθέν-
 τα τὰ φλέγια.

Alius modus curationis hæmor-
 rhoidum. Fistulam æream parare
 oportet similem fistulæ clysteris, ferra-
 mentum verò conuenienter adaptatum

accommodare, deinde inditâ in sedem fistulâ ferramentum candens immittere sæpiusque remouere, vt qui calefit facilius sustineat, neque vlcus ex calore contrahat, & venulæ resiccatae sanæ sint.

QVaria est curandarum hæmorrhoidû methodus, in qua per fistulam æream ferramento candente tandiu eas adurit, donec resiccatae decidant, parat autem fistulam quam vocat *κλυστήρα*, quamuis tamen in exegesi linguarum legat *κλυτήρα* Galenus, qui sic explicat, *κλυτήρα, χαλκρον καλαμίσκον τινὰ τετραμήνον κτ' τὸν πνθμένα, δι' ἃ κλίνει ὅτι κλυτηρίδιον διαφανεῖ καθέν*, paruum calamum æreū in fundo perforatum, per quem cauteriolum candens immissum vrere potest. Cornarius *κλυστήρα* legisse videtur, & statim *καλαμὸν φεγγυκτὺν*, vertit enim clysterem parare oporteat velut arundinem sepiariam, ad cuius arūdinis similitudinem paratur fistula, per quam ferramentum candens immittitur. Aldinus & Basiliensis codex & venetus ex restitutione Mercurialis, legunt *καλαμίσκον φαρμακτικὸν*, paruum fistulam clysteris, per clysterem enim medicamentum inijcitur in intestina, vel etiam dicitur *καλαμισκος φαρμακτικος*, quod medicamentosa sit arundo, siquidem eius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita spicula aculeosque e corpore extrahit, luxata, lumborumque dolores cum aceto mulcet, folia viuentia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & cæteris inflammationibus, cor-

ticis cinere perunctæ cum aceto alopecię sanantur, Dioscoridi libro primo. Lectionem horum codicum retinimus, quamvis idem calamus & *φραγμῆς* & *φαρμάκῆς* sit, & suspicor totum istud glossema esse a studioso quodam margini appositum, fistulam illam æream in fundo perforatam ita concinnat, eique ferramentum congruum accommodat, tum illam ano imponit, & per eius cauum candens ferramentum immittit, quod tamen sæpius remouet & eximit, ut facilius toleret is cui aduruntur hæmorrhoides, & ne ferramenti calor crustam generet, vlcusque producat, frequenti illa ferramenti candentis admotione venulæ resiccatae decidunt, & ad naturalem statum redeunt.

Ἦν δὲ βέλῃ μὴτε καίειν, μὴτε σποτάμναι, πρὸς καταιονήσας ὕδατι πολλῷ θερμῷ, καὶ ἐκτρέψας πλὴν ἑδρῆν, σμύρναν τρίψας λείην, καὶ καύδα, καὶ τυπνέειν, ἀγρυπνέειν, κατακαύσας ἐν καὶ ἡμῶν πρὸς τ' ἄλλα, καὶ μελαντηεῖς ἄλλο τοσούτον, τετέοισι ξηροῖς χεῖναι, ἢ δὲ αἱμορροῖς τετέοισι τοῖσι φαρμάκοισιν σπυγνέται ὡς πρὸς σπύγος κατακαυμδρόν. ταῦτα ποιεῖν μέχρις αὖ πάσας ἀφανίσῃς, καὶ χαλκίπιδος ἡμῶν κεκαυμδρόν τ' αὐτὸ ἀπογράφεται.

SI verò neque vrere, neque refecare volueris, ubi prius multa aqua calida foueris, sedemque euerteris, myr-

ram tenuissimè terito ac gallam, alu-
ménque Ægyptium vrito, vna ac dimi-
dia parte ad reliqua, tantumdémque
melanteriæ accipito, hísque siccis vtere.
Hæmorrhoids verò medicamētis istis ex-
cidet, vt cutis adusta, hæ facito donec
omnes deleueris. Idem efficiet chalciti-
dis vstæ pars media.

Q Vinta est hæmorrhoidum curatio, quæ
fit per medicamenta, securior quidem &
compendiaria est hæmorrhoidum curatio ipsa
chirurgia, quia vero sæpius homines timidi sunt
ad sectiones aut vstiones, idcirco Hippocrates
etiam ijs consulens auxilia proponit, quæ im-
posita hæmorrhoidas tollant & dissipent. Ætius te-
trabib. 4. sermone 2. ca. 6. ita hanc curandi viam
ex Hippocrate refert, nonnullis immutatis. Ad-
mirandum, inquit, Hippocratis remedium ad
hæmorrhoidas. Gallarum sextantem, myrrhæ
sextantem, aluminis scissi quadrantem, melante-
riæ quadrantem contundito, cribrato, terito, ac
vtere sicco, additque statim, ego verò in penuria
melanteriæ, sqri adieci, & fecit mirabiliter, nam
intra paucos dies, citra mordacitatem & vlcera-
tionem hæmorrhoidas dissipat, verum vino præ-
luere oportet, atque sic inspergere. Hippocrates
hoc loco euersam & foras attractā sedem aqua
calida multa fouet, deinde siccum puluerem im-
ponit, dicitque hæmorrhoidem resiccatam à cor-
pore separari instar cutis exustæ, οὐτος autem
hoc loco, vt ait Hesychius οὐτος δὲ σημαίνει significat.

Cæterum vbi vitiose *μελανθησίαν* legebatur, *μελανθηίς* restituiamus, & suspicor scripsisse Hippocratē *μελανθηίς ἴσση*, id est melanteriæ æqualiter tantundem. Est autem melanteria, Galeno libro nono de simplicium facultatibus, medicamentum valde astringens, officinis incognitum. Chalcitis etiam cum sit detergens, calefaciens, crustas vlceribus inducens, cumque fistulas tollat, Dioscori. libro quinto, potest etiam hæmorrhoidas resiccatas dissipare. Scribonius largus simili etiam methodo hæmorrhoidas curat, eas primū perungit hoc medicamento. Recipe succi centaurij, succi absynthij anadrachmas duas, aluminis liquidi, herbæ pedicularis ana drachmas duas, misyos drachmam vnam, mellis quantum ad ea comprehendenda satis erit, fiat medicamentum, hoc peruncto interius ano, aut lana tincta & interius trusa, cum defecerint ad sellam, & apparuerint totę, rursus bene tangendę sunt vndique medicamento huiusmodi. Recipe chalcitidis vstę æris floris vsti ana drachmas quatuor, misyos vsti drachmas tres, squamę æris, diphrygis, foreos vsti, auripigmenti ana drachmas duas, hæc omnia teruntur, & sicca hæmorrhoidibus imponuntur vndique, post hoc, tenue, rarum, simplex lintecolum imponere oportet, & post hoc, panem autopyron ex aqua maceratum & tritum rosaceo oleo adiecto, hoc medicamentum sine magno labore circa septimum diem cadere cogit hæmorrhoidas, oportet autem bis die panem imponere, nonnunquam in nocte, si circumtensionem senserint. Celsus libro sexto simili medicamento adurentē hæmorrhoidum

capitula consumit, ex his autem constat, squamæ æris, auripigmenti singulorum drachmas quinque, saxi calcis drachmas octo, similia & fere eadem ad hæmorrhoidas dissipandas medicamenta describit Ætius tetrabibl. 4. sermone 2. capite 6. Vide etiam Galenuni decimo libro τῶν τοπικῶν.

Ἦν δὲ βύλη βαλάνοισιν ἵσθαι, σιπίνης ἔσρακον, μολυβδαίνης τρίτον μέρος, ἀσφαλτον, τυπινεῖην, αἶθος ὀλίγον, κικίδα χαλκῆ ἰόν ὀλίγον, τεττέων μήλι ἑφθὸν καταχάας, βάλανον ποιήσας μακροτέρῳ, προσίθει, μέχρι αὐτῆς ἀφανίσσης.

SI verò balanis curare volueris, sepia testam, molybdænæ tertiam partem, bitumen, florem æris modicum, gallam, æruginem modicam, vbi melli cocto miscueris, balanum longiorem formato ac imposito, donec deleueris.

SExtra est hæmorrhoidum curatio, quæ fit per balanum, est autem βάλανος siue glans, medicamentum quod in glandis formam effictum sedi imponitur ad mouendam & deiiciendam aluum. Conuenit hæc curandi ratio hæmorrhoidibus internis, vnde etiam Ætius tetrabibl. 4. sermone 2. cap. 6. cum hæmorrhoides penitiores fuerint, velut glandem supposititiam indit ex ijs quæ hæmorrhoidas tollunt. Ad eas autem tol-

lendas & dissipandas nunc glandem effingit ex testa sæpiæ, & molybdæna, bitumine, flore æris, galla, ærugine, mistis cum melle cocto, quæ omnia vim astringendi & desiccandi habent. Sepiæ enim testa exusta non solum ad vitilignes, lentes, & scabiem, vtilem vsum præstat, sed etiam cum sale trita oculorum pterygia consumit. Galeno libro vndecimo de simplicium facultatibus, molybdæna vim habet astringendi, abstergendi & desiccandi, eidem Galeno, libro nono de simplic. facultatib. Bitumen resiccat & calefacit ordine secundo, flos æris, ærugo, & galla astringunt etiam & desiccant, de quibus sæpius dictum fuit libro *ἐπὶ ἐλκῶν*. Balanū autem oblongiorem effingit, vt penitus latentes hæmorrhoidas contingat.

Γυναίκεϊν αἱμορροΐδα ὡδε θεραπεύειν, πολλῷ ὕδατι θερμῷ ἀπονήσας, σινέφεδ' ἐν τῷ θερμῷ τῷ εὐωδέων τείφας μείκνῃ, λιθάρυρον ὀπίην, καὶ κακίδα, οἶνον λευκὸν παράχει, καὶ ἔλαγον, καὶ χλωὸς σέαρ, τείφας ὁμοῦ πάντα, δίδοναι ὁκόταν ἀπονητῇ, ἀγαχρίσασθαι, ἀπονῆν δὲ καὶ πρὶν εἶδρην ἐξώσας ὡς μάστιγα.

MVliebrem hæmorrhoidem sic curare oportet, multa aqua calida locum foueto, in calida verò aqua odorata incoquito, myricam, spumam argenti coctam, gallamque vbi contriueris, vinum album, & oleum & anseris

adipem affundito, omniâque simul trita sublinenda dato, cum prius partem fouerit. Locum autem quam maximè foras propulsum fouere oportet.

VLtima & septima est curandarum hæmorrhoidum methodus, in qua de hæmorrhoidibus mulierum agit, quæ vterum infestant. In vteri enim osculo & ceruice, venæ quæ in has partes desinunt dum crassiore ac sæculento sanguine replentur, intumescunt, ac eminètiâs non paruas ani hæmorrhoidibus persimiles efficiunt, quas vteri quoque hæmorrhoidas medici solent appellare. Eadem verò accidentia inducunt quæ reliquæ in ano ortæ solent inducere, & præterea sterilitatem, sanguinem enim profundunt per breuia intervalla, aliquando per longiora, rarò verò per statuta tempora, fœminæ his hæmorrhoidibus infestatæ colorem sæculento sanguini aut humori peccanti persimilem habent, aliquando pallidus color eas apprehendit ex frequentibus sanguinis vacationibus, nonnunquam lassitudine aut imbecillitate detinentur. Vteri hæmorrhoides tactu deprehendi possunt, melius tamen per dioptram inspiciuntur, est autem *dioptra* instrumentum ad finum muliebrem dilatandum & vterum diducendum idoneum, quod chirurgis speculum matricis dicitur. Cæterum vteri hæmorrhoidas curare non est facile. Etius varicofas & malignas dimittere suadet, reliquas vero non aliter curare, quam quæ in sede sunt, duras quidem & modicum sanguinem fun-

dentes neque vasis annexas statim amputare, eas verò quæ multum sanguinis emittunt, circum basim vndique scarificare & vel sella eleuatas funiculo constringere & paulatim refecare, sed hæ curandi rationes in non leue discrimen laborantes mulieres præcipitant. Hippocrates veram & tutam medendi viam citra chirurgiam proponit, docetque quomodo hæmorrhoidas vteri exficcare aut excæcare oporteat. Initio locum multa aqua calida fouet, vt duri- tiem hæmorrhoidum emolliat & dolorem le- niat, in aqua illa calida incoquit res odoratas, vt vterum deorsum alliciat. Sic etiam Hippocrates libro de natura muliebri & libro secundo de morbis muliebribus, cum vterus caput vexat & partes superiores petit, vtitur lotionibus ex aqua calida, in qua prius incoquit laurum, myr- tum, saluiam, maioranam, cyperum, radicem ir- cos, iuncum odoratum, cedri & cupressi rament- ra, & similia, ipsaque inguina & fœmora vnguē- to odoratissimo intus inungit, & contra quum vterus sedem petit, ad nares quidem odorata apponit, ad vterum vero graueolentia. Vbi igitur aqua multa calida odorata vterum fouerit, hocque modo foras quam maxime traxerit & euerterit, tunc mulieri medicamentum sequens exhibet, quod in vterum immittat, & hæmor- rhoidibus superponat, vt isto medicamento re- ficcata decidant, paratur autem medicamentum ex myrica, spuma argenti cocta & galla, quibus contritis addit vinum album, oleum & anseris adipem, hoc autem medicamentum vim habet desiccandi, detergendi, & astringendi. Myrica

enim seu tamarix abstergentis & incidentis est facultatis, cuius fructus tumores inhibet, ut etiam cortex, Dioscoridi libro primo, Galeno autem libro septimo de simplicium facultatibus, myricæ fructus & cortex non paucam sortita sunt astringentem, adeo ut gallæ omphacitidis proxima sint, & ubi galla fortè ad manum non erit, eo uti liceat ad omnia, ad quæ illa utimur, myricæ etiam combustæ cinis admodum desiccatoriae facultatis est, lithargyrus autem siue spuma argenti desiccet moderatissimè, modicèque astringendi & abstergendi facultatem habet. Galeno lib. 9. de simplic. facultatib. Quomodo vratur argenti spuma docet Dioscorides libro quinto, his tribus nempe, myricæ, lithargyro & gallæ contritis miscet vinum album quod desiccando iuuat, morsumque aliorum medicamentorum tenuitate suæ essentiae mitigat, in ea enim facile penetrat iisque omnibus optimè permiscetur, oleum verò non solum medicamentum hoc tactu blandum reddit, sed adhærendo pertinax efficit, Adeps anseris quæ in alto corpore mordicant, magis obtundit, cum enim sit adipe suilla calidior, ob tenuitatem essentiae magis penetrat, Galeno lib. vndecimo de simplic. facultatibus. Aetius tetrabibl. 4. sermone 4. cap. 97. ad vteri hæmorrhoidas resiccandas aptissimum esse dicit medicamentum Hippocratis, quod ad ani hæmorrhoidas describitur sententia vndecima huius libri. Cum in fine dicit, locum quam maxime foras euersum & attractum fouendum esse, Græcus contextus legit *πῶς ἐδῆλω* sedem, quæ vox apud Hippocratem sæpius anum & podicem si-

gnificat, qua in significatione haecenus τῆς ἰδέης
 nomen fuit hoc libello vsurpatum, hoc autem
 loco ἡ ἰδέη locum significat, sic Erotianus τῷ
 ἰδέῳ exponit τὸν οἰκῆον τόπον proprium locum.
 Galenus in expositione linguarum Hippocratis
 ἰδέῳ dicit significans hoc loco αἰδοῖον puden-
 dum, quem tamen locum nullus adhuc animad-
 uertit. Sic enim scribit, πένια, σφίνιον, αἰδοῖον,
 αὐτὸ δὲ τὸ σφὶ αἰμορροΐδων καὶ σφινγῶν οὕτω καὶ τῷ
 ἰδέῳ λέγειν δοκεῖ. Qui tamen locus apud Gale-
 num corruptus legitur, nos ex Hesychij lexico
 sic restituimus. Ne quis fortasse existimet postre-
 mam hanc curationem esse ad ani & sedis hz-
 morrhoida prodesse possit, vt etiam in curan-
 dis vteri hamorrhoidibus medicamenta ἰδέου
 sedique dicta nonnunquam conferre videmus.



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Συείληων.

Τείλες γίνονται μὲν ὑπὸ φλάσμα-
 των καὶ φυμάτων, γίνονται δὲ καὶ ὑπὸ
 ἐρεσίης καὶ ἱππασίης, ὅταν ἀθροισθῇ
 ἐν τῷ γλῶττι αἷμα πλησίον τῆς
 ἑδρῆς, σπηρόμενον γὰρ νέμεται εἰς τὰ μαλθα-
 κά, ἅτε ὑγρὸν εὐόντος τῆτε ἀρχοῦ, καὶ τῆς σαρ-
 κὸς μαλθακῆς ἐν νέμεται, ἔσ' αὖ τὸ φύμα
 ῥήξει, καὶ χέτω εἰς τὸν ἀρχὸν ἀφαισθῆναι ἐπ' αὐ-
 τὸν τῆτο γένηται, συεῖλονται καὶ ἰχωρεῖ, καὶ κό-
 πωρεαι ῥεῖ δὲ ἐαυτῆς, καὶ φύσαι, καὶ βδελυγμὴν
 πολλήν, ὑπὸ μὲν οὖν τῆς φλομάτων γίνεται,
 ὁκόταν τι τῆς πρὸς τὸ ἀρχὸν χρεῖων φλασθῇ
 ὑπὸ πληγῆς, ἢ ὑπὸ πλώματος, ἢ ὑπὸ τρώματος,
 ἢ ἱππασίης, ἢ ἐρεσίης, ἢ ὅσα τοιουτοτρόπῃ ἐσι,
 συίεται γὰρ αἷμα, σπηρόμενον δὲ ἐκπύσκε-
 ται, ἐκ δὲ τῆς ἐκπύσκομενίου πάσχει ἅπερ ὅτι
 τῆς φυμάτων εἶρηται.

Hippocratis liber de fistulis.

Riuntur fistulæ ex collisionibus & ex tuberculis. Nascuntur autem & ex remigatione, & equitatione, cum sanguis in natibus iuxta anum coaceruatur. Putrescens enim serpendo mollia depascitur, donec tuberculum exuperit, & deorsum ad anum vsque putrefecerit, est autem anus humidus & caro quæ serpendo voratur, mollis, hoc autem cum acciderit, oritur fistula, saniemque fundit, effluitque per se stercus, flatus & grauis fætor. Ex collisionibus verò nascitur fistula, cum pars aliqua sedi vicina colliditur ab ictu, casu, vulnere, equitatione, remigatione aut simili quopiam, coaceruatur enim sanguis, & putrescens suppurat, ex suppuratione verò id euenit, quod de tuberculis dictum est.

Genuinus hic est Hippocratis fœtus citra controuersiam, & cum libro præcedenti de hæmorrhoidibus coniunctus, vt ex Galeno in exegesi linguarum superiori commentario demonstrauimus. Paulus etiam Ægineta libri sexti cap. 34. & 78. præcepta & remedia ex hoc Hippocratis libello recēset. Cornelius etiam Celsus

Hippocratis interpres libro quinto, sexto & septimo plurima ex hoc libello transtulit, quæ omnia suis locis patefaciemus. Hippocrates autem hoc libello fistularum ani generationem & curationem explicat, agit etiam de ani inflammatione, urinae difficultate, ani prolapsu, humiditate & dolore. Fistula verò est sinus angustus, oblongus, callo obductus, aliquatenus indolens, vel ex Celso, fistula est vlcus altum, angustum, callosum. Genera fistularum plura sunt, siquidem aliæ sunt breues, aliæ altius penetrant, aliæ rectæ intus feruntur, aliæ multoque plures transuersæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplicésve, ab vno ore intus orsæ, quæ tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur, aliæ rectæ, aliæ flexæ & tortuosæ sunt, aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad ossa, aut cartilaginem penetrant, aut vbi neutrum horum subest, ad interiora perueniunt. Fistulæ, Hippocrati in Coacis prænotionibus, cum magna difficultate curantur, quæ in cartilaginosis & excarnibus locis sunt, quæ cauæ sunt & perpetua sanie madent, & caruncula ipsis in osculo inest. Curatu autem faciliores sunt, quæ in mollibus partibus & carnosis & non nervosis existunt. Celsus fistularum prognostica copiosius explicatis verbis, fistulæ aliæ facile, aliæ cum difficultate curantur, atque etiam quædam insanabiles reperiuntur, expedita curatio est, in fistula simplici recenti intra carnem, adiuuatque ipsum corpus si iuuenile est, si firmum, inimica, contraria his sunt. Itemque si fistula os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos læsit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad

vel ad pulmonem, vel ad vuluam, vel ad grandes venas, arteriâsve, vel ad inania, vt guttur, stomachum, thoracem penetrauit, ad intestina quoque eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel malihabitus est. Ex Paulo vero, libro sexto, fistula insanabilis est, quæ vesicæ cervicem perforauit, aut quæ ad femoris articulum sit, aut quæ ad ipsum rectum intestinum tendit, ægrè vero conulescit, quæ orificio caret, tum quæ delitescit, & in os terminatur, quæque multifariam fissa est. Addunt recentiores, fistulam nullam per se sanescere. Quibus verò signis cognoscamus fistulas ad os tendentes, ad nervos, musculos, venas aut arterias penetrantes docet Ælius tetrabibl. 4. sermone 2. capite 55. Fistularum ani generationem & curationem hîc proponit, quoniam propriam animaduersionem desiderant, quæ in ano sunt, quâuis earum curatio possit etiâ alijs accommodari. Oriuntur vero fistulæ vel ex tuberculis, vel ex contusionibus: Tuberculû autem *φύμα* dicitur, cuius duplex est significatio, aliquando enim *φύμα* est glandularum affectus qui & celeriter augetur, & ad suppurationem festinat, Galeno libro secundo ad Glauconem, aliorum vero quorundam sententia tumores omnes qui in abscessum facile vertuntur & *ἀποσθηματώδεις* Græcè dicuntur, quâcunque corporis partem obsideant, phymata appellantur, Paulo libri quarti capite 22. Celsus hanc Hippocratis sententiam latinè sic vertit, nonnunquam ex abscessibus fistulæ oriuntur: nascuntur etiam fistulæ ex contusionibus, contu-

sionis quinque causas hîc enumerat, ictum, easum, vulnus, remigationem & equitationem, ex his enim & similibus causis colligitur facile circa anum sanguis, qui deinde putrescens abscessum, sinum, fistulamque producit, τοιούτου γοῦπον est ictus & lapsus. Quamvis autem ex abscessibus, & ex alijs vlcerum generibus fistulæ nascantur, magna ex parte solent etiam ex hæmorrhoidibus generari vt docet Auicenna libri 3. fen. 17. tracta. 1. cap. 18. & idcirco fortasse libellum hunc coniunxit Hippocrates cum præcedenti de hæmorrhoidibus.

Πρῶτον μὲν οὖν ὅταντι τοῖς τοῦ ἀρθρί φούρνον φύμα, τὰ μὲν ὡς τὰ χεῖρα ὡμὸν πρὶν ἢ ἀγαπῆσαι ἐς τὸν ἀρχόν, ἣν δὲ νόσέοντα ἤδη τιμὴν σύριχα πῶδα λάβης, λαβὼν σκορόδου φύσιγγα νεαρίῳ, ἀνακλίνας τὸν ἀνθρώπον ὑψηλόν, τὰ σκέλεα ἀφαιγάτων, τὸ μὲν εἶτα, τὸ δὲ εἶτα, τιμὴν φύσιγγα χαθίναται ἐπ' αὐτὴν πρὸς νόση, μετεῆσαι τὴν τὸ βάθος τῆς σύριγγος τῇ φύσιγγι, καὶ σεσέλεος δὲ ρίζαν κόψας ὡς λεπτοτάτῃ, ὕδωρ ὀπιχέας, βρέχειν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ πρὸς ἡμέρας πινέτω, μέλιτι πῶδα μίσητον τὸν ὕδωρ, καὶ πρὸς κυάθους, εἰ τὸ πῶδα καθαίρει καὶ τὰς ἀσκαρίδας, ὅκοσοι δ' αὖ καταλειφθῶσι ἀφαιρέκωνται, γήσκουσιν.

Primum igitur quàm eiusmodi tuberculū aliquod nasci senties, cru-

dum celerrimè secabis , priusquam ad anum suppuret. Si vero fistula iam laborantem curandum susceperis , resupino homine collocato, & cruribus huc & illuc diductis, recentem alij scapum eò usque demittes, donec renitatur, sicque fistulæ altitudinem scapo metieris. Tum autem seselis radicem tenuissime tritam affusa aqua quatriduū macerabis, eamque aquam admixto melle ieiunus bibet ternis cyathis. Ascarides interim purgare conuenit. Quicumque enim sine curatione relinquuntur, moriuntur.

Quoniam fistulæ sæpius ex abscessibus & tuberculis parùm dextrè curatis oriuntur, suadet cum primum iuxta sedem phyma aut tuberculum apparuerit, crudum etiam celeriter incidatur. Si enim expectetur integra suppuration, sanguis putrescens facile depascitur partes vicinas humiditas ac molles, & ad intestinum penetrat, vixque fistulæ generatio vitari potest. Paulus libri sexti capite 34. hanc Hippocratis sententiam sic refert, τὰ πλεονάζοντα δὲ δακτυλίου ἀπὸ σήματα ὡς τῆς τελείας πεπρωσιος ὁμοιομεῖν Ἰπποκράτης παρακελεύεται, τὸν οἷς διάσσειν ὑποδυνάμους φέρον. Abscessus ano proximos ante perfectam maturitatem crudos dissecari præcipit Hippocrates, veritus ne perforationem experiantur. Galenus contrarium scribit libro 13. methodi medendi, etiamsi in suppurante particula pus

ἀξιολογόν & notabile contineatur, *ἔχει τέμνειν αὐτὸν*
πικρὰ, non expedit protinus incidere, quod non-
 nulli faciunt, imo *διαφορεῖν* & exhalationem mo-
 liri medicamentis ad id valentibus. Quod quidē
 in aliarum partium abscessibus obseruare licet,
 in ijs qui sedi vicini sunt, periculosum propter
 metum imminentis fistulæ, neque tamen vt ait
 Celsus libri septimi 30. ante properandum, sed
 vbi primum pus apparuerit circa anum, inciden-
 dum est ne anus ipse suppuraret, nam si crudum in-
 cisum est, inflammationis multum accedit, &
 puris aliquanto amplius concitatur. Si vero fi-
 stula iam laborantem curandum suscipias, resu-
 pinato homine & cruribus diuaticatis, ante om-
 nia demitti specillum in fistulam conuenit, vt
 quō tendat & quam alte perueniat, scire possi-
 mus. Hic autem Hippocrates ad explorandam
 fistulæ altitudinem, recentem alij scapum pro
 specillo vsurpat, quia facile cedit, & tortuosos fi-
 stularum flexus persequitur. Sunt tamen qui per
φύσσηρα σκορδαίου intelligant alij caput aut nucleū,
 quia Hesychius *φύσσηρας*, *σκορδαίων κεφαλίδας* in-
 terpretatur, sumuntque alij caput pro specillo,
 cuius extremum in modum nuclei aut capitis al-
 lij capitatū est & rotundum. Sed quoniam Hip-
 pocrates *φύσσηρα νεαρίω* dixit, malo referre ad
 scapum alij Sic etiam Guido fistulæ altitudinem
 explorat radicibus petroselini, stilo maluæ, aut
 vineæ peruineæ. Chirurghi frequenter veneream
 hyperfarcosin & penis carūculam, vesicæ etiam
 calculum, calamo iunci perterritant. Vbi fistulæ
 sedem, spatium, altitudinemque cognouit, mul-
 sam ægrotanti ieiuno exhibet, in qua quattriduum

Seselis radicem macerauerit, vt materiam a parte affecta ad sanam auertat, & ab ano & intestinis ad vesicam deriuat. Seselis enim radix calefaciendi vim habet, tenuium partium est, & urinam admodum mouet. Galeno libro octauo de simplicium facultatibus, præscribit vero aquæ mulsæ, in qua macerata fuerit seselis radix, cyathos tres siue uncias quatuor cum dimidia. Cyathus enim sæpius fescūciam siue drachmas duodecim continet. Sic in torminibus intestinorum, ea quæ urinam mouent, maxime vtilia sunt, humorem enim peccantem & intestina corradentem, ab ano & intestinis ad vesicam auertunt. Itaque recte consulit Celsus libri 4. cap. 15. in torminibus intestinorum, ieiunum sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquefolij sit adiecta. Quinquefolium autem tenuium est partium, & minimum habet euidentis caliditatis. Recentiores vtiliter contra difficultatem urinæ, & calculum renum huius radicis decoctum præscribunt asserunt alij, huius radicis decoctum non minus sudores mouere, quam lignum indicum. Nos ineunte autumnno anni 1593. grauissimam & popularem dysenteriam vidimus post ætatem siccam & feruidam, in qua curanda, diureticis, vt decocto pentaphylli, & sarcæ par illæ sceleriter vsi fuimus. Ascarides interea & minutos vermes qui in fistulis nascuntur necandos & purgandos præcipit, si enim negligentur, laborantem in magnum vitæ discrimen adducunt, dum enim vehementem horum locorum pruritum excitant, materiam attrahunt, & putredinem harum partium augent. Sunt autem ascarides

des propriè tenues vermiculi, qui in parte inferiore recti intestini & circa muscoli sphincteris initia reperiuntur. Generantur autem in recto intestino ex pravis alimentis & ciborum corruptione, fiunt in fistulis ano vicinis ex putri materia, excrementorum copia, & calore præter naturam. Vacuantur vero ascarides recti intestini in infantibus & pueris, glandibus ex melle cum momento salis vel nitri, in prouectoribus ex decocto centaurei, absynthij, hyssopi, pulegij, calaminthæ, lupinorum cum melle & nitro per clysterem multis foraminibus peruium, quales metrenchytæ ab utero appellantur, carnem etiam salsam pinguedine adempta sublongam & rotundam formabimus, filoque alligatam ano indemus, quandiu sustineri poterit, inditam sinemus, deinde decoctum præcedens infundemus, sæpius idem remedium repetentes, ex Paulo & Aëtio. Hippocrates ipse libro secundo *περί γυναικείων* de ascaridibus sic scribit. Si in pudendo mulieris aut in ano ascarides nascantur, viticis semen aut folia cum fellis bubuli obolo permiscantur, & oleo cedrino subiguntur, lanæque succida mollissima excipiuntur, induntur autem tertio quoque die per noctem & diem, postridio ubi amouit, calida lauetur, ac allia cruda & cocta edat, & ascarides eijciuntur ac necantur, hæc etiam remedia fistularum vermiculis accommodari magna ex parte possunt, si manu aut instrumentis auferri nequeant.

Ἐπειτα ὁ θόνιον βύσσινον πηχυμάλλῃς ὅπου τῆ
μεγάλῃ δέυσαις, καταπάσων αἵθος χαλκοῦ

ἔπιον τέτρεμμένον, σφοδίλιον ποιήσας ἰσίου τῇ
 σύειγι τὸ μήκος, ῥάμμα διείς δι' ἄκρας τῆς
 σφοδίλης, καὶ αὐτῆς ἀπὸ τῆς φύσιγος, ὑπὶον
 κατακλίνας τὸν ἀνθρώπον, καταπίπει κατιδὼν
 τὸ ἀσβεβρωμένον τῷ ἀρχοῦ, ταύτη τὴν φύ-
 σιγα δειναι, καὶ ὁκόταν ὠδρακύνῃ ἐς τὸν ἀρχόν,
 ὅπιλαμβανόμενος ἔλκειν, ἄλγεις ὅ ἡ σφοδίλη,
 διωδῇ, καὶ ἰσώδῃ τῷ τε ἄνω, καὶ τῷ κατώ, ἐπὶ
 ἡν δὲ ἰσώδῃ, βάλανον ἐνθεῖς κερατίνην ἐς τὸν
 ἀρχόν, καὶ ἀσχεύσας σμηκτείδι τὸν ἀρχόν,
 εἰαν, ἐπὶ ἡν δὲ ὀποπατέν, ἐξαίρειν, καὶ αὐτῆς
 ὠδρακύναι, ἕως αὐτῇ πεμπλήνῃ γένηται, ἔκτι δὲ
 ἡμέρῃ ἐξαίρειν, ἔλκων τὴν σφοδίλιον ἔξω τῆς
 σαρκός, ὡς τρεῖς καὶ σπηλῆλιον μετὰ ταῦτα, καὶ
 πλήσας τὴν βάλανον, καὶ ἐς τὸν ἀρχόν ἐμβά-
 λων, εἰαν ἄλγεις ὅ ἡ σπηλῆλη ὑγρὴ γένηται, τὸν
 δὲ ἀρχόν σμύρῃ ἀλείφειν, ἄλγεις ὅ αὐτῇ δοικῇ
 συμπεφωνηκέναι.

Post hæc linteam Byssinum succo
 magni rithymali imbutum, & æris
 flore vsto & contrito respersum in for-
 mam linamenti contorti effingito, quod
 sit fistulæ longitudine æquale, filoque
 per extremum tum lintei tum scapi tra-
 iecto, hominem supinum collocato, at-
 que ubi per instrumentum dilatandæ se-
 di accommodatum, quod catopterem

dicunt, quid in ano perrosum sit conspexeris, eô scapum demittito, cumque ad anum penetrarit apprehendito & trahito, donec linamentum cōtortum fuerit impulsū, & superiori ac inferiori parti adæquatum, quod vbi æqualiter intromissum fuerit, glans cornea in anum terra cimolia prius illitum inditur, atque ibi finitur. Quūque deiiciendi cupiditas fuerit, eximitur rursusque immittitur ad quintum vsque diem, sexto subtrahitur, linamentūque illud contortum ex carne euellitur, post hæc alumen terito, glandēque impleto, & in anum immittito, ibique finito, donec alumen humidum fiat. Anus autem myrrha illinendus, quādiu opus esse videbitur.

EXplorata primum fistulæ altitudine, & exhibita potione diuretica, curationem nunc proponit, quæ consistit in eo vt eximatur callus & conglutinetur sinus, demittit autem in fistulam linamentum contortum in modum collyrij compositum, quod altera parte tenuius est, altera Paulo plenius, fitque linamentum illud ex linteo byssino, quod cum sit molle & tenue facile complicatur in collyrij formam, succūque tithymali prōptissimè combibit. Est autem Βύσσος siue Βύσσυ lini genus tenuissimum & nobilissimum, ex quo olim pretiosissimæ vestes terebantur.

tur, linamentum illud ita conformatum tingitur in succo tithymali magni, vt fistulæ callum exedat. Tithymalus autem Plinio herba lactaria, vel lactuca caprina: Celso, lactuca marina, habet acrem calidamque facultatem. Validissimus est liquor, secundum locum tenent fructus & folia, sed & radix eiusdem facultatis particeps est, sed non ex æquo. Liquor enim siue succus tithymali quarto ordine calefacit, estque tam feruentis naturæ, vt per se corpori impositus pustulas ignis modo faciat, & pro caustico in vfu sit. Quidam magnum Tithymalum esse putant eum qui characias cognominatur & masculus existimatur, estque ramis digitali crassitudine, & cubitali longitudine. Alij magnum esse estimant eum qui dendroides nuncupatur, quique comosissimus ex omnibus & semine copiosissimus est, quia tamen eiusdem est effectus, cuius characias, potes hunc vel illum assumere, vel ex septenario tithymalorum numero, quemcumque in manu habueris, omnes enim tithymali è quarto sunt ordine calefacientium, linamentum illud flore æris vsto respergit, vt facilius fistulæ callum exedat, flos enim æris vstus vim habet detrahendi callum, vnde postea sententia quinta; in fistulam florem æris vstum copiosum per specillum immittit. Cum autem flos æris in officinis vix reperiatur, eius vice medici fere semper ærugine vtuntur, quæ etiam fistularum callum exest, linamentum autem illud debet esse fistulæ æquale, vt totam fistulam attingat, callumque omnino detrahat. Vt autem æqualiter impellatur, filum per extremum tum lintei, tum

scapi traicitur, sic enim scapus intromissus secum linamentum attrahit. Cæterum *σποδίλι* vox est Hippocratis, quam exponit Galenus in exegeſi linguarum *σπεπλον π*, linamentum quoddam intortum, ex libro de hæmorrhoidibus & fistulis, ubi apud Galenum mendosè legitur *σποδλιν* & *σποδλιν*, quod non animaduertit Mercurialis, ut nec dictionem *πίενα* vel potius *πίενα*, ex quibus duabus vocibus ex Galeno confirmat hunc librum esse Hippocratis, de posteriore dictum fuit sententia vltima libri de hæmorrhoidibus, *σποδίλι* vertit Celsus linamentum in modum collyrij compositum. Quum linamentum in succo tithymali tinctum, resperſumque flore æris vſto, intromissum fuerit, anus poterit inflammari, itaque statim inungit terra cimolia, quæ vim habet refrigerandi & potissimum lota, lauatur autem vel aqua simplici vel posca, ut illini possit, tuncque magis refrigerat & ambustis medetur, ut ait Paulus libro septimo, *γλιν σπικτείδα*, verti terram cimoliam. Galenus enim in exegeſi, & Erotianus in onomastico vocum Hippocratis antiquarum, *σπικτείδα γλιν*, *γλιν κριμαλιν* exponunt. Balanum autem corneam in anum immittit, quam cauam esse necesse est, (alumine siquidem statim replebit) ut pateat exitus sordibus ijs quas medicamentum fistulæ admotum excitat, ut aniculis linamento tenacius adhæreat, sicque callus æqualiter detrahatur, ut non exacte comprimatur anus, sed pateat, compressus enim & contractus anus eiſceret foras linamentum immisſum in fistulam. Vſque ad quintum diem retinetur eiusmodi lina-

mentum, & glans cornea, quo tempore callus a medicamēto consumitur. Callo detracto ijs quæ glutinant & cicatricem inducunt, vti opportunum est, itaque glandem illam corneam aluminis plenā rursus in anum immittit, alumen enim inflammationem reprimat sua astrictione, siccando etiam vlcera cōglutinat & cicatricem inducit. Tandem vero sublato metu inflammationis & vlcere satis exsiccato, anum myrrha illinit quoad opus esse videbitur, & donec fistula glutinata cicatricem induxerit, est enim myrrha ad carnem generandam, & ad vulnus glutinandum efficax remedium, cum sit ex secundo calefacientium & desiccantium ordine. Vt autem anus myrrha possit illini, prius illam leuiter tritam diluere oportet vino dulci paulatim affuso, ac deinde cum vino coquere, vt docet Hippocrates sententia 26. libri *περὶ ἰλικῶν*. In fine huius contextus legunt omnes codices *ξυμπεφυκέναι* vt nos retinuimus. Cornarius legisse videtur *ξυμπεφυκέναι*, coaluisse enim vertit, quod sensui conuenire etiam videtur.

Ἐτέρη θεραπεία, ὠμόλινον λαβὼν ὡς λεπτότατον συμβάλλειν ὅσον σπιθαμῶν πεντάπλου, καὶ ξυμπεφυκέναι ὑπὲρ τοῦ τεύχους, ἔπειτα ποιησάμενος μήλιον καὶ αὐτὸ ἐν τῷ ἄκρῳ τετραμήλιον, ἐνείρας ἐς τὴν μήλιν τὴν ἀρχὴν τῆς ὠμόλινου συμβέβλημενος, κατὰ τὴν μήλιν ἐς τὴν σύριγγα, καὶ ἅμα τῆς αὐτῆς χειρὸς τὸν δάκτυλον τὸν λιγανὸν κατὰ τὴν ἐς τὴν ὄδον, ἐπὶ αὐτῇ δὲ φαῖσιν ἢ μύλιν τῆς δακ-

τύλῃ, ἀγειν ἔξω τῷ δακτύλῳ, σποχάμψας
 τῆς μήλης τὸ ἄκρον, καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐν
 τῇ μήλῃ, καὶ τὴν μὲν μήλιν πάλιν ἐξαίρειν,
 τὸ δὲ ὠμόλινον ἄς ἀρχὰς ἀφάψαι δις ἢ τρίς,
 καὶ τὸ λοιπὸν τὸ ὠμόλινον ὀπιτρέψας, ὀπιδή-
 σαι πρὸς τὸ ἄμμια, ἔπειτα κελεύειν ἀπελ-
 θόντα ἀφαιρῆσθαι τὰ ἐαυτοῦ, ὁκόσον δὲ
 σηπομένης τῆς σείσης χαλαῖται τὸ ὠμόλινον,
 τὸτο ὀπιτείνειν καὶ ὀπιτρέφειν αἰεὶ καὶ ἐκείτην
 ἡμέρην, ἣν δὲ σοὶ τὸ ὠμόλινον ἀφαιρῶν πρὸς
 οὐδὲν, ἢ τὴν σείση ἀφαιρῶν, πρὸς τὴν
 πείσιν πρὸς ἄλλου ὠμόλινον δεινῶν καὶ
 ἀφάψαι, ἢ γὰρ θρίξ ἀφ' οὗτο πρὸς ἄλλου
 τῷ ὠμόλινῳ, ὅτι ἀσπῆός ἐστιν.

A Lia curatio. Linum crudum quàm
 tenuissimum ad palmi longitudi-
 nem quintuplex complicato, setamque
 equinam circumdato, tum per specillum
 stanneum extrema parte perforatum li-
 ni crudi complicati caput trajcito, ip-
 sumque specillum in fistulam demitti-
 to, simulque manus sinistrae indicem di-
 gitum in anum indito, vbi autem specil-
 lum ad digitum peruenerit, illud digito
 foras educito extrema parte inflexum,
 rursumque lini caput quod iniectum fue-
 rat, cum specillo extrahatur, tunc utrum-

que lini caput bis aut ter vinciendum, relinquam vero lini crudi reflectens ad nodum alligato. Interea liceat homini abire, & negotia sua peragere. Quantum autem putrescente fistula, de lino relaxatur, tātum semper quotidie constringere ac intorquere oportet. Si vero linum crudum putrescat, antequam fistulam exederit, alterum linum crudum setæ adiungito, traiectumque alligato. Setæ vero idcirco lino adiungitur, quia non putrescit.

Secunda hæc fistularū curatio longa quidem, sed sine dolore est, itaque convenit timidiusculis, qui ob mollitiem & timiditatem, chirurgiam fugiunt. Paulus hanc curationem per linum crudum, vocat Hippocraticam ἀπολίνωσιν, quam sic describit libri sexti capite de ani fistulis. Iubet Hippocrates linum quintuplex crudum cultro forato, vel specillo per fistulam demittere, & lini principia coniungi ac quotidie constringi, donec corpus totum quod duabus oris intercedit, dissectum linum eructet. Cornelius item Celsus libri septimi capite de ani fistulis, ex hoc Hippocratis loco hanc fistularum curationem, per linum crudum transtulit his verbis. In ani fistula demisso specillo ad ultimum eius caput incidi cutis debet, deinde nouo foramine specillum educi, lino sequente, quod in aliam eius partem ob id ipsum perforatam con-

iectum sit, ibi linumprehendendum, vincien-
dumque cum altero capite est, vt laxecutem
quæ super fistulam est teneat, idque linum esse
debet crudum, & duplex triplexve, sicutortum
vtvnitasfacta sit. Interim autem licet negotia
agere, ambulare, lauare, cibum capere perinde
atque sanissimo, tantummodo id linum bis die,
saluo nodo ducendum est, sic vt subiecit fistulam
pars quæ superior fuerit, neque committendum
est, vt linum putrescat, sed tertio quoque die no-
dus resoluendus est, & ad caput alterum recens
linum alligandum est, eductoque vetere, id in fi-
stula cum simili nodo relinquendum, sic enim id
paulatim cutem quæ supra fistulam est, incidit,
simulque & id sanescit, quod alino relictum est,
& id quod ab eo mordetur, inciditur, hæc ratio
curationis longa sed sine dolore est, qui festinat
astringere cutem lino debet, quo celerius secet,
nocturnoque penicillo tenuia quædam intus demit-
tere, vt cutis hoc ipso extenuetur, quo extendi-
tur, sed hæc dolorem mouent. Adijcitur celeri-
tati sic, vt tormento quoque, si & linum, & id
quod ex penicillo est aliquo medicamento illi-
nitur ex his quibus callum exedi posui, hæc au-
tem proposuit prius libro quinto capite de fistu-
lis, *ὁμολίνον* autem siue linum crudum idcirco su-
mit Hippocrates, quoniam linum crudum vlcus
mollius mordet, nec labra tam asperè vt linteum
affricat, humorem saniem aut pus imbibitum
promptius extrahit, præterea vlcus ipsum mirifi-
cè desiccatur. Sic alibi Hippocrates *μότον ὁμόλινον*
præcipit, id est, linamentum ex lino crudo, in
phymate lateris, libro de internis affectionibus,

& libro secundo de morbis in phymate lateris,
& Paulo post, in hydropo pulmonis. Cæterum
vidius oscitanter vertit, διακρήσασθαι τὰ ἐνυτῆς,
secare seipsum, nos verò, negotia sua peragere,
cum Celso diximus. Hippocrates hoc verbo sæ-
pius uti solet, ut initio libri de somnijs, τὰς τῆς
σώματος κινήσεις ἀπάσας ἢ ψυχὴ διακρήσεται, om-
nes corporis actiones omnia peragit, post hæc
verba, statim in quibusdam codicibus legitur,
ἄλλη διεκπερία, quod vertit Vidijs, reliqua cura-
tio, hoc tamen delendum est, Cornarius non vi-
deretur legisse, nec in codice à Mercuriali restitu-
to legitur.

Ε'π' αὐτὸν δὲ λαβασατῇ ἢ σύειγξ, τὰ μνησθαι
τῆς σπύργου μαλακὸν ὡς λεπτότατον περτε-
ρεῖται, ἔπειτα ἐς μὲν τὴν σιελῆα, αἶθος χαλ-
κοῦ ὅπλον συχνὸν τῇ μήλῃ εἰθεῖναι, τὸν δὲ σπύρ-
γον ἀλείφαι μέλιτι, καὶ ὑποβαλὼν μέσσω τῷ
λεχάνῳ δακτύλῳ τῆς ἀριστερῆς χειρὸς ὥσαι περ-
σσω, καὶ περσάσεις ἕτερον σπύργον ἀναδῆσαι τὸν
αὐτὸν τρόπον, ὅνῳρ καὶ ὅτι τῆσιν αἰμορροῖσιν,
τῇ δὲ αὖειον ἀπολύσας, περθεῖναι ὕδατι θερ-
μῷ, καὶ σπύργῳ τῷ δακτύλῳ τῆς ἀριστερῆς
χειρὸς περθεῖν ἀφ' ἧς ἀφαιρεῖν τὴν σύειγξ, καὶ
αὖθις πάλιν τὸ αἶθος ὀπίδῃσαι, ταῦτα ποιεῖν
ἐπὶ αἷμας, ἐν ταύτῃσι γὰρ μάλιστα ὀχρῶν
τῆς σύειγξος σήπεται, τὸ δὲ λοιπὸν ἐξ' αὐτοῦ ὑμα-
τῇ τετῶ ὀπίδῃν, καὶ γὰρ τῆτον τὸν τρόπον,
ὑπο τῷ σπύργῳ ἀφ' ἧς ἀφαιρεῖν, καὶ ἀνα-

πυροσμένη ἢ σύριγγι, ὅτε πάλιν συμπίεσοι ἀν,
 ὅτε τὸ μὲν αὐτῆς ὑμαιοῖται ἀν, τὸ δὲ πάλιν
 συμπληρωθεῖν, ἀλλ' ἐν ἐαυτῇ πᾶσα ὑγίης ἔσται,
 ἐν τῇ θεραπεύειν δὲ πρῶτον αἰὲν ὕδατι πολλῷ
 θερμῷ, καὶ λιμοκτονεῖν.

CUm autem fistula computruerit,
 incidere spongiam mollem con-
 uenit, eamque quam tenuissimam impo-
 nere, deinde florem æris vltum copio-
 sum in fistulam per specillum immitte-
 re, spongiam vero melle illinere, subie-
 ctóque medio digito indice sinistræ ma-
 nus intro trudere, cumque aliam spon-
 giam apposueris, eodem modo alligare
 oportet, quo in hæmorrhoidibus. postri-
 die vbi vinculum solueris, aquâ calidâ
 abluere oportet, & conari per sinistræ
 manus digitum fistulam spongia purga-
 re, rursusque flore æris immisso deligare,
 idque per septem dies facere, fere enim
 in his fistulæ tunica computrescit. Cæ-
 terum donec sanescat, hoc modo alliga-
 re. Sic enim fistula per spongiam coacta
 atque explicata neque rursus concidet,
 neque pars vna curabitur, altera rursus
 implebitur. Sed vniuersa consanescet. In
 hac autem curatione multa aqua calida
 fouere iuuat, & in ediam imperare.

Reliquam

Reliquam curationem fistulæ persequitur, cum lino crudo cutem carnemve quæ supra fistulam est, exedit, & disseccat, tunc enim necesse est callum adimere, & humorem affluentem detergere, vlcusque purgare. Itaque spongiam mollem tenuissime concisam melle illitam primum imponit, ut fistulam apertam, & explicatam conseruet, mollem eligit, ne vlcus irriter, tenuissime concisam, ut fistulæ possit accommodari, melle illitam, ut vim habeat detergendi. Deinde florem æris vstum per specillum immittit, ut callosam fistulæ tunicam consumat & exedat, quemadmodum & supra sententia tertia linteum succo tithymali magni tingeat, & æris flore vsto cōtrito respergebat ad eundem vsum. Tum digito indice sinistræ manus spongiam intro compellit, qui locus in exemplaribus Græcis sic legitur, *ἡ ἀποβαλὼν μέσῳ τῷ λιχανῷ δακτύλῳ τῆς ἀριστερῆς χειρὸς ὥσαι πρὸς αὐτὴν*, subiectoque medio digito indice sinistræ manus intro trudere. Dalechampiū legit, *μέσῳ ἢ τῷ λιχανῷ δακτύλῳ ἡ ἀριστερῆς χειρὸς*, id est medio aut indice digito alterutrius manus. Attius etiam medium sinistræ manus digitum in sedem immittit capite ultimo libri decimi quarti. Alij non legunt *μέσῳ*, ut Cornarius. Vidiū *μέσον* legit & retulit ad *σπύγγον*, sic enim vertit, sinistræ manus digito indice spongiam mediam intro compellere, quam lectionem magis probo, sententia enim quinta libri de hæmorrhoidibus eadem verba legimus sic, *ἔπειτα ἀποβαλὼν τῷ δακτύλῳ τῷ λιχανῷ τῆς ἀριστερῆς χειρὸς, μέσον τοῦ σπύγγου ὥσαι*. Deinde cum aliam spongiam apponit fistulæ, vinculum admouet.

illud, quod etiam hemorrhoidibus accommo-
dauit sententia quinta libri præcedentis, quod-
que paulo post repetet sententia decima huius-
celibri, postero die soluto vinculo, locum aquæ
calida abluit, ad dolorem leniendum, & sordes
expurgandas, tuncque spongiâ etiam fistulam
ipsam expurgat, & per septem dies florem æris
vstum per specillum in fistulam immittit, ean-
demque vincendi rationem accommodat, per
spongiam cogit fistulam apertam manere, ne
glutinetur celerius quam impleatur, quod con-
tingeret, si concideret, eiusque oræ sectæ in unū
coirent, ita enim vniuersa simul fistula fanescet,
neque pars vna curabitur, altera rursus callum
contrahet, aut pure replebitur, *πλήρωσις* enim
repletio est cuiuslibet rei, cibi, portionis, humo-
rum aut excrementorum. Vt autem humores ad
partem affectam non defluant, dolorem qui at-
tractionis solet esse causa, lenit foru aquæ cali-
dæ, deinde inediam imperat, ne excremento-
rum fiat prouentus, *λιμοκτονίαν* proprie signifi-
cat fame conficere & enecare, sed hic est *ἀλιευσ-
τήν* paucio cibo vti, tenuemque victum seruare,
& *λιμοκτονίαν* Galeno est *ἀσπία πικτελής*, vel certe,
ἢ ἐπὶ ταῖς πόμασι μόνοις διαίτα, integra & perfecta
abstinentia, vel ea victus ratio quæ in sola potio-
ne consistit.

Ἦν δὲ μὴ ἀλγεβεράκη ἡ σύεργς, *πομπή-
λαστας μήλη*, τέμνε' εἰς αἶ' διέλθῃ, καὶ ὅπῃ-
πασε αἶθος χαλκῷ, καὶ εἰάν ὅπῃ πέντε ἡμέρας,
κατάχρη δὲ ὕδαρ θερμὸν, καὶ ἐπάνω ὕδατι φυράτ,

ἄλφειον κατὰ πᾶσιν, καὶ φύλλα τεύτλων ὀπί-
 δει, ἐπ' αὐτὸ δὲ ἐκπέσῃ τὸ αἶμα τῷ χαλκῷ, καὶ
 καθαρόν ἢ τὸ ἕλκος τῆς σύριγγος, ὡς ὥστε
 τίω ἐμπαροῦσθαι, ἢν δὲ εἰ χαλεπὸν ἦ, ὃ μὴ δίδόντε,
 βαθεῖν δὲ καὶ ἡ σύριγγς, αἴθει χαλκῷ, καὶ σμύρῃν,
 καὶ λίπασιν οὐρῶ διέσι, κλύζον, καὶ ἐς τὸ στόμα τῆς
 σύριγγος μολύβδιον ἐπιθέναι, ὅπως μὴ συμφύνη-
 ται, κλύζον δὲ περὶ σύριγγα περιδύσας πρὸς
 κύστιν, καὶ καθεὶς ἐς τὴν σύριγγα, πρὸς τὴν
 ἀφ' ἧς κλύζων, ὅπως δὲ ἔγινετο, ἢν μὴ
 τμηθῇ.

SI vero fistula non perferat, demit-
 so ante specillo, incidito quousque
 peruenierit, & florem æris inspergito, &
 ad quintum usque diem finito, tūm aqua
 calida foueto, & cataplasma superdato
 ex polenta in aqua subacta, & betæ folia
 superalligato. Cum verò flos æris exci-
 derit, vlcusque fistulæ purum fuerit, cu-
 rato vt præcedentem. Si vero in loco sit,
 in quo his vti non liceat, si etiam profun-
 dior fuerit fistula, flore æris, myrrha &
 nitro ex vrina dilutis eluito, & ori fistulæ
 plumbeum penicillum aptato ne coa-
 lesca. Eluere verò expedit fistulam pen-
 næ calamo ad vesicam alligato, eoque
 in fistulam immisso abluitionem infun-

dere. Verum minime sanescit, nisi se-
etur.

C Vrationem proponit eius fistulae quae pet-
forata & perui a non est, nec rectum inte-
stinum perrumpit. In eam primum demittit spe-
cillum, supraque id si stulam incidit, quatenus pe-
netrat. Sic suadet etiam Aëtius libri 14. capite 55.
ut fistulis obliquis sub cutem extensis specillum
immittamus, & eleuata cute totam longitudi-
nem vna sectione incidamus. Secta ubi fuerit
fistula, ea iniicienda sunt, quibus callus exedi so-
let, itaque vlcus respergit flore æris vsto, in eo-
que remedio perseverat ad quintum vsque diem,
fere enim intra quintum & septimum diem fi-
stulae callosa tunica consumitur. Et quoniam se-
ctio totius fistulae afferre solet partis inflam-
mationem, non solum aqua calida locum fouet, ut
antea, sed cataplasma etiam superimponit ex po-
lenta in aqua subacta, quod inflammationem
mitigat, & siccando etiam discutit, hordeum
enim primi est ordinis in refrigerando & siccando.
Superalligat præterea betæ folia, quoniam
betæ *διὰ τὴν ἀφλεγματικὴν ἰσχύαν*, facultatis est
inflammationem arcantis, Galeno libro octauo
de simplicium facultatibus, folia etiam betæ sic-
cant & digerunt, idcirco Hippocrati sententia
22. libri quarti de articulis *ὅππῃ δὲ καὶ φύλῃ αὐτῶν
ἀλλ' ὅππῃ τὸ ἔλκος ὅππῃ τὰ σπέρματα*. Recte folia
betæ vlceri atque vicinis partibus imponuntur.
Cum verò callus victus in edicamentis exierit,
vlcusque purum fuerit, imponenda sunt glutin-
antia, præcipueque sponsia melle illita, cum

vinculo precedenti sententia descripto. Si quando vero fistula in loco sit, in quo ad scalpellum venire non liceat: ut cum vesicæ ceruicem perforauerit, aut femoris articulum occupauerit, aut cum profundior fuerit, & altius penetrauerit, tunc eiusmodi fistulam eluimus medicamento quod detergendo & siccando curet, cuiusmodi est quod flore æris, myrrha & nitro ex vrina dilutis constat, de flore æris, myrrha dictum supra. Nitrum autem facultatis est digerentis & desiccantis, de quo vide commentarium in sententiam 26, libri de vulneribus, ubi ex his tribus cum omphacio pharmacum *ἐπουλωτικόν* describit Hippocrates, hoc autem loco ex vrina diluit, vrina vero hominis si quid aliud extergendi vim habet, Galeno libro decimo de simplicium medicamentorum facultatibus. Pennæ calamo ad vesicam alligato eluit fistulam, eoque in fistulam immisso ablutionem instillat. Sic Galeno, ut multis apud eum locis videre licet, *κλυστήρ* siue instrumentum quo medicamentum liquidum inijcitur in intestina, fuit vesica, cui cornea fistula, vel alterius materiæ, ad finem erat annexa. Porro fistulas eiusmodi hoc medicamento eluimus, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant, quædam enim per se insanabiles sunt, aliæ autem ex toto non sanescunt, cum enim medicamentum infusum ad omnes partes non perueniat, vnâ partem curat, reliquas omittit. Itaque dicit non sanescere has fistulas, ni secentur, aliter enim callus exedi non potest, quando autem restat callus fistulæ causa, neque caro produci, neque vlcus coalescere potest, fistulæ vero

quæ altius non penetrant, & ad quas medicamentum peruenire potest, sanescunt sine incisione, quoniam callus totus consumi potest, ut superiore sententia demonstrauit.

Ἡ ὁ ἀρχὴς φλεγμῶν, καὶ ὁδὸν ἔχει καὶ πυρετὸς, καὶ ἐς ἀφοδὸν θαμνὰ κατίζει, καὶ μηδὲν ὑποχόρη, καὶ ὑπὸ τῷ φλέγματος δοχῇ ἐξί-
ναι ἢ ἔδρη, καὶ ἐπὶ τε τραχυνεῖν ὅπιλαμβάνη,
τὸ το τὸ νόσημα γίνεται, ὅταν φλέγμα ἐς τὸν
ἀρχὸν καταστειῖται ἐκ τῷ σώματος, συμφέρεται
δὲ καὶ θερμὰ, διώεται γὰρ τὰδε περὶ σφε-
ρόμενα λεπνύνειν καὶ ἐκτίκειν τὸ φλέγμα, καὶ
ἀμα τῷ δριμύτι τὸ ἀλμυρὸν ἐξυδατοῦν, ὥστε
μὴ εἶναι τὸ χεῦμα, μὴ δὲ δῆξιν τινα ἐν τῷ
εἰτέρῳ.

SI anus inflammetur, adsitque dolor
& febris, & si ad aluum exoneran-
dam crebrò desidet, & nihil excernat, &
a pituita videatur anus procidere, & in-
terdum urinæ stillicidium cōtingat, hic
morbus accidit, cum pituita ex corpore
ad anum decumbit. Conferunt autem
calida, hæc enim adhibita pituitam ex-
tenuare & liquare possunt, & simul quod
acre & falsum est diluere, ita ut neque ar-
dor, neque erosio in intestino relin-
quatur.

Hæmorrhoidum & fistularum curationi superueniunt aliquando symptomata quedam quæ medentis sollicitudinem ad se conuertunt, de his obiter nunc agit Hippocrates, enumerat autem inflammationem, tenesmum, stranguriam, ani prolapsum, fluxum humoris, saniei, aut sanguinis, & dolorem, contra quæ conuenientia remedia præscribit. Inflammatum sæpissime anus propter hæmorrhoidas & propter fistulas, oritur enim inflammatio, maxime ubi dura aliud eum locum læsit, & ferè quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis, ait Celsus libro quinto & sexto. In hæmorrhoidibus quidem sanguis in venulis incalescens, ani partes vicinas inflammat. præterea hæmorrhoidum adustio & excisio partibus ani vim infert, & inflammationem relinquit. In fistulis dum cutem excindit dum callum exedit, dum acria & calida medicamenta immittit medicus, inflammationem excitat in ani partibus. Dum autem inflammat anus, dolor & febris accidit, hæc enim inflammationem sæpius comitantur. Cum homo sæpius desurgere cogitur, nihilque excernit præter pauca pituitæ, mucisque similia, interdum etiam leuiter subcruenta, hic affectus *τυμωμός* vocatur, & ἀπὸ τῆς τάσεως, a tensione nomen habet, pars enim affecta *ἐκτείνεται* & *ἐκτείνεσθαι βιάζεται*, extenditur & ad excretionem cogitur. Huius mali causa est genita in recto intestino inflammatio ædematodes, vel nascitur hic affectus à pituita crassa, acri, & viscida in recto intestino collecta, quæ assidue ad excretionem irritat, sed quia contumaciùs inhaeret, non

nisi magno conatu excerni potest. Ab eadem pituita anus aliquando procidit, & hæc affectio *πρωίως ἀρχὴ ἢ ἰδρῶς* dicitur, prolapsus siue procidentia ani vel sedis, de quo affectu paulo post, ut etiam de urinae stillicidio siue stranguria. Hos omnes affectus oriri dicit a pituita crassa, acri & falsa, quorum etiam curationem constituit in calidis remedijs, quæ pituitam extenuare, liquare, diluere, & in aqueam naturam convertere possunt, & ita ardorem erosionemque intestini tollere, statim autem remedia proponit hoc modo.

Θερμαπένειν οὖν χεὶρ ὡδὲ, καθίζην ἐς ὕδωρ θερμόν, καὶ τρίψαντα τὰ κόκκους ἔκνιδις ἐξήκοντα κόκκους, δεινὰν ἐν οἴνῳ κοτύλη, καὶ ἐλαίῳ ἡμικοτυλίῳ χλιύας, κλύσον, ἀγὰρ δὲ ταῦτα φλέγμα καὶ κόπρον, ὅταν δὲ μὴ ἐν τῷ ὕδατι καθίζῃ, ὡὰ ἐφύσας ἐν οἴνῳ μέλανι εὐώδει, προσθήναι πρὸς τὴν ἑδρῆν, ὑποπετάσας πὶ κατωτέρῳ θερμόν, ἢ κύτιν ὕδατος θερμοῦ πλήσας, ἢ λίνθ' ἀπέρμα πεφωσμένον ἀλέσας, τρίψας καὶ μίξας ἴσον ἀληγον ἐν οἴνῳ μέλανι καὶ εὐώδει, καὶ ἐλαίῳ, καταπλάσσειν ὡς θερμώτατον, ἢ κειτὰς μίξας ἢ τυπηρείην ἀνυπίπην τετειμμένην, ἔπειτα πλάσαι βάλανον μακρὴν, καὶ χλιαίων πρὸς πυρὸς, καταπλάσσειν τὴν καὶ πυρεθὴν, καὶ τοῖσι δακτύλοισι προσπλάσσειν, ἔπειτα ἀροχλίηρον ποίεων, ἐπιθέναι ἐς τὴν ἑδρῆν, τὰ ἔξωθεν δὲ κηρωτῇ ἀδιαλεῖναι, καὶ καταπλάσσειν σκωρόδοισιν ἐφθοῖσιν ἐν οἴνῳ με-

λανι κεκρημύω , ἐπ' αὐτὴν δὲ ἡξαρέης ἐς ὕδαρ
 θερμὸν ἐφίξην , καὶ συμμίσας χυλὸν τρύχιν , καὶ
 χλωὸς , καὶ ὕος τεαρ , καὶ χυσοκολλαν , καὶ ῥητή-
 νιν , καὶ κηρὸν λευκόν , ἔπειτα ἀγγλήσας ἐν τῷ
 αὐτῷ , καὶ συμμίσας , τέτοιον ἐχθίειν , καὶ ἕως
 ἀν φλεγμάνη , καταπλάσσειν τοισι σκορόδοισι
 θερμοῖσι , καὶ ἢν μὲν πρὸς ταῦτα ἀπαλλάσθῃαι
 τῆς ὀδυίνης ἀρκέτω , ἢν δὲ μὴ , πίσαι τὸ μη-
 κώνιον τὸ λευκόν , ἢν δὲ μὴ , ἄλλο ὅ,τι φλέγμα
 κατάρρει , ἀγγίτῃν δὲ ἕως ἀν φλεγμάνη , πρὸ-
 φήμασι κέφοισιν .

C Vrare igitur sic conuenit. Homo
 debet in aqua calida desidere , &
 gnidia grana sexaginta contrita , di-
 lutaque ex vini hemina , & olei dimidi-
 ata hemina per clysterem infundito ,
 hæc enim pituitam & feces educunt.
 Cum autem in aqua calida non de-
 sidit , oua in vino nigro odorato cocta-
 sedi admoueantur , subiiciaturque in-
 ferne aliquid calidum , siue vesica aqua
 calida repleta , siue lini semen fri-
 ctum , contusum & contritum , cum æqua-
 li farina , ex vino nigro & odorato , & ex
 oleo mistum , cataplasmatibus modo cali-
 dissime imponatur , adiecto hordeo , vel
 alumine ægyptio contrito , fiat deinde

glans oblonga, quam ad ignem tepesciens effingito, & dum calet digitis formato, & exactè tepidam in anum demittito, externas partes cerato perungito, & cataplasma ex allijs in vino nigro diluto coctis imponito. Vbi exemeris debet homo in aqua calida desidere, tuncque solani succum, adipem anserinam & suillam, chrysocollam, resinam & ceram albam misceto, deinde liquefacito, & ex his inter se mistis locum inungito. Dum aderit inflammatio, cataplasma ex allijs calidis imponito. Si ex his conquiescat dolor, satis abunde est, sin minus portio nē sumat ex meconio albo, vel alio quopiam quod pituitam purget. Dum inflammatio est, leuioribus cibis utendum.

INflammationis anicurationem proponit, quæ pituitam crassam & falsam morbi causam, attenuat, liquat, & in aqueum humorem conuertit, ita vt neque ardorem, neque erosionem aut morsum vllum in ano possit excitare. In aqua calida debet homo desidere, vt extenuetur & diluatur pituita crassa & acris, tum infunditur clyster ex hemina idest ex vncijs decem vini, & ex dimidiata hemina olei, id est ex vncijs quatuor cum semuncia, in quibus diluuntur sexaginta grana gnidia contrita, hic autem clyster

non solum feces educit, sed pituitam etiam vacuat. Hoc genus clysteris Hippocrati fuit familiare, ut circa finem libri primi *ἐπεὶ πυκνῶν* bis clysterem præscribit pituitam & bilem expurgantem ex sexaginta granis gnidijs in aqua infusis admisto melle & oleo, est vero gnidium granum semen Thymelææ Dioscoridi, Thymelæa, Mesuæ. est secunda species mezerei, quam ut perniciosam exterminat, & Galeno, gnidium granum acris & adurentis est facultatis, exoleuit nunc, & ab usu recessit hoc pharmacum, cuius loco, vel agaricum, vel electarium dia cnicu, vel benedictam aut hieram simplicem, vel dia colocynthidos assumere tuto possumus. Cum homo in aqua calida non desidit, debet anum fouere quis in vino nigro odorato decoctis, ad dolorem leniendum, ad inflammationem sedandam, & ad partem confirmandam & roborandam, ut facilius pituitam expellat. Sic Celsus libro sexto, ad ani rhagadia siue rimas, cum in ano pluribus locis cutis exciditur, hæc duo Hippocratis remedia transfert his verbis. Quiescere homo debet, in aqua calida desidere. Columbina quoque oua coquenda sunt, & ubi induruerunt, purganda, deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foueri locus, sic ut inuicē utrōque aliquis utatur. Hippocrates autem hoc loco oua in vino nigro odorato cocta sedi admouet, quorum calorem ut diutius conseruet, subiicit vesicam aqua calida repletā, vel calidissime imponit cataplasma ex semine lini frictō & contrito, cum æquali portione farinæ tritici ex vino nigro odorato, & ex oleo, cui vel hordeum *ἢ ἄρτυ*

iectum, vel alumen ægyptium contritum, hoc autem cataplasma, non solum ouorum calorem conseruat, sed dolorem lenit, inflammationem mitigat & partem sic roborat, vt anus post hac non procidat, deinde glandem oblongam in anum demittit, vt attenuatam & liquefactam pituitam educat, cum enim materia in recti intestini ima parte contineatur, facilius glande quam clystere educitur. Glandium autem varia solet esse præparatio, nam ex melle cocto, sale, nitro, puluere hieræ simplicis, hieræ diacolocynthidos, agarico, pyrethro, pipere, felle, sinapi, farina, lupinorum, ruta, absynthio, centauro & similibus acris conficitur, ita vt mellis vncia vna, salis aut acris materiæ drachmā dimidiam, aut drachmam vnam habeat. Partes deinde externas inungit cerato liquido, vt inflammationem coerceat. Cerati duplex apud Hippocratem ratio, interdum siquidem cera ex rosaceo vel ex oleo liquatur, interdum arida pix adiicitur, hinc *κερωτὴ ὕδατος*, & *μαρμαί*, ceratum liquidum vel picatum dicitur, commentario in sententiam vigesimam primam libri primi de fracturis. Cataplasma verò superdandum censet ex allijs coctis in vino nigro diluto, vt materiam inflammationis discutiat, allium enim vim habet calefaciendi & siccandi, & sua tenuitate facile penetrat, ita vt vrinas etiam moueat, compendiarie autem partium phlegmone obsessarū curatio, per siccantia præsidia perficitur, vt docet Galenus libri quarti methodi medendi capite quinto, & Hippocrates sententia 23. libri *ἁπλ.* *ἐκ κρημνῶν*, detracto cerato & cataplasmate, rursus

debet in aqua calida desidere, ad pituitam attenuandam, tum medicamentum ex succo solani, adipe suilla & anserina, ex Chrysocolle, resina & cera alba super imponendum ad inflammationem minuendam, dolorem leniendum, & ad discutiendum, & dum aderit inflammatio, cataplasma ex alijs imponendum; ad discutiendam inflammationis materiam. Si his remedijs non cesset inflammatio, nec dolor sedetur, dandum medicamentum aliquod pituitam expurgans, hinc proponit meconium album, quod Galeno in exegesi linguarum, est id quod vocatur peplus, & vulgo dicitur esula rotunda, cuius locotutius assumes phlegmagogum aliquod catharticum usu comprobatum. Quandiu autem timetur inflammatio, tandiu abstinencia pugnandum, & tenui diæta utendum, sic enim præsens inflammatio coercetur, & futura repellitur.

Η δὲ τραγούειν ὀπιπίπει ἐκ πάνδε, θερμαιομένη ἢ κύστις ἐκ τοῦ ἀρχοῦ, προσάγεται τῇ θερμότητι φλέγμα, ὑπὸ δὲ τοῦ φλέγματος τραγούειν γίνεται, ἢν μὲν οὖν ἅμα τῇ νόσῳ πάνηται, φιλέει γὰρ ὡς τὰ πολλὰ ὕπως γίνεσθαι, ἢν δὲ μὴ, δίδου τῇ φαρμάκων τῇ τραγούειν.

STranguria verò hinc accidit. Vesica ob anum incalescens pituitā calore attrahit, à pituita nascitur stranguria. Si autem vna cum morbo finiatur,

quod plerumque fieri solet, satis est, si minus, exhibenda sunt ea medicamenta quæ ad stranguriam pertinent.

INflammato ano aliquando superuenit stranguria, id est vrinæ stillicidium, est autē *σπέρμα*, *ἐκ τῆς σπέρμα τῶν ὀφθαλμῶν ἀποκρίσις*, commentario in aphorismum 48. libri 7. Vrinæ stillicidium est stillarim & guttatim vrinæ excretio. In stranguria est assidua meiendi cupiditas & pruritatio, nec pro consuetudine vrina redditur, sed paulatim & guttatim destillat & effluit. Stranguriæ causa esse potest vesicæ imbecillitas, vrinæ acrimonia, vlcus vesicæ, aut purulenti renes, pus enim cum vrina mistum ab abscessu renum rupto proficiscens, vrinæ stillicidium excitat. Hoc autem loco stranguriam ano inflammato superuenire dicit, vesica enim & rectum intestinum, cuius externa pars est anus, viciniae ratione facile per sympathiam & consensum afficiuntur, quod ipse etiam confirmat aphorismo 38. libri quinti. Ad recti intestini & vteri inflammationem accedit stranguria, non solum autem inflammatio anipotest communicari vesicæ, sed & materia quæ inflammationis est causa. Solet vero stranguria per sympathiam recti intestini excitata, vnâ cum morbo à quo dependet plerumque finiri, nec propriam curationem requirit. Si vero sedata ani inflammatione perseveret stranguria, tunc remedijs stranguriæ dicatis vtendum est, de quibus aphorismo 48. libri septimi agit his verbis, stranguriam & dysuriâ thorexis & phlebotomia sol-

ut, si enim frigida intemperies stranguriæ causa sit, vel etiam obstructio sanguinis crassioris citra plenitudinem thorexis & meri potio conueniens est remedium, præterea oleo rutaceo pectinem fouere oportet, ægrumque in maioranæ aut rutæ decocto desidere, ac imum ventrem contegere & calefacere, aliquando & per sedem oleum rutaceum calidum infundere, aromatum etiam decoctiones in potu exhibere, potest etiam præberi theriaca cum passo aut vino mulso. Si verò stranguriam efficit plenitudo sanguinis, vrinæ acrimonia & mordacitas, tunc sanat venæ sectio, per phlebotomiam Philotheus πλὴν σφουερμαίαν, id est venæ interioris in talo sectionem hic intelligit. Exuperantem etiam vitiosum humorem quam celerrime purgare oportet, & ab omnibus acribus ac salis abstinere, vitanda exercitia, vinum, ita, & βεγδυστία, ex usu sunt quæcumque acrimoniam humoris contemperant, ptisanæ cremor, pisces, balnea, aqua calida dulcis plurima in potu exhibita, optimum etiam est ipsum lac calidum potatum. Si calculus, grumus, vel eius generis aliquid obstruens, vrinæ transitum impediat, catheterem immittere conducit, porro si aliud membrum sit affectum, & ipsum per vesicam expurgetur, manifestum est illi priorem curam deberi, ita tamen vt vesicam non negligamus.

Ἦν δὲ ὁ ἀρχὸς ἐκπίπῃ, ἀνάσας ἀπότρεμαλτακῶ, καὶ κατὰ χεῖρας κοχλῖν, τῷ χειρὶ δόσας, ἐκκρίμασθαι ὀλίγον χέρον, καὶ εἰσει-

σιν, ἣν δὲ μείζον ἐκπέσῃ, καὶ μὴ μόνῃ εἶδον, ἀλλὰ
 ζώσας ἐν τῇσι λαγύρῃσι, καὶ ὑφεῖς ὅπρῳθεν τα-
 νίλῳ, ὥσας ἔστω τὸν ἀρχόν, περὶ εἶναι ἀπό-
 ρον μαλθακὸν βρέξας ὕδατι θερμῷ, ἐνεψήσας
 λατοῦ πείσματα, κατὰ χεῖρα δὲ καὶ χεῖρ ἔκ ἀρ-
 χῶν ἀπ' αὐτοῦ ἔκ ὕδατος, τὸν δὲ ἀπόρρον ἐκ-
 πέσῃ, ἔπειτα ὑποτείνας πλὴν ταινίλῳ ἀλλὰ
 μέσων τῆς σκελέων ἀναδύσας πρὸς τὸν ὀμφά-
 λον, ὅταν δὲ γέλη ἀφοδεύειν, ὅπρῳ σάνισιν ὥς
 γενοτάτοις ἀφοδεύετω, ἣν δὲ παιδίον ἢ, ὅπρῳ
 γυναικὸς τῆς ποδῶν πρὸς τὰ γυνάτια περὶ
 σκληθεῖς, ὅταν δὲ ἀφοδεύῃ, τὰ σκέλεα ἐκτε-
 νάτω, ἔτω γὰρ αὐτὴν ἥμισυ ἐκπιπτοῖ ἢ ἑδρῇ.

AT si anus ipse procidit, eo per
 mollem spongiam repulso & co-
 chleâ peruncto, alligatis manibus ho-
 minem paululum temporis suspendito,
 & intro reuertetur. At si magis procidat
 nec intus remaneat, vbi zonam ilibus
 admoueris, faciamque ex posteriori par-
 te submiseris, impulso introrsum ano,
 spongiam mollem imbutam aqua cali-
 da in qua loti ramenta fuerint decocta,
 imponito, eadem verò aqua anum per-
 fundito, sed spongiam exprimito, dein-
 de faciam per media crura subtendens
 ad vmbilicum deligato. Vbi deijciendi

cupiditas fuerit, super asserebus angustissimis deijciat. Si verò puer fuerit, mulieris pedibus infidat ad gēua inclinatus. Quoties autem deijciet, crura extendat, ita enim minimè procidet anus.

ANus procidit ob plures causas, aliquando ob infirmitatem musculorum obliquo-
rum sedem sursum reuellentium, aliquando ob resolutionem nerui qui ab extrema spina ad sedem porrigitur, vel ob laxitatem membranarū quibus ossi sacro & lumbis colligatur, quæ pueris & infantibus familiaris est ex multi humoris perfusione, procidit etiam anus à magno egerendi conatu, qualis in dysenteria & tenesmo molestus esse solet, fit etiam ani prolapsus à pituita acri & salsa in recto intestino coaceruata, ut paulo ante dixit, quod cum accidit, molliori spongia repellendus anus in suum locum, protrudendus ac reponendus, & ne facile excidat perungendus cochlea, per cochleam autem intelligo carnem limacis sine testis & tegumentis vel *μύξα* siue mucum. Caro autem cochlearum prius in mortario contusa ac postea ad lauiorem redacta validissimè desiccatur partes superfluo humore grauatas, ipse autem humor siue mucus solus per se citra carnem thuri mistus, aut aloæ, aut myrrhæ medicamentum est *ἰχέκολλον* tenax & glutinosum. porro ubi multum succi cochlearum accipere voles, carnem earum stylo puncto, sed non ante multos dies venatas esse expecta-

dit, alioquin enim tempore desiccantur, nam recentes plurimum habent viscosæ illius humiditatis, quam stylo compunctæ effundunt, vt ait Galenus initio libri vndecimi de simplicium medicamentorum facultatibus, cum de animalium carnibus verba facit. In cochlearum penuria anus illinendus vino nigro austero in quo decocta fuerint folia oleæ, myrti, malicorium, rosæ, aut cortices cydoniorum, aut simile aliquid. Repulsus per spongiam anus, & cochlea perunctus si non facile reponatur, alligatis manibus hominem suspendi iubet per pedes, vt caput deorsum spectet, sic enim intro protruditur, & in locum suum reuertitur. Cornarius ἀνώσας quod legitur initio huius sententiæ non vertit, & videtur legisse αἰονήσας vertit enim, fomento adhibito. Vidius etiam ἑσθίσιν non exprimit. Si verò anus semel repositus excidat iterum, nec intus maneat vinculum admouet ex duabus fascijs, quarum altera ilibus subtenditur & zonæ modo cingitur, altera huic mediæ assuitur, & per lumbos recta procedit ad anum, vbi continet spongiam expressam, quæ anum introrsum impulsu coerceat, ne amplius procidat, spongiam autem madefacit aqua calida, in qua decocta fuerint loti ramenta, Lotus autem facultatis est astringentis & desiccantis, vt dictum est commentario in sententiam 27. libri de vulnere ibi ἡ λωτὸς τορνέματα vocat, quæ nunc πείσματα. eadem aqua anum ipsum perfundit, vt semel repositus non prolaberetur & excidat. At quoniam prolapsionem ani mouet egerendi conatus, suadet

ut super asscribis quam maxime angustis defidat, ut sic anus constringatur, qui in loco latè patente liberè dilatatur, & facilius excidit, forasque prodit. Si puer sit, qui exitu ani laborat, pedibus mulieris insidens, & dorso genibus eius adhærens, aluum exoneret: quoties autem defurgere volet, crura extendat, ut anus constringatur, qui relaxari solet inflexis aut diductis cruribus.

Ἦν δὲ ὑγραίνηται ὁ ἀρχὸς, καὶ ἰχὼρ ἀπορρέη, περὶνίψαι τρυγὶ κεκαυμένη καὶ ὕδατι ἀπὸ μυρσίνης, καὶ ἀδιάρτον ξηρῆρας καὶ κόφας, διασώσας, κατὰ πασσε. Ἦν δὲ αἰμορροῖ, περὶνίψας τοῖσι αὐτοῖσι, χαλκίτιν καὶ τσίσμα κυπαρίσου, ἢ χέδρου ἢ πίπυρος, ἢ τερμίνθου τρίψας, συμμίζας τῇ χαλκίτιδι ἴσον, καταπλάσσειν. τὰ ἔξωθεν δὲ κηρωτῇ παχείῃ περιαλείφειν.

SI humidus est anus, & defluat sanies, subluendus est fece vini combusta, & aqua cum myrto incocta, & adiantum siccum contritum ac cribro transmissum inspergito. Si verò sanguis profluat, iisdem est subluendus, tum chalcitidem, & ramenta cupressi, vel cedri, vel pini, vel terebinthi contrita, & paribus portionibus mista imponito. Partes externas cerato crassiore perungito.

Cum anus procidit, considerari debet, puerumne id sit quod prouolutum est, an humore mucoso circumdatum. Si purum est, curatione præcedenti utendum, si verò humidus sit anus & saniem fundat, abluenda recti intestini pars prolapsa ex decocto astringente & siccante, cuiusmodi est decoctum myrti ex aqua cum fece vini combusta, myrti autem semen sumi potest aut folium, utrumque enim astringit & desiccatur, fex vini combusta astringit etiam sic atque, vis ei præterea supra modum vrens, quæ corrigitur & frangitur decocto aquæ, ablui etiam potest anus procidens vino nigro austero, in quo decocta sint folia oleæ, rosæ aut malicorium. Sordes etiam ano inhærens detergenda est hydromelite, aqua marina, aut muria, vrina etiam ipsius ægri calens adhuc superfusa adiunat, post lotionem & fotum, adiantum siccatum, contritum & cribro excussum inspergit, adiantum autem siccat & discutit, vel huins loco, malicorij, balauustiorum, gallarum, antimonij, corallipares porciones tritas & cribratas inspergito. Si verò anus sanguinem fundat acri illo & salso humore venarum ora aperiente, eadem decoctione subluendus est, tum imponenda chalcitis contrita, cum pari portione ramentorum cupressi, vel cedri, vel pini, vel terebinthi ad sistendum sanguinem. Chalcitis enim calefacit & leniter erodit, crustasque vlceribus inducit, cupressus refrigerat & astringit, Dioscoridi, siccat verò sine insigni acrimonia & caliditate, Galeno. Cedrus autem calidi est siccique temperamenti, pinus

astringit, terebinthus etiam astrictiōnis aliquid habet, & præterea calefacit & desiccāt. Laudat Paulus hunc puluerem inspersum, ex pini corticis, mannæ, lithargyri, singulorum drachmis octo, cupressi orbiculorū siccorum, molybdænæ singulorum drachmis duabus, hoc autem ad-mouet, abluta prius sede vino austero. Exteriores partes cerato crassiore perungit, ad partem siccandam & dolorem leniendum. Crassius autem ceratum est, quod picem habet, & Hippocrati passim κηρωτὴ πικρὴ, hīc παχύν dicitur. Conuenit inter omnes ceratum hoc lenire dolorem, ut ait Galen. commentario in sententiam tertiam libri tertij de fracturis. Pix etiam arida, quæ huic cerato adijcitur, plus desiccāt quàm calefacit. Sic Aetius sedem procidentem vino abluit, & picem aridam tritam inspergit, & Scribonius Largus intestinum extremum prolapsum pice liquida perungit.

Ὅκοταν ἀρχὸς ἐκπέπῃ, καὶ μὴ τέλη καὶ χεῖρ
μένειν, σίλφιον ὅτι ἀεικὸν καὶ πυκνότατον ξύσαι
λεπτόν καταπλάσσειν, καὶ τὸ πικρὸν φαρμά-
κου πρὸς τὴν ῥίνα περιθέναι, καὶ παροξύνειν
τὸν ἄνθρωπον. ἢ ὕδατι θερμῷ περιπλυνῆαι, σί-
δια καὶ τυπηρίῳ τρίψας ἐν οἴνῳ λευκῷ, κατα-
χέαι τὸ ἀρχὸν. ἔπειτα ῥάκεα ἐμβαλεῖν, καὶ τὸς
μυρὸς ξυνοῦσαι ἡμέρας τρεῖς, καὶ νηστεύειν, οἶνον δὲ
πινέτω γλυκύ. ἢν δὲ μηδὲ οὕτω διαχρῆται,
μᾶλλον μύζας ὁμοῦ μέλιτι διαχρῆται.

QUùm anus prolabitur, neque suo in loco remanere potest, laserpitium, quàm optimum ac densissimum in tenues partes contritum imposito, & medicamentum sternutatorium naribus admoueto, hominémque ad ciendũ sternutamentum incitato. Vel ubi aqua calida ablueris, malicorium & alumen in vino albo terito, anúmque perfundito, tũm linteolum superinijcito cruribus inter se per triduum deuinctis. Inediam sustineat, vtatur vino dulci. Si verò neque sic retrocedat, minium cum melle misceto, & inungito.

ANi procidentis remedia proposuit, quibus si in suo loco retineri nequeat, alia nunc describit præsidia ad anum reponendum & in sua sede continendum: prodest laserpitium optimum & densissimum in tenues partes contritum cataplasmatismodo impositum. Laserpitium autem siue Silphium planta nũc nobis ignota, strenuè calefacit, siue sumatur radix, caulis, aut folium, liquor autem qui laser vocatur, calidissimus est, Galeno libro octauo de simplicium facultatibus: poterit eius loco, pice liquida perungi anus, vt ex Scribonij sententia paulo ante dictum est. Medicamentum autem sternutatorium naribus admouet, hominémque ad sternutamentum commouet, vt hoc violentiore

motu pituita intestino adhærens expellatur, quo modo sternutatio à singultu liberat, euacuata ea humiditate, quæ ventriculo continebatur aphor. 13. libri septimi. Quomodo etiam mulieri difficulter parienti superueniens sternutatio prodest, quia fætum excutit, aphor. 35. libri quinti. Sternutatorium autem medicamentum calidum & acre sit oportet, vt facultatem cerebri expultricem irriter, eiusmodi facultatem habent piper, zinziber, pyrethrum, sinapi, castorium, cuphorbium, elleborus albus & similia. Vbi rectum intestinum quod prolabitur, & nequit suo loco consistere, fuerit purum, aqua calida subluendum est, deinde perfundendum decocto aliquo siccante multum & astringente, cuiusmodi est vinum album in quo alumen & malicorium prius contrita, inferbuerint, tum panno adhibito retinet intrus repositum intestinum ne procidat, & femora per tres dies inter se deuincit, diductis enim cruribus facile relaxatur. Inediam imperat, ne humorum copia rursus intestini prolapsionem excitet, vinum dulce concedit, vt humorem peccantem nempe pituitam corrigat. Si ne sic quidem regrediatur & in suum locum se recipiat anus, minium cum melle miscet & inungit, quæ compositio, vim habet exsiccantem & ἐμπλαστικὴν, quasi inducendo obstruentem & astringentem, eiusmodi enim facultatis est μίλτος siue minium. Cæterum hîc minium Sinopicum intelligere oportet, μίλτον σινωπικὴν vocat Dioscorides libro quinto. Rubrica autem Sinopica dicitur, quia

primū in ponto inuenta est, & à Sinope vrbe nomen habet: cuius vsus in medicina est contra vlcera potissimum in humore sita, veluti oris & sedis, alium etiam sistit & fœminarum profluvia. Rubricæ Lemniæ palmam dabant quidam, minio proximam, hæc est multum antiquis celebrata, cum insula in qua nascitur, nec nisi signata venundabatur, vnde & sphragidein appellauere, ait Plinius libri 35. capite sexto. Galenus scribit tertiam Lemniam vocari à quibusdam *μίλτον ληνίαν*, libro nono de simplicium facultatibus. Vitruuius Rubricam Lemniam, aut minium Lemnium dicit. Matthiolus suspicatur vulgare bolum Armenium esse rubricam Sinopicam. Licebit itaque loco huius minij, assumere vel terram Lemniam vel bolum Armenium. Mel autem admiscetur, vt tenaci & viscidō suo lentore puluerem minij intestino faciat adherere, non vt alium deijciat, quod putat Vi-dius, qui etiam *διαχωρέειν* ad alui deiectionem referri putat.

Ἄρχος ἦν ἐκ πίπτης αἰμορροῆς, ἀπὸ ρίζης πει-
λῶν τὸν φλοιὸν, ἐφείν ἐν ὕδατι, ἔπειτα τρίβειν
ἀλητὸν συμμίσγων, καὶ καταπλάσσειν θερμὸν.
Ἄλλο τῆς ἀμπέλου τῆς ἀγρίας, ἦν ἔνιοι καλοῦσι
ψιλάθειον, τρυτέης τὰς ρίζας τὰς ἀπαλωτάτας
πειζέσαντα, ἐψῆσαι ἐν ὄνῳ μέλανι ἀκρήτω
αὐστηρῷ, ἔπειτα τριψάντα καταπλάσσειν χλιη-
ρὸν. Συμμίσγειν δὲ καὶ ἄλευρα, καὶ φυρῖν ἐν οἴνῳ
λευκῷ, καὶ ἐλάδιω χλιηρῶς. Ἄλλο. κωνεῖς χαρπύ-

τρίβοντα. ὡς ἀτάξιν οἶνον λευκὸν εὐώδεια,
ἵππειά κατὰ πλάσσειν χλιηρόν.

SI anus procidat & sanguinem fundat, Ari radicis corticem detractum in aqua coquito, deinde contritum farina commista, calidum imponito. Aliud vitis sylvestris, quam nonnulli psilothriō vocant, radices quàm tenerrimas concisas in vino nigro meraco austero coquito, deinde cōtritas tepidè imponito. miscere autem & farinam oportet, & in vino albo ac oleo subigere tepidè. Aliud. Cicutæ semen vino albo odorato instillato contritum tepidum imponito.

AD ani exitum, & sanguinis ex eo fluxum tria præsidia proponit. Primum est cortex radicis Ari in aqua coctus, deinde contritus, & admista farina, more cataplasinatis impositus tepide. Hoc enim pituitam prolapsionis causam deterget, siccet & calefacit, Arum enim terrena substantia constans & calida. Vim extergendi habet estque in siccando & calefaciendo primi ordinis, Galeno libro sexto de simplicium facultatibus: præterea sanguinem sistit ob admistam farinam, quæ medicamentum reddit glutinosum, & amplasticam facultatem com-



municat. Secundum remedium eiusdem etiam est facultatis, vitis enim sylvestris radices tenerimæ concisæ & ex vino coctæ humorem pituitosum expurgant, ideoque hydropicis dantur. Dioscoridi libro 4. farina in vino albo & oleo subacta & permista sanguinem sistit. Vidius hîc videtur legisse ἀμπέλου λευκῆς, vertit enim Bryoniæ albæ & Galenus ipse libro sexto de medicamentorum facultatibus confirmare videtur hanc lectionem, nam ἀμπελον λευκὴν vocari broyniā & Ψιλωθρον dicit, ut etiam Dioscorides, cuius quoque sententiæ est Plinius, qui libri 23. capite primo, vitem albam, à Græcis appellari ampeloleucen, ab aliis psilothrum scribit. Galenus & Paulus non videntur aliud intellexisse per ἀμπελον ἀγρίαν, quam vitem sylvestrem satiuæ & cultæ congenerem, quam labruscam Latini vocant. Significat tamen ἀμπελος ἀγρία & herbam palmites longos ex se mittentem lignosos, asperos, rimoso cortice, folia autem hortensii solano similia, sed latiora, longioraque, & fructum exiguis vuis similem, à quo vitis nomen accepit, eius radici vis calida & acris est, ut ad usum psilothri veniat, vnde eam à nonnullis vocari Ψιλωθριον dicit Hippocrates, quamvis Dioscorides, Galenus, Paulus Ψιλωθρον nominent, & Plinius etiam psilothrum de vite sylvestri, vide Dioscoridem libro quarto. Ψιλωθρον autem proprie est medicamentum pilos demens & extirpans, quod vim erodentem aut exurētem habet, eorum quæ pilos demunt materiam copiosè declarat Galenus libro primo κτ' ἵππους.

Tertium remedium ad sanguinem fluentem sistendum est efficax. Cicutam extremè frigidam esse norunt omnes, eius semini contrito vis refrigeratoria tāta est, ut sanguinem spissando enecet, vini autem albi odorati quod instillatur excalfactoria natura, Cicutæ frigiditatem temperat. Sic etiam per nares sanguini fluenti Cicutæ semen tritum ex aqua, inditumque efficax habetur, Plinio libri. 29. cap. 13.

Ἡν δὲ φλεγμαίνῃ, κισσοῦ ῥίζαν ἐψησας ἐν ὕδατι τρίψας λεῖον, ἄλευρον συμμίσγων ὡς χάλισον ἐν οἶνῳ λευκῷ φυρήσας, καταπλάσσειν, καὶ ἄλειψα πρὸς τοῖς συμμίσθας ἄλλο μανδραγόρου ῥίζαν μάλιστα μὲν χλωρίῳ, εἰ δὲ μὴ ξηρίῳ, τὴν μὲν οὖν χλωρίῳ ἀποπλύναντα καὶ τὰ μόντα, ἐψησας ἐν οἶνῳ κεκρημένῳ, καὶ καταπλάσσειν τὴν δὲ γὰρ ξηρὴν τρίψαντα, καταπλάσσειν ὁμοίως ἄλλο σικύου πεπονος τὸ ἔνδον τρίψας λεῖον καταπλάσσειν.

SI vero tentatur inflammatione, hederæ radicem in aqua coctam, & bene contritam cum farina optima ex vino albo subacta, & permisto pingui aliquo imposito. Aliud. Mandragoræ radicem potissimum viridem, vel certè aridam, viridem quidem lotam & concisam ex vino diluto coctam imposito, aridam



vero contritam, similiter imposito. Aliud. Cucumeris maturi pars interior diligenter contrita imponatur.

TRia remedia proponit, quibus ani inflammatio curatur. Primum est cataplasma ex radice hederæ in aqua coctæ, cui contritæ miscetur farina optima ex vino albo subacta, adiecto oleo vel adipe. Hedera enim habet aliquid astringentis facultatis, quæ terrena & frigida est, Galeno libro 7. de simplicium medicamentorum facultatibus. Et Plinio libri 24. capite 10. omnia genera hederæ refrigerant. Farina etiam tritici inflammationem discutit, Dioscoridi. Hic autem per farinam optimam, farinam tritici intelligit. Hesychius enim scribit ἄλευρα κρείως, τὰ τῆς σίτου, ἄλφιτα δὲ τὰ τῶν κριθῶν. ἄλευρον propriè significare farinam tritici, ἄλφιτον verò farinam hordei: admiscet his ἄλειφα, oleum vel adipem. Galenus enim in exegeσι ἄλειφα exponit ἔλαιον, ἢ σίταρ. Hesychius ἀλείφατι, ἐλαίῳ, & ἀλεῖλαι, ἐλαίῳ χρίσαι explicat. Hippocrates etiam ipse libro quarto de morbis, ἄλειφα sæpius sumit pro oleo, cum loquitur de lecytho coriacea oris angusti oleo impleta. Et libro primo de morbis muliebribus, ἄλειφα ῥόδινον, oleum rosaceum vocat, cum proponit medicamenta subdititia, quæ vocat σπέρματα, acria, sanguinem ducentia. Secundum inflammationis ani remedium fit ex radice mandragoræ ex vino diluto cocta: mandragora verò vincentem habet facultatem refrigeratorem, ut

tertij sit ordinis refrigerantium, radicis verò cortex cum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed etiam desiccatur, & idcirco radice mandragoræ utitur, quia phlegmones curatio etiam per siccantia perficitur: utitur autem radice mandragoræ vel viridi, vel sicca, & viridem quidem abluunt & incidit, tum ex vino diluto coquit, siccam vero conterit, & similiter incoquit & imponit. Siccatur autem radix mandragoræ, cum cortex detractus, linòque traiectus ad usum suspenditur, Dioscoridi, siccatur etiam in aëre, ut cucumis, primòque super mustum suspenditur, mox in fumo, dein tunditur in vino aut aceto. Plinio libro 26. capite undecimo. Tertium remedium fit ex interiore parte cucumeris maturi quæ diligente contusa & ano imposita inflammationem sedat. Cucumisenim refrigerat, superatque in eo frigida & humida intemperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo cesseretur ordine, Galeno libro octauo de simplicium facultatibus. σίκυος aut σίκυον aut σίκυς, cucumis siue cucumer nomen est multis fructibus commune: est enim σίκυος ἡμερῆς, ἢ ἐδωδιμῶς, cucumis sativus aut esculentus, est etiam σίκυος ἄγριος, cucumis sylvestris, Plinio anguinus & erraticus, libri 20. capite 2. asininus vulgo, è cuius fructu maturo, inclinante æstate succus leniter expressus siccatusque dicitur ἐλαπίδιον. Rursus cucumis sativus, vel est maturus vel immaturus, & maturus hic σίκυος πέπων Hippocrati dicitur, immaturus verò σίκυος ὠμός, cucumis crudus, sic enim Hippocrati libro secundo de diætâ σίκυοι ὠμοί, ὅ



δὲ πέπωνες dicuntur. Plinio tamen, cucumeres cum magnitudine excessere pepones vocantur libri 19. cap. 5.

Ἦν δὲ γένηται ὁδυώη, καὶ μὴ φλεγμαίνη, λίτρον ὀπήςσας ἐρυθρον, καὶ τρίψας λεῖον, καὶ τυπηεῖν, καὶ ἄλας φώξας, καὶ τρίψας λεῖαις, συμμίσσαι ἴσον ἐχάστου, εἴτα πῖσση συμμίσσας ὡς βελτίστη ἐς ῥάκος ἐναλείψας, ἐνπρήναι καὶ χαταδεῖν ἄλλο. Καππάριος φύλλα χλωρὰ τρίψας ἐς μαρσίπιον ἐμβαλὼν προχαταδεῖν, καὶ ὅπῃ τὸ καίειν δοχέης ἀφαιρέειν καὶ αὐτῇς προσπρήναι ἣν δὲ μὴ ἢ φύλλα καππάριος, τὸν φλοιὸν τῆς ῥίζης κόψας, πυρήσας ἐν οἴνῳ μέλανι τὸν αὐτὸν τρόπον χαταδεῖν τοῦτο καὶ πρὸς σπληνῶν ὁδυώει ἀγαθόν.

SI vero dolor adsit, nec inflammatione tentetur anus, nitrum rubrū vstum contritūmqne, alumen etiam ac salem retorridum diligentérque tritum pari portione misceto, deinde addita pice quam optima, linteóque illita imposito ac deligato. Aliud. Capparis folia viridia contrita, sacculo conclusa super-deligato, cúmqne vrere videbuntur, remoueto, & iterum imposito. Si verò folia Capparis non affuerint, radicis corticem contusum, vinóque ni-

gro subactum eodem modo deligato.
Hoc etiam ad lienis dolorem valer.

Doloris ani citra inflammationem remedia proponit, pituita enim acris & salsa intestino adherens dolorem excitat, cui conferunt ea, quæ pituitam extenuare, liquare, diluere & detergere possunt, cuiusmodi est medicamentum ex nitro, alumine & sale combustis & tritis, & cum pice permistis, nitrum enim digerit, desiccatur & extenuatur, Galeno libro nono de simplicium medicamentorum facultatibus, Plinio, nitri natura non multum à sale distat, cuius naturam medicos ignorasse dicit, multoque magis nos hodie, ad quos iam diu conuehi desijt. Sal eandem fere vim habet, quam nitrum: alumen quamuis astringentem habeat vehementem, vim etiam possidet expurgandi & extenuandi, Dioscoridi libro quinto. Hæc autem omnia contrita excipiuntur pice, quæ calefaciendi, desiccandi, abstergendi, digerendique facultatem obtinet. Aliud etiam remedium quod fit ex capparis folijs viridibus contritis, vel ex cortice radice capparis contuso & vino nigro subacto, ani dolorem mitigare potest, & pituitam doloris causam expurgare. Capparis autem Galeno libro septimo de simplicium facultatibus, varias habet facultates, radice enim cortex vincentem habet qualitatem amaram, proximam, acrem, deinde acerbam, ex quo liquet diuersis & pugnantibus constare facultati-

bus, quippe abstergere, purgare, incidere potest amaritudine: calefacere, incidere, digerere acrimonia: contrahere, densare constringere acerbitate. Radicis cortici fructus virium proportionem respondet, folia & caules eius, similem vim obtinent. Porro Capparis quæ in admodum feruentibus regionibus prouenit, ut quam fert Arabia, multo est nostrate acrior, adeo ut plurimum etiam habeat facultatis adurentis, & idcirco suadet Hippocrates, ut cum vrere videbitur, remoueatur & iterum imponatur. Addit in fine, ad lienis etiam dolorem valere Capparis corticem, quod Galenus etiam confirmat ibidem, dum ait, Lienes etiam induratos si quid aliud hoc medicamentum iuuat, tum foris idoneis remedijs admistum, tum intro in corpus assumptum, quippe cum aperte crassos lentosque humores euacuet, per urinas & per aluum. Plinio etiam libri 20. capite 15. Spleniticis prodest in vino potus radicis Capparis cortex duabus drachinis, feruntque triginta quinque diebus per urinam & aluum totum lienem emitti.

Τούτων τῶν καταπλασμάτων, τὰ μὲν ψύχοντα, κωλύει ῥεῖν, τὰ δὲ μαλθακάζοντα καὶ θερμαίνοντα, διαχέειν: τὰ δὲ εἰς ἐσωτὰ ἔλκοντα, ἐκκαίνει, καὶ ἰσχυαίνειν. τοῦτο δὲ τὸ νόσημα γίνεται, ὅταν χολὴ καὶ φλέγμα εἰς τὰς τόπους κατασπείξῃ. ἀρχὴ δὲ φλεγμῖναντος διαχέειν τῷ φαρμάκῳ, ὅπῃ ἢ ῥητινῇ καὶ τὸ ἔλαμον, καὶ ὁ κηρός, καὶ ἡ μόλυβδαίνα,

καὶ τὸ σῆμα. ὡς θερμώτατον διερρήθῃσαν κατὰ
πλάτισταται.

EX his cataplasmatibus quæ refrigerant, fluxum prohibent: quæ verò molliunt & calefaciunt, resoluunt: quæ ad se trahunt, siccant & extenuant. Nas- citur autem hic morbus, cum bilis & pi- tuita ad sedem decubuerit. Anum autem inflammatum inungere oportet medi- camento, quod resinam & oleum & ce- ram & plumbaginem atque adipem re- cipiat. Hoc autem calidum & liquefa- ctum imponere oportet.

Contra ani inflammationem, exitum, san- guinis fluxum, humoris copiam & dolo- rem varia præscripsit hæcenus remedia, quo- rum vires & facultates nunc aperit. Cataplas- mata igitur refrigerantia quæ proposuit vim ha- bent repellendi & reprimendi, & in altum hu- mores occurrentes reiiciendi, sicque fluxionem prohibent, eiusmodi est quod fit ex cicutæ semi- ne contrito, vino albo odorato affuso, & quod ex radice mandragoræ componitur, & quod cu- cumeris maturi partem interiorem recipit. Ca- taplasmata autem emollientia & calefacientia vim habent digerendi, discutiendi, resoluendi, & humorē qui in aliqua corporis parte continetur per insensibiles cutis meatus educendi & eua- porandi, eiusmodi est cataplasma ex semine lin-

fricto & contrito, adiecta farina, quæ vino nigro atque oleo excipitur. Cataplasmata attrahentia siue *ἐλκυστὰ*, calida cum sint & tenuis substantiæ, humores tum serosos, tum crassiusculos, spiritusque ex alto corpore in summa transferunt, sic dissipando siccant & extenuant. Cuiusmodi est quod componitur ex nitro, sale, alumine, torrefactis & contritis, addita pice: & quod fit ex cortice radice Capparis confuso, & in vino nigro subacto, & cataplasma ex allijs in vino nigro diluto coctis, & multa alia. Rationem deinde reddit, cur cataplasmata refrigerantia, emollientia, calefacientia & attrahentia præscripserit, quia nempe morbus hic, cuius curationem tradit a bile & pituita crassa nascatur. Bili enim calidæ conueniunt refrigerantia, pituitæ autem calefacientia, crassities verò humorum emollientia & attrahentia requirit. Morbum autem hunc ait nasci ex bile & pituita, quem paulò ante accidere dixit, cum pituita ex corpore ad anũ decumbit, sed pituita crassa, salsa & putrescens bilis acrimoniam acquirit, dumque incenditur, inflammationem, dolorem, prolapsionem, cæteraque symptomata excitat, quæ a bile cum pituita iuncta possent excitari. In fine proponit remedium, ubi anus inflammatur cum dolore. Separatim enim inflammationis & doloris auxilia descripsit, nunc autem pharmacum inflammationi dolorique conueniens subiicit. Cum autem anus subtili & exquisito sensu præditus sit, acrimoniam ferre non potest, itaque dolenti & inflammato ano conueniunt ea remedia, quæ sine morfu inflammationem leuant & dolorem

leniunt, cuiusmodi est pharmacū, quod resinam, oleum, ceram, adipem & plumbaginem recipiet: resina quidem desiccatur sine morfu, oleum verò salis expers moderatè calidū leniendi vim habet, cera quodammodo medium tenet calefacientium, refrigerantium, humectantium & desiccantium, estque cera medicamentorum refrigerantium & calefacientium materia, Galeno, libro 7. de simplic. facultat. Molybdæna siue plumbago moderatissimè desiccatur, & à media temperie ad frigidum paulum quid recedit, liquatur autem celerrimè, vbi oleo additum nonnihil aceti est. Adeps denique omnis quæ tenuitate substantiæ sit prædita, dolorem lenit atque demulcet, humorūque acrimoniam obtundit. Videtur autem Hippocrates adipem calidiorē hīc poscere, in græcis enim exemplaribus τὸ θερμὸν ὡς δερμότατον, legitur sine vlla distinctionis nota, sicque vertit Cornarius quasi coniunctum, & adipēs omnes ex calidioribus animalibus, & quæ vetustate acriores & calidiores euaserunt, tenuioris sunt substantiæ, & attenuandi facultate magis insignes. Illud tamen ὡς δερμότατον, iungendum sequentibus, ut iunxit vidius. Sic enim Hippocrates ipse sententia decima tertia huius libri κατὰ πλάσσειν θερμόν dixit imponere calidum, & bis κατὰ πλάσσειν χλιαρόν, imponere tepidum, & paulò ante sententia octaua, κατὰ πλάσσειν ὡς δερμότατον, imponere calidissimè.

F I N I S.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΤΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛῇ ΤΡΩΜΑΤΩΝ.

H I P P O C R A T I S

de Vulneribus.

Capitis.

Præfatio in librum

Hippocratis Εἰς τῶν ἐν

κεφαλῇ τραυμάτων.

HIPPOCRATES copiose per-
sequitur quæ ad ossium vitia
& morbos pertinent libris de
fracturis & articulis. Quo-
niam verò offensiones quæ in
ossa capitis incidunt, propriam animadversio-
nem desiderant, aliamque omnino ac diuersam
curandi rationem postulant, de his hunc inte-
grum composuit libellum, in quo omnia præ-
scribit, quæ ad capitis τραύματα offensionesque
pertinent, quæque in his sunt agenda, in fine
sexti libri methodi therapeutica: nec defuerunt
qui hunc librum coronidem librorum de fra-
cturis vocarunt. Initio autem huius libelli,
humani capitis constitutio sine figura proponi-

tur quadruplex, ossiumque capitis natura & qualitas describitur. Secundò loco ἀπόγνωσις fracturarum cranij demonstratur. Tertiò fracturarum quinque species recensentur, certaque signa & indicia violatae calvariae proponuntur. Harum omnium offensionum curatio postremo loco continetur. Hic liber citra omnem controuersiam Hippocraticus est, inscribitur autem περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων, de vulneribus aut offensionibus capitis. Iones enim πάσας τὰς βλάβας nominant τραύματα, commentario in sententiam. 15. libri secundi de articulis: præterea ex Galeno commentario quinto in librum sextum ἐπίδευ. Sententia duodecima. τραύματα ὀνομάζονται ἢ ποικίλης ἢ ἐξ μεγάλης βλάβας, ἢ ἐκ τίνος τῶν ἐξωθεν γινομένων, εἰς τὸ χεῖρ τραύματος. τραύματα vocat Hippocrates magnas noxas & offensas ab aliquo extrinseco etiam sine vulnere illatas. Ipse tamen Hippocrates sententia 33. libri tertij de fracturis, τραύματα videtur appellare vulnera, quæ fracturis iunguntur, quæ etiam significatione τραύματος nomen hic usurpat, agit enim hoc libro de vulneribus capitis quæ Calvarium offendunt.



Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Π Ε Ρ Ι
 τῆς ἐν κεφαλῇ τραυμάτων.

ΩΝ ἀνθρώπων αἱ κεφαλαὶ οὐδὲν ὁμοίως
 σφίσι αὐταῖς.

*Hippocratis de Vulneribus
 Capitis.*

Hominum capita non sunt inter se
 similia.

Artis medicæ partem diagnosticam
 prius cognoscere conuenit, quam the-
 rapeuticam, si modo medicinam rectè
 velis exercere. Itaque solet Hippocrates ante-
 quam morborum curandorum rationem tra-
 dat, partium in quibus hærent morbi, naturam
 explicare. Cùm ergò curationem τραυμάτων ca-
 pitis sit traditurus, capitis naturam proponit po-
 tissimum in similitudine, in situ futurarum, in
 ossium mollitie, duritie, cavitare, densitate, rari-
 tate, æqualitate, inæqualite. Et primùm de simi-

litudine differens, ait hominum capita non esse inter se similia. Quæ dissimilitudo & varietas non in auribus, oculis, naribus, non in capillis aut caluitio, non in colore, non denique in faciei lineamentis spectanda est, sed potissimum in futuris & ossibus. Causa autem similitudinis aut dissimilitudinis capitum referenda est ad facultatis formatricis robur, aut imbecillitatem, ad materiæ copiam aut penuriam, bonitatem aut vitium, ut docet Galenus in microtechnè.

Οὐδὲ αἱ ῥαφαὶ τῆς κεφαλῆς πάντων ἔχ' ταῦτα πεφύκασιν.

NEc singulorum capitis futuræ eodem modo sunt sitæ.

SVturarum neque certus numerus est, sicut ne locus quidem. Celso libri octavi capite primo: Est autem futura Synarthroseos species quæ definitur, compositio quædam ad confutarum rerum similitudinem facta. Sunt verò in humano capite futuræ quinque, coronalis, recta, lambdoides, & iuxta aures duæ λεπίδοειδῆς, id est squamosæ. Suturarum utilitates quatuor proponit Galenus libro nono de usu partium, ut per eas pateat exitus fuliginosis excrementis, ut crassa meninx ossi capitis alligetur, ut pericranion generetur, ut si quando percussum craniū ruptum fuerit, ne per totum rupturæ eius progrediantur. Rarò verò caluaria solida sine futuris est, locis tamen æstuosius facilius inuenitur, &

id caput firmissimum, atque à dolore tutissimū est, ex cæteris quo futuræ pauciores sunt, eò capitis valetudo commodior est, ait Celsus libri octavi capite primò. Hippocrati tamen libro de locis in homine, ὑγιεινότεροι εἰσὶ τὴν κεφαλὴν, οἱ τὰς πλείονας ραφὰς ἔχοντες, meliori capitis sanitate fruuntur, qui plures habent futuras. Sed Hippocrates iniurias internas considerat, Celsus externas caput lædentes.

Α'λλ' ὅστις μὲν ἔχει ἐκ τῆς ἐμπαροσθεν τῆς κεφαλῆς
 ποροβολὴν, ἡ δὲ ποροβολὴ ἐστὶ, τὸ τῷ ὀφθαλμῷ ἐξέχον
 στρογγύλον παρὰ τὸ ἄλλο, τούτου εἰσὶν αἱ ραφαὶ
 πεφυκῆσαι ἐν τῇ κεφαλῇ, ὡς γραμμα τὸ ταῦτ',
 γράφεται. τὴν μὲν γὰρ βραχυτέρην γραμμὴν
 ἔχει παρὰ τῆς ποροβολῆς ἐπιχάρσιον πεφυκῆσαι.
 τὴν δ' ἐντέρην γραμμὴν ἔχει διὰ μέσης τῆς κεφα-
 λῆς κατὰ μῆκος ἐς τὸν τράχηλον αἰεὶ. ὅστις δ' ὀπι-
 σθεν τῆς κεφαλῆς τὴν ποροβολὴν ἔχει, αἱ ραφαὶ
 τὰς πεφύχασιν πάναντία ἢ τῷ παρ' ἐτέρῳ. ἡ μὲν
 γὰρ βραχυτέρη γραμμὴ, παρὰ τῆς ποροβολῆς πέ-
 φυκεν ἐπιχάρσιον. ἡ δὲ μακροτέρη, διὰ μέσης τῆς
 κεφαλῆς πέφυκεν κατὰ μῆκος ἐς τὰ μέτωπον αἰεὶ. ὅς
 τις δὲ καὶ ἀμφοτέρωθεν τῆς κεφαλῆς ποροβολὴν
 ἔχει, ἐκ τῆς ἐμπαροσθεν καὶ τῆς ὀπισθεν, τούτω αἱ
 ραφαὶ εἰσὶν ὁμοίως πεφυκῆσαι ὡς γραμμα τὸ ἦτα,
 Η. γράφεται. πεφύχασι δὲ τῶν γραμμῶν αἱ μὲν
 μακრაὶ παρὰ τῆς ποροβολῆς ἐκαστῆς ἐπιχάρσιον
 πεφυκῆσαι, ἡ δὲ βραχεὶν διὰ μέσης τῆς κεφαλῆς

χτ' μήκος πρὸς ἐκαστέραν τελευτῶσα πλὴν μα-
κρὴν γραμμὴν. ὅστις μὲν ἑτέρωθεν μηδεμίαν
παραβολὴν ἔχει, ὅσος ἔχει τὰς ῥαφὰς τῆς κεφα-
λῆς ὡς γράμμα τὸ χ, X γράφεται. πεφύκασι δὲ
αἱ γραμμαὶ, ἢ μὲν ἑτέρη, ἐπιχρῶσιν πρὸς τὸν κρότα-
φον ἀφίκουσα, ἢ δὲ ἑτέρη, χτ' μήκος διὰ μέσης τῆς
κεφαλῆς.

S Ed quisquis in anteriore capitis par-
te eminentiam obtinet, est autem
eminentia, id offis quod præ alio rotun-
dum supereminet, huius in capite futuræ
sunt, qualis litera T. depingitur: habet
enim breuiorem lineam sitam tranuer-
sam in eminentia, alteram verò lineam
habet productam per medium caput in
longum ad ceruicem usque. Cui verò in
posteriore parte capitis eminentia exi-
stir, huic futuræ cōtrario modò sitæ sunt,
atque priori, nam breuior linea ad emi-
nentiam fertur transfuersa, longior verò
per mediū caput ad frontem usque sem-
per procedit. Quicumque verò vtrâque
capitis parte antica nempe & postica e-
minentiam habet, huic futuræ eo modò
collocatæ sunt, quo H. Litera formari
solet. Longiores enim lineæ in vtrâque
eminentia transfuersæ sunt, breuior verò

per medium caput in longum ducta, ad vtrámque longiorem lineam terminatur. Quicumque verò neutra capitis parte prominentiam habet, hic sane futuras capitis habet, quemadmodum litera X pingitur, atque huic lineæ sic sunt collocatæ, vt altera per tempus transuersa tendat, altera verò per medium caput in longum.

PRo capitis figura, suturarum numerus & locus variat, ait Galenus libello de ossibus. Hippocrates autem quatuor humani capitis figuras describit, quarum duæ primæ sunt præter naturam, in vna enim nulla est prominentia occipitij, tuncque remanent duæ suturæ, coronalis & recta, perit autem lambdoides: in altera verò nulla est circa frontem projectura, tuncque remanent duæ suturæ, lambdoides & recta, perit autem coronalis, & hæ duæ figuræ suturis suis referunt litteram T. Tertia figura naturalis est, propria enim & naturalis capitis figura similis est sphaeræ rotundæ. Sed quæ manibus sit vtrínque paulatim depressa, habet enim anteriorem & posteriorem partem prominentem, & vtrúmque latus leuiter depressum, & in hac forma & constitutione capitis remanent tres suturæ, coronalis recta & lambdoides, fitque trium suturarum figura similis literæ H. Quarta capitis figura est, cum vtráque prominentia deperditur, quæ naturali est contraria, tuncque suturæ similes sunt literæ X. est que caput verè rotundum

& sphaericum. Potest etiam cogitari quinta capitis figura, si caput ad utramque aurem fieret prominentius, quam in fronte & occipitio, in qua longitudo naturalis capitis in latitudinem esset transmutata, sed forma capitis eiusmodi fieri non potest, ob eamque causam Hippocrates quatuor omnino figuras, & cuiusque futuras astruxit, nusquam in suis commentariis quintæ capitis figuræ mentionem faciens, ait Galenus lib. 9. de usu partium cap. 17.

Δίπλοον δ' ὅτι τὸ ὅτερον χατὰ μέσσην τὴν κεφαλὴν, σκληρότατον δὲ καὶ πυκνότερον αὐτοῦ πέφυκεν τὸ ἀνώτατον, ἢ ὁμοχρόνι τοῦ ὅτερου ὑπὸ τῇ σαρκί, καὶ τὸ χατώτατον τὸ πρὸς τῇ μήνιγι ἢ ὁμοχρόνι τοῦ ὅτερου ἢ χατὰ: Σποχωρέον δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνωτάτου ὅτερου καὶ τοῦ χατώτατου, ἀπὸ τῶν σκληροτάτων καὶ πυκνοτάτων ὅτι τὸ μαλθακώτερον καὶ ἥσσον πυκνὸν καὶ ὅτι κοιλότερον ἐς τὴν διπλόην: ἢ δὲ διπλὴν κοιλότατον καὶ μαλθακώτατον καὶ μάλιστα σπαραγγῶδες ὅτιν: ἔστι δὲ καὶ πᾶν τὸ ὅτερον τῆς κεφαλῆς πλεονέκτημα ὀλίγου τὸ ἀνωτάτου καὶ χατώτατου, ἀπὸ γὰρ ὁμοιον: καὶ ἔχει τὸ ὅτερον ἐν ἑαυτῷ ὁμοία σαρκία πολλὰ καὶ ὑγρὰ, καὶ εἴ τις αὐτὰ διατριβοῖ τοῖσι δακτύλοισιν, αἷμα αὖν διαγίνοιτο ἐξ αὐτῶν: ἐν δὲ ἐν τῷ ὅτερου καὶ φλεβία λεπτότερα καὶ κοιλότερα αἵματος πλεονέκτημα: σκληρότητι μὲν καὶ μαλθακότητι καὶ κοιλότητι ὡς ἔχει.

DVplex autem est os in medio capite, eiusque durissimum ac densissimum est supremum, & infimum ad meningem, æquale vero & læue foris sub carne, & intus ad cerebri membranam. Quod verò recedit à supremo & infimo, à durissimis & densissimis ad mollius, id minus densum est, & magis cauum ad diploem: est eutem diploe maxime caua, mollissima maximèque cauernosa: vniuersumque capitis os spongijs est assimilè, excepta summa superficie & ima, habetque os intra se similes multas carunculas & humiditas, quas si quis digitis attriuerit, ex ipsis sanguis exprimitur. Sunt autem venulæ tenues & cauæ in ipso osse sanguinis plenæ. Atque in duritie mollitie ac cavitare sic se habet.

Naturam ossium capitis ostendit, quæ dissimilibus partibus constant in densitate, duritie mollitie, raritate, cavitare læuitate & asperitate. Cū os in medio capite duplex dicit, caluariam duplicem denotat, & duabus squamis constare, cuius vtraque superficies læuis est, dura ac densa, interior vero pars mollis, rara & caua est, inter quam discurrent venæ, quæ ossi alimentum subministrant. Quidam ad vtrumque os bregmatis siue sincipitis referre malunt, quoniam inter ossa capitis hoc præcipue duabus cō-

stat squamis siue laminis, ad contactum tamen temporalium solidum est, & ad os frontis tenuius, quam ad os occipitis. Non solum autem vtrumque os sincipitis duplex est, sed omnia prope cranij ossa, potissimumque os frontis, hoc enim os in suprema oculorum regione, quam totam constituit, tenuissimum, tamen duabus squamis coagmentatum, ad supercilia & nares cauum, aëre plenum, ad concursum obelææ suturæ cum coronali mollissimum & rarissimum, seu totius corporis infumibulum, vt etiam pueris mandentibus & respirantibus diu mobile appareat, vt proxima bregmatum portio concretu tardissima. Sunt vero bregmati ossa rara & cauernosa, quia maxima vaporum vis ex toto corpore sursum ad illa fertur vt quæ loco celsissimo sint cõstituta ab eamq; causam multiplicem ipsis vacuationem per ea natura cõparauit, circa finē vndecimi libri de vsu partium. Cur verò craniū, & potissimum os superius factū sit cauernosum, cum suturæ propter ipsarum multitudinem & magnitudinem, nihil alieno auxilio ad transpirationem indigeant, docet Galenus secundo capite libri noni de vsu partium, si enim densum ac tenue capitis os superius natura fecisset, vulnera capitis ad cerebrum facile penetrarēt propter viæ breuitatem, si vero densum ac crassum oneri animali fuisset, itaque reliquum adhuc erat tertiu, vt crassum & raru & cauernosum esset. Hunc locum Hippocratis sic expressit Celsus libri octaui capite primo, Caluaria vtrinque læuis est, & qua cerebri mēbranā contegit, & qua cutē capillum gignente contegitur, eaque simplex ab

occipitio & temporibus, duplex vsque in verticē à fronte est, ossaque eius ab exterioribus dura ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt, interque ea venæ discurrunt, quas his alimentum subministrare credibile est. Hic locus Celsi demonstrat nihil esse irreptitum, illudque ἡ ὁμοχρσίη τοῦ ὀστέου ἑσπέρ' τῇ στερκί, & ἡ ὁμοχρσίη τοῦ ὀστέου ἡ καίτω, non esse delendum, cum ipse ad verbum interpretetur. Galenus hanc utramque ὁμοχρσίην vocat libro non de vsu partium λῶαν κερπίου πῶν ἐκαστέρωθεν ἐπιφάνειαν, leuem utrinque cranij superficiem. Nullum etiam glossema additum animaduertet is, qui sciet Hippocratem hoc libro, ut & libris de fracturis, plena & copiosa explicandi ratione uti κατὰ διέξοδον, ut docet Galenus commentario primo in librum primum de fracturis, cum ea docendi ratio ad perspicuitatem sit maxime accommodata.

Παχύτητι δὲ καὶ λεπύτητι οὕτως συμπάσης τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον λεπύτατόν ἐστιν, καὶ ἀσθενέστατον τὸ χεῖρ βρέγμα, καὶ σάρκα ὀλιγίστη καὶ λεπυτάτην ἔχει ἐφ' ἑαυτῷ ταύτη τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον, καὶ ὁ ἐγκέφαλος χεῖρ τοῦτο τῆς κεφαλῆς πλεῖστος ὑπερί: καὶ διότι οὕτω ταῦτα ἔχει, πῶν τε βρώσιων καὶ πῶν βελέων ἴσων τε ἔοντων χεῖρ μεγάλος καὶ ἐλασσόνων, καὶ ὁμοίως τε βρωθεὶς καὶ κοσόν, τὸ ὀστέον ταύτη τῆς κεφαλῆς φλάται τε μᾶλλον καὶ ῥήγνυται, καὶ ἔσω ἡσφλάται, καὶ θανασιμώτερά ἐστιν, καὶ χαλεπώτερά ἡπτερέα, τε καὶ ἐκφυγῆσαι τὸν θάνατον ταύτη ἢ πῶν ἄλλοι τῆς

De vulneribus capitis. 301

κεφαλῆς, ἐξίσων τὲ ἔοντων τραυμάτων, καὶ ὁμοίως
τὲ τραυτὴς καὶ ἥσων ἀποθήσκει ἄνθρωπος ὅταν καὶ
ἄλλως μέλλῃ ἀποθανεῖσθαι ἐκ τοῦ τραύματος, ἐν
ἐλάσσονι χρόνῳ ὅταν τὴν ἔχον τὸ τραῦμα τῆς κεφα-
λῆς ἢ πῶς ἄλλοθι: ὁ γὰρ ἐγκέφαλος ἄχρηστος καὶ
μάστιγας καὶ τὸ βρέγμα ἀισθάνεται πῶς κακῶν
τῶν γινομένων ἐν τῇ σαρκὶ καὶ τῷ ὅστέῳ: ὑπὸ
λεπτοτάτῳ γὰρ ὅστέῳ ὅτι τὴν ἔχον τὸ ἐγκέφαλος καὶ
ὀλίγη σὰρξ: καὶ ὁ πλεῖστος ἐγκέφαλος ὑπὸ τῷ
βρέγματι κεῖται.

IN crassitie & tenuitate sic. Vniuersæ
caluariæ tenuissimum & infirmissi-
mum est os sincipitis, carnēque paucis-
sima & tenuissima contextum, hacque
capitis parte plurimum subest cerebrum
proptereaque cū hæc ita se habeant, si
vulnera & tela paria sint siue minora,
tūm si quis similiter læsus sit aut minus,
os hac capitis parte magis colliditur &
finditur & effringitur, suntque funestio-
ra, & ad curandum, & ad mortis peri-
culū euitandum difficiliora vulnera hîc,
quàm alia qualibet capitis parte. Si quis
enim similiter percussus sit, aut minus,
ex æqualibus offensionibus moritur ho-
mo, cū alioquin ex vulnere sit moritu-
rus, breuiore tempore, qui hac capitis

parte vulnus accepit, quàm aliâ qualibet. Nam cerebrum iuxta sinciput ceterimè & maximè sentit ea mala, quæ cum in carne, fiunt tum in osse. Continetur enim cerebrum hac parte, sub osse tenuissimo, modicâque carne, plurimùmque cerebrum sub sincipite latet.

Ossa bregmatis cur rara & cauernosa sint iam diximus, tenuissima verò & infirmissima non frustra natura machinata est, cum enim capiti desuper incumbant, cumque duris & densis ossibus vndique circumdata sint, lapsibus, plagis aut alijs offensionibus externis non admodum erant obnoxia, neque enim facilè quis in verticem ceciderit, aut ea parte vulnus promptè acceperit, reliqua vero ossa tum occipitis tum frontis, tum etiam aurium vulnera sæpe numero erant exceptura, & lapsibus frequenter offendenda, ideòque dura & densa extiterunt 19. capite libri vndecimi de vsu partium. Non immerito autem dicit Hippocrates sub ossibus bregmatis copiosum latere cerebrum, nam cerebellum occipitis osse concluditur, Cerebrum autem cerebello decuplo fere maius, sub ossibus bregmatis & osse frontis totum continetur. Homo autè plurimum habet cerebri proportionè magnitudinis, Aristoteli libro primo de historia animalium, nec immerito, cum plurimarum facultatum sit sedes. Cæterum illud, καὶ ὁ μολὼς τὸ πᾶν

πρωθεὶς καὶ ἴσον, bis hīc repetitum, priore loco videtur σολοικοφανὲς εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ λόγου, & loquendi forma solæcismi suspicione non carens, est tamen Ionismus Hippocrati familiaris, apud quem rectus cassus absolutè ponitur, ut in hoc libro sæpius, & aphorismo 56. libri 7. & sæpe apud Homerum ut *ιλιάδ. γ. ἀμφὼ δ' ἐζομένω, προῖκμοισιν δ' ἐζομένοισιν.*

Τῶν δὲ ἄλλων τὸ χεῖρ τοὺς κροτάφους ἀσθενέστατον ὅστιν : συμβολὴ τε γὰρ τῆς κείτω γνάθου πρὸς τὸ κρανίον, καὶ κινήσεις ὅστιν ἐν τῷ κροτάφῳ ἄνω καὶ κείτω ὡς περ ἀρθρου: καὶ ἡ ἀκοὴ πλησίον γίνεται αὐτοῦ, καὶ φλέψ διὰ τοῦ κροτάφου πέταται κοίλῃ τε καὶ ἰσχυρή.

R Eliquorum vero ossium infirmissimum illud est quod secundum tempora iacet. Connexio enim maxillæ inferioris cum cranio, nec non motus sursum ac deorsum tanquam articuli fit in ipsis temporibus, meatus etiam auditorius in vicino est positus, tum etiam vena caua robustaque per utrumque tempus protenditur.

O S temporale quandoque totum os, quod ad aures est, significat, aliquando eius partem, ut hoc loco. Hoc enim os, ut ait Galenus libello de ossibus, *πλυσθενὲς & multi-forme est,*

continet enim tres partes, vna *αὐτοειδής* vocatur quæ inferior est præruptæ rupi & duritie & imagine similis, in qua est apophysis *εὐλοειδής*, & ea quæ meatus auditorium continet. Altera eius pars est propè ecphysim *μαστοειδῆ*, & eam quæ zygomatis portionem constituit, tertia pars est secundum tempora, versus ossa bregmatis, quæ postremam partem hîc Hippocrates infirmissimam dicit, cuius debilitatis triplex ponitur causa, prima connexio genæ inferioris cum cranio, maxillæ enim pars quæ sursum ad caput vergit, in duos fines terminatur, quorum acutus tendonem à temporali musculo descendente recipit, alter vero rotundus in cavitatem ossis capitis *γλινχοειδῆ* recipitur per *ἀρθρωδία*, sub meatu auditorio ad zygomatis radicem. Celsus libri 8. capite primo, hanc connexionem sic exprimit, maxillæ partes extremæ, quasi bicornes sunt. Alter processus intra latior, vertice ipso tenuatur, longiûsque procedens sub esse iugali subit, & super id temporum musculis illigatur. Alter breuior & rotundior, & in eo sinu qui iuxta foramina auris est, cardinis modo fit, ibique huc & illuc se inclinans facultatem motus præstat. Secunda infirmitatis ossis temporalis causa est meatus auditorius in vicîno positus, vbi animaduerte Hippocratem hanc ossis partem à temporali distinguere. Tertia imbecillitatis causa est, non sola carotis arteria, sed etiam vena iugularis externa, & duo rami neruorum à 5. & 6. coniugatione.

Ἰσχυρότερον δ' ὅτι τῆς κεφαλῆς τοῦ ὀστέου
παντὸς τοῦ ὀστέου τῆς κορυφῆς καὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ἢ πᾶν
τὸ πρῶτον, καὶ σάρκα πλεονα καὶ βαθύτεριον ἐφ'
αὐτῷ ἔχει τοῦτο τοῦ ὀστέου.

EX omnibus calvariae ossibus robu-
stius est os verticis & aurium, quā
omne quod in anteriorem partem spe-
ctat, carnemque copiosiore & profun-
diorem in se continet hoc ipsum os.

PEr os verticis & aurium intellige os occipi-
tis quod terminatur lambdoide sutura, quæ à
vertice incipiens ad basim usque capitis proten-
ditur, per mediūque lapidosorum ossiū & diar-
throseos, qua caput primò spondylo adnectitur
deorsum fertur, eaque, ut ait Celsus li. 8. cap. 1. ad
aures per verticem tendens, occipitium à sum-
mò capite diducit, huncque Hippocratis locum
sic vertit ibidem Celsus, crassissimum in capite
os post aurem est. Itaque fallitur Fallopius, qui
putat Hippocratem hic abuti nomine κορυφῆς,
& per verticem non intelligere superiorem ca-
pitis partem, sed posteriorem, quæ in brutis ve-
re vertex est. Hoc autem loco, os verticis & au-
rium, est illud os, quod est inter verticem & au-
res. Est vero occipitium robustius osse tempora-
li & sincipite, quia crassius, & pleniore carne,
cutēque crassiore contegitur.

Καὶ δὴ τούτων οὗτος ἐχόντων, ἑαυτὸν τὲ πᾶν
 πρῶτον καὶ τῶν βελέων ἴσων ἀπάντων καὶ ὁμοίων καὶ
 μείζονων καὶ μείονων ὁμοίως πτερωσκόμενος, καὶ
 μᾶλλον, ταύτη τῆς κεφαλῆς τὸ ὅσον ἥσον ῥη-
 γνυται καὶ φλάται καὶ ἢν μέλλη ἄνθρωπος ἀποθ-
 νῆσκειν καὶ ἄλλως ἐκ τοῦ πτεώματος, ἐν τῷ ὅπισ-
 θεν τῆς κεφαλῆς ἔχων τὸ πτεῶμα, ἐν πλείονι χερό-
 νω ἀποθανεῖται: ἐν πλείονι γὰρ χερόν τὸ ὅσον
 ἐμπύσκειται τὲ καὶ διαπύσκειται κατὰ ὅππότερ
 ἐγκέφαλον, διὰ τὴν παχύτητα τοῦ ὅσπου: καὶ ἐ-
 λείπονται ταύτη τῆς κεφαλῆς ὁ ἐγκέφαλος ὑπε-
 ρεὶ καὶ πλείονες ἐκφυγάουσι τὸν θάνατον τῶν ὀπισ-
 θεν πτεωσκομένων τῆς κεφαλῆς ὡς ὅππότερ τὸ πολὺ,
 ἢ τῶν ἐμωροθῶν.

QUæ cum ita se habeant, si quis si-
 militèr sauciatus sit aut magis ab of-
 fensionibus & telis paribus omnibus &
 similibus, maioribus & minoribus, hac
 capitis parte os minus finditur & colli-
 ditur, sique sit alioquin homo ex hoc vul-
 nere moriturus, qui parte capitis postè-
 ca vulnus accepit, tardius morietur, in
 longiore enim tempore os suppurat, prò-
 que transfundit deorsum ad cerebrum,
 propter ossis crassitudinem, paucùmque
 hac capitis parte subest cerebrum: ac

plures ex ijs qui parte capitis postica vulnerantur plerúmque mortem effugiunt quam ex his qui in antica.

IN omnibus quæ ad medicinam pertinent, quod secundum naturam est, medicus sibi tanquam scopum proponere debet, quod qui non facit, nec morbos cognoscere, nec prædicere, nec illos recte curare potest. Itaque Hippocratis capitis humani naturali constitutione proposita, ossiumque cranij natura declarata, qualis sit *περίγνωσις* tromatum capitis demonstrat. Docet autem primum magis lethalia esse vulnera in aulica caluariæ parte, quàm in postica, quod occipitis os sit crassissimum, nec facile suppuret, quodque sub occipitio paucum subsit cerebrum. Quomodo autem os fiat puculentum postea docebit Hippocrates. Cæterum tela dicuntur paria quæ sunt eiusdem magnitudinis aut gravitatis, similia, quæ sunt eiusdem formæ aut figuræ, ut acuta obtusa, rotunda, plana.

Καὶ ἐν χειμῶνι πλέονα χρόνον ἔη ἄνθρωπος ἢ ἐν ἔρεει, ὅστις καὶ ἄλλως μέλει ἀποθανεῖσθαι ἐκ τοῦ τραύματος, ὅπου οὖν τῆς κεφαλῆς ἔχον τὸ τραῦμα.

HOMO alioquin ex vulnere moriturus diutius vitam producet hyeme, quam æstate, quacúmque tandem capitis parte vulnus acceperit.

HYEME minus pernicioſa & funeſta dicie capitis vulnera, quā æſtate, quoniam Hyeme calidum natiuum copioſius eſt & robuſtius in capite, & cavitatibus omnibus noſtri coporis, per aphoriſmum 15. lib. 1. ventres Hyeme natura calidiſſimi. Cur autem Hyeme intenſior ſit calor naturalis, docet Galenus ex Ariſtotele: propter enim externum frigus refugit & vires colligit vt externo frigori reſiſtat, contra æſtate calor naturalis ad calorem externum ſibi fere ſimilem & affinem protenditur, ſicquē diſſoluitur & diſſipatur natiui caloris ſubſtantia æſtate, quę continetur, cohibetur & augetur Hyeme. Vel etiam capitis tromata ſunt æſtate magis lethalia, quam Hyeme, quod æſtas putredinis & corruptionis ſit effectrix cauſa, quæ vulnera reddit funeſta, putreſcit enim vnumquodque ab externo calore, vt natiuo concoquitur. Cū vero æſtate calor natiuus per raram ſolutamque carnem foras euadat, externus tunc præualeat calor humoresque interni difficilius coquantur, ex quo fit, vt quæuis æſtate putredinem ſentiant, per Hyemem vero quia calor ille natiuus ac domesticus dominatur, huic tempus hoc minime creare putredinem poteſt problemate 33. ſectionis 3. Ariſt.

Huic prognosico aduerſari videntur, quæ ſcribuntur aphoriſmo 18. lib. 5. frigidum inimicum offibus, dentibus, neruis, cerebro, ſpinali, medullæ, calidum vero amicum, & aphor. 20. eiſdem libri frigidū vlceribus mordax, & aphor. 22. ibidem. Calidum offium fracturis plurimum conferre, ſed nudis præcipue, maximèque eorum

qui in capite vlcera habent. Sed dic Hippocratem his aphorismis intelligere aquam calidam vel frigidam, vt constat ex commentario aphorismi 24. ibidem. Non posse vero referri ad constitutionem temporis calidam & frigidam docet sententia libri de vulneribus Hippocratis, Plurisque vlceribus tempus calidius commodius est Hyeme, exceptis his quæ in capite sunt ac ventre.

Sumuntur prognostica non solum ex anni partibus, sed etiam ex regionibus, vt Bardigalæ vlcera capitis facile & cito curantur: crurum & tiliarum difficilius ac serius, quod contra euenit Tolosæ. Nonne quod Bardigala locus est palustris, corporaque impura sunt, & humoribus crassis & terrestribus repleta. Omne autem graue & terrestre tendit deorsum, ergo vlcera superiora concoctioni sunt opportuniore, quoniam humor ad ima delabitur, inferiora autem multis excrementis redundant, & putredini magis patent. Vide problema 18. lib. 1. & problema 6. lib. 14. Aristot. Tolosæ contra cum Auster sit familiaris & frequens, capita hominum excrementis scatent, & grauantur. Est enim *voros* *gnaenos* aphorismo 5. lib. 3. Hinc fit vt tiliarum vlcera non magno negotio curentur, capitis vero tromata difficilem curationem habeant.

Fractura Caluariæ in plenilunio verenda est, ait Guido, cuius rei rationem reddit Alexander Aphrodisieus problemate 64. lib. 1. Quoniam aer orbe lunæ completo calidus reddi solet & humidus, quæ quidem qualitates putredinem contrahunt, ita enim natura sancitum est, vt si

calor & humor modice adsint, concoctionem efficiant, si humor paulo exuperet calorem, putredinem moueat, si nimium, extinctionem committeret, si calor valde humorem vincit, deustionem adduci necesse esset. Vel in pleni lunio symptomata superueniunt perniciofa: quia luna tunc omnem auget humiditatem in æstu maris, in ostreis, in medullis ossium, & in cerebro. Nam vt scriptum est in epistola, quæ Hippocrati ad Mæcenatem falso tribuitur, ipsum mare per lunam augere & minui scitis: cerebrum etiam hominum augentur crescente Luna, cum autem diminuitur Luna, vnaquæque res diminutionem sentit.

Αἱ δὲ ἔσθραι τῶν βελέων τῶν ὀξέων καὶ κοφωτέρων, αὐταὶ ὅπῃ σφῶν αὐτῶν γινόμεναι ἐν τῷ ὀστέῳ ἀνευ ῥωγμῆς τε καὶ φλάσιος, καὶ ἔστω ἔσφλάσιος, αὐταὶ δὲ γίνονται ὁμοίως ἐν τε τῷ ἔμπεροσθεν τῆς κεφαλῆς, καὶ ἐν τῷ ὀπίσθεν ἐκ τούτων θάνατος οὐ γίνεται κατὰ γὰρ δίκην, οὐ δὲ ἦν γένηται.

SEdes vero telorum acutorum & leuium per se existunt in osse sine fissura, collisione & effractura, ipsæque similiter fiunt in parte capitis anteriore atque posteriore. Ex his mors æquè non euenit, etiam si alioquin eueniat.

Prognostica etiam desumuntur ex differentiis vulnerum, sic quamvis sedes siue teli vestigium in partem anteriorem & posteriorem capitis, sine fissura, contusione aut effractura cadere possit, cum omnium ossium capitis æqualis sit in superficie externa durities, tamē propter totius ossis crassitudinem maiorem aut minorem difficilius alia finduntur, colliduntur aut effringuntur, vnde non est æquum & consentaneum, vt sedes in omnibus ossibus sit æqualiter funesta neque per se neque ex euentu. Cum alia ossa magis resistent in aliis partibus. minùsque findantur, collidantur aut effringantur, plurimùmque aut minimum habeant subiectum cerebrum. Cum ergo sedes simplex facta a telo acuto & leui fuerit in parte anteriore & posteriore capitis, similis & æqualis, si perniciofa & lethalis sit, maturius mortem afferet in anteriore parte, serius in posteriore. Hæc autem apertissime dicuntur; nec video quid monstri lateat in hac lectione, quam idcirco integram retinendam censui illud tamen, *πὰν νεῦρα ἀγρῆς*, quod in exemplari Aldino legitur delendum putavi, & retinui quod in Pariensi scribitur, *ἀνευ ραγμῆς*.

Ῥὰφῇ δὲ οὐ ἔλκει φανέισα ὅτε οὐ φιλοφέντος, πανταχοῦ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἔλκεος γενομένου, ἀσθενέστατον γίνεται τῇ τρώσει καὶ τῷ βέλκει ἀντέχειν, εἰ τυχοῖ τὸ βέλος ἐς αὐτὴν τὴν ραφὴν φησὶ γένει πάντων δὲ μάλιστα ἦν τὸ βέλος οὐ τῷ βρέγματι γινόμενον καὶ τὸ ἀσθενέστατον τῆς

κεφαλῆς, καὶ αἱ ῥαφαὶ εἰ τύχοιεν οὕτως περὶ τὸ
 ἄλκος, καὶ τὸ βέλος αὐτέων τύχοι τῶν ῥαφῶν.

SVtura vero in vulnere si appareat osse
 nudato, quacúmque tandem capitis
 parte vulnus fuerit, infirmissima est ad
 resistendum ictui & telo, si contigerit
 telum ipsum hære in futuram, ma-
 ximè verò si telum in sincipite sit, iux-
 ta infirmissimam capitis partem, sint-
 que circa vulnus future, aut futuras ipsas
 telum attigerit.

Vulnera capitis quæ futuris impacta sunt,
 perniciosa esse solent, quoniam futura in-
 firmæ sunt ad resistendum, & potissimum futura
 bregmatis. Hoc autem verum esse observavit
 Hippocrates. §. epidemiorum in historia Auto-
 nomi qui ex capitis vulnere mortuus est die de-
 cima sexta, in media æstate lapide ex manu ic-
 tus, in futuras in medio sincipite, quare non ani-
 madverti, inquit Hippocrates, eum sectione in-
 digere, deceperunt enim me futura habentes
 in seipsis iaculi læsionem, postea enim conspi-
 cum id fiebat. Primum quidem ad claviculam,
 postea ad latus dolor vehemens valde, & con-
 vulsio ad ambas manus venit. In medio enim ca-
 pitis ac sincipitis vulnus habebat. Sectus est au-
 tem die decima quinta, & pus prodiit non mul-
 tum, membrana vero cerebri ἀσκή & mini-
 me putrefacta apparebat. Hanc erroris con-

ſeſſionem in Hippocrate laudat Celfus lib. 8. cap. 4. à ſuturis ſe deceptum eſſe Hippocrates memoriae prodidit, more ſcilicet magnorum virorum, & fiduciam magnarum rerum habentiũ. Nam leuia ingenia, quia nihil habent, nihil ſibi detrahunt: magno ingenio, multaſue nihilo minus habituro, conuenit etiam ſimplex veri erroris confeſſio, præcipuè que in eo miniſterio, quod vtilitatis cauſſa poſteris traditur, neque decipiantur eadem ratione, qua quis ante deceptus eſt. Sic Hippocrates ἀμαρτήματα ſua faciebat aliorum μαρθήματα.

Τι τῶσπετα δὲ ὁστέον τὸ ἐν κεφαλῇ τοσούτῳ δὲ
τρόποις. τῷ δὲ τῶπων ἐκάστου πλείονες ἰδέαι
γίνονται τῷ κατ' ἡγήματος ἐν τῇ τῶσει. ὁστέον ῥή-
γνυται πτεωσκόμενον, καὶ τῷ πτεώχειν ὁστέον τιμῶ
ῥωγμῶν ἀνάγκη φλάσιν πτεωγένεσθαι ἢ πτεω-
γῆ. τῷ γὰρ βαλέων ὅτι πτεω ῥήγνυσι τὸ ὁστέον, τὸ
αὐτὸ τῷ καὶ φλά τὸ ὁστέον ἢ μᾶλλον ἢ ἥσσον, αὐτὸ
τὸ ἐν ὡς καὶ ῥήγνυσι τιμῶ ῥωγμῶν. εἰς ὅτος τῶ-
πος. ἰδέαι δὲ ῥωγμῶν παντοῖαι γίνονται. καὶ γὰρ
λεπτότερά τε καὶ λεπτά πάντῃ, ὥστε ὁ καταφανέες
γίνονται, ὅτε αὐτίκα μετὰ τιμῶ τῶσιν, ὅτ' ἐν
τῇσιν ἡμέρησιν, ἐν ἥσιν αὖ καὶ πόνων ὄφελος γένοιτο
τῷ θανάτῳ τῷ ἀνθρώπῳ. αἱ δ' αὖ παχύτερά τε καὶ
εὐρύτεραι γίνονται τῷ ῥωγμῶν. ἐνιαυτὸ καὶ πάντῃ
εὐρέαι. καὶ αἱ μὲν ἐπὶ μακρότερον ῥήγνυνται. αἱ δὲ
ἐπὶ βραχύτερον. καὶ αἱ μὲν, ἰσχυτέραι, αἱ δὲ ἰσχυαί τε
καὶ πάντῃ, αἱ δὲ χαμψυλώτερά τε καὶ πάντῃ χαμ-

πύλαι, καὶ βαθυτέρα, αἱ δὲ εἰς τὸ χεῖρα, καὶ διὰ
πάντος ὁ ὅσπου.

S Auciatur os capitis tot modis : ho-
rum autem modorum plures sunt
ideæ fracturarum in vulnere. Os faciatū
finditur, atque ossi fissuram continenti,
necesse est contusionem accedere, siqui-
dem fissum sit. Quodcūque enim te-
lum os findit, Idem ipsum contundit os
magis aut minùs, ipsum videlicet in quo
fissuram facit. Atque hic vnus est mo-
dus. Variæ autem fissurarum ideæ, quæ-
dam enim sunt tenuiores, & ita omnino
tenues, vt non sint aspectabiles, neque
statim post ictum, neque ijs diebus qui-
bus contra mortem, laborum auxilium
homini posset afferri. Aliæ rursus fissu-
ræ crassiores sunt & latiores, nonnullæ
etiam latissimæ, & aliæ longiores, aliæ
breuiiores sunt: quædam rectiores, quæ-
dam rectissimæ, quædam magis curuæ,
quædam omnino inflexæ, quædam sunt
profundiores, quædam ad imum ferun-
tur & per totum os.

Tertia est huius libri pars de generibus fra-
cturarum caluariæ, quæ cum facilis sit, nō
longa videtur egere explicatione, Hippocrates

autem enumerat quinque species fracturarum, ρωγμὴ, rimam: siue fissuram, θλάσιν, contusionem, ἰσπλασιν. effracturam, ἰδραν, sedem siue telli vestigium. ἀπόχημα siue ἀπύχημα. quasi resonitum, vel ab Echo responsionem. Galenus 6. methodi medendi, capite ultimo constituit tantum tres, ρωγμὴν θλάσιν, ἰδραν, fissuram, contusionem & sedem. Paulus lib. 6. cap. 90. recenset fracturæ capitis quinque species, ρωγμὴν. fissuram, ἐκκοπὴν excisionem, ἐγγείσσωμα, quod à Galeno lib. 6. methodi dicitur ἐγγείσσωμα, corporum appropinquationem, ἐκπίσσωμα effractionem, & καμάρωσιν, siue ut ait Galenus, καμάρωμα camerationē aut testitudinationē. θλάσιν verò & ἀπύχημα nō admittit inter caluariæ fracturas. Galenus simplicium fracturarum tantum meminit. Hippocrates perspicuitatis causa addit ἰσπλασιν ἢ ἀπόχημα. Paulus verò ideas & singulares species enumerat. Idem tamen Galenus libro de definitionibus medicis octo differentias fracturarum capitis recēset, nempe ρωγμὴν, ἐκκοπὴν, ἐγγείσσωμα, ἐκπίσσωμα καμάρωσιν, ἀποσκέπασιν, θλάσμα, ἀπύχημα, quarum omnium definitiones ibidem proponuntur: ρωγμὴν verò prima capitis fracturæ differentia definitur à Paulo diuisio caluariæ superficialis aut profunda, in qua os læsum nequaquam foras emouetur. Cuius hic plures proponuntur ideæ, omnes tamen sine nomine, vna à Paulo ρωγμὴ τεύχεος id est rima capillaris dicitur, quæ arctissima est, sensum plerumque fallens, eoque latens, quæ quia non facile se ostendit, mortis causam sæpè affert.

Φλασθείη δ' αὖ τὸ ὀστέον ἐν τῇ ἑαυτοῦ φύσει, καὶ
 ῥωγμὴ τῇ φλάσει ἔκ αὖ παρογενέοιτο τῷ ὀστέῳ
 ἑδεμία. δεύτερος ἔστος. ἰδέσθαι δὲ τῆς φλάσιος
 πλείους γίνονται. καὶ γὰρ μᾶλλον τὸ καὶ ἥσσον φλά-
 ται, καὶ ἐς βαθυτέρον τὸ καὶ διὰ παντός τῷ ὀστέῳ, καὶ
 ἥσσον ἐς βαθύ, καὶ μὴ διὰ παντός τῷ ὀστέῳ, καὶ ἐπὶ
 πλεον τὸ καὶ ἑλαστον, μήκεος τὸ καὶ πλατύτης.
 ἀλλὰ τῶν τῶν ἰδεῶν ἑδεμία ἐστὶν ἰδόντι τοῖσιν
 ὀφθαλμοῖσιν γινώσκειν, ὅποιός τις ἐστὶ τὴν ἰδέην, καὶ
 ὁπόση τὸ μέγεθος. ἑδὲ γὰρ εἰ πέφλασαι. ἔοντων
 πεφλασμένων καὶ ἑκακῶς γεγενημένου, γίνεται τοῖ-
 σιν ὀφθαλμοῖσι καταφανὲς ἰδεῖν αὐτίκα μετὰ
 τὴν τῶσιν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ῥωγμῶν ἐναιέχας
 εἶδαι καὶ ἐρρωγῆτος τῷ ὀστέῳ.

Contundi potest os in sua natura,
 nullaque fissura contusioni adiun-
 getur in osse. Atque hic est secundus fra-
 cturæ modus. Ideæ verò contusionis
 plures sunt, etenim magis ac minus con-
 tunditur os, estque profundior contusio
 & per totum os, aut minus profunda nec
 per totum os, aut magis minusve in lon-
 gum & latum protenditur. Sed earum
 idearum nulla oculorum sensu percipi
 potest, qualis sit forma aut quanta mag-
 nitudine: neque enim siquid contusum

Est, statim ab ictu sub oculos cadit quod contusum est, nec etiam noxa in osse contracta, quemadmodum nec fissuræ quæ ab osse saucio procul absunt.

S Ecunda fracturæ capitis species contusio est, *θλάσις* siue *θλάσμα* Galeno, Hippocrati vero iuxta Ionum linguam *φλάσις* siue *φλάσμα*, per *φ*, quod ab alijs per *θ* dicitur: est autem hoc nomen, etiam commune solutioni musculorum & carnis: *θλάσις* enim siue *θλάσμα* dicitur soluta in carne & musculo continuitas, cum graue & durum aliquid decidit in corpus, quod carnem abruptit & atterit: *θλάσις* autem hoc loco est ossis caluariæ in interiorē partem impulsio & inflexio, veluti in plumbeis & æneis vasis videre licet, si foris illidantur. Paulus autem lib. 6. capite 90. contusionem negat esse fracturam aut cranij diuisionem, cum in ea sit tantum ossis concavitas, integra caluariæ continuitate. Huius contusionis plures sunt differentiæ, nam aliæ sunt maiores, aliæ minores, aliæ longiores, aliæ latiores, duæ verò sunt differentiæ maximè obseruandæ, vel enim os per totum contunditur, vt membrana cerebri à Caluaria penitus abscedat, vel omnino ab eadem Caluaria prematur, aut os ipsum non per totum contunditur, sed iuxta exteriorem duntaxat superficiē vsque ad diploem. Contusiones autem cadunt potissimum in ossa puerorum, quæ tenuia sunt & cerea: oportet enim in se cogi quod contunditur, sicque molle esse debet, nec omnino durum: possunt etiam

cadere in ossa bregmatis, propter diploem, quæ antea maximè cauam, mollissimam & fistulosam nominauit. Statim verò postictum, oculis non deprehenditur quod contusum est, nec vitium etiam in osse contractum, sed paucis post diebus immutato colore & caractere ossis collisi, & putrefacta carne, qua os vestitur. Fissuræ etiam quæ procul absunt ab osse saucio, sub oculos nō cadunt, potissimum illæ quæ consistunt in alia ossis parte, quam quæ vulnus accepit.

Ἐσφλάται τὸ ὀστέον ἐκ τῆς φύσεως τῆς ἐαυτοῦ ἔσω σὺν ῥωγμῶσιν· ἄλλως γὰρ ἂν ἐσφλαθεῖν. τὸ γὰρ ἐσφλάμενον, ὁπερ ῥηγνύμενόν τε καὶ καταγνύμενον, ἐσφλάται ἔσω· ὁπότε δ' ἄλλες ὀστέες μένιντος ἐν τῇ φύσει τῇ ἐαυτοῦ. καὶ δὴ οὕτω ῥωγμὴ ἀνωρεθεῖν τῇ ἐσφλάσει. τρίτος αὖτος τρόπος· ἐσφληται δὲ τὸ ὀστέον πολλὰς ἰδέας. καὶ γὰρ ἐπιπλέον ὁ ὀστέος καὶ ἐπ' ἐλαστον, καὶ μᾶλλον τε καὶ ἐς βαθυτερον χεῖτω, καὶ ἥσων τε καὶ ἐπιπολαιότερον.

Effringitur autem os, & è naturali suo loco intro cedit cum fissuris, alioquin non effringeretur. Quicquid enim effringitur, abruptum & fractum intro cedit euulsum ab alio osse, quod in suo statu naturali manet: sicque fissura effracturæ adiungitur: & hæc est tertia fracturarum differentia. Effracturæ verò plu-

plures sunt ideæ. Nam aut maior pars ossis, aut minor effringitur, magisque & profundius deorsum, aut minus versus superficiem.

Effractura, ἑσθλασις tertia est species fracturæ cranij, quæ componitur ex contusione & fissurâ. Continet autem sub se ἐγγείσῳμα corporum appropinquationem, καμάρῳσιν quasi camerationem, & ἐκπίεσµα effractionem, quæ sunt diuersæ fracturæ species apud Paulum: est verò ἐγγείσῳμα, ut ait Paulus, ossis diuisio, in qua os læsum ex loco naturali deorsum ad membranam descendit, & sic dicitur ἀπὸ τοῦ ἐγγύς id est, prope, quod os fractum ad subiectam membranam appropinquet. Καμάρῳσις verò est cranij diuisio cū ossis affecti exaltatione, & sic nominatur, quod cameræ modo fractum os exurgat, Galenus sic distinguit ἐγγείσῳμα & καμάρῳσιν, in fine sexti libri methodi medendi, ut ἐγγείσῳμα sit fractura, quæ in medio sui, membranæ innitatur. καμάρῳσις verò eandem partem exaltatam habeat. Errat Vi-
dus qui putat καμάρῳσιν esse fracturam, in qua pars fracta ad interna recedat, & postea attollatur. Scribit enim eò commentatio, quo recenset fracturarum species, euenire interdum, ut fractum os quod deorsum compellitur, simul cum telo reuertatur, attollaturque ἐκπίεσµα, est fractura Caluarie πολυµέρης & in multa fragmenta, in qua profundius fracta ossicula descendunt, & membranam cerebri comprimunt.

Καὶ ἔδρης γενομένης ἐν τῷ ὅσῳ βέλεος πρὸς
γένεσσι ἀνῳγμῇ τῇ ἔδρῃ, τῇ τε ῥωγμῇ καὶ φλά-
σιν πρὸς γένεσσι ἀνῳγμῶν ἐστὶν ἢ μᾶλλον ἢ
ἥσσον, ἢ ἡ πρὸς ῥωγμῇ πρὸς γένεσσι, ἐν δ' αὖτε καὶ
ἔδρη ἐγένετο, καὶ ἡ ῥωγμὴ ἐν τῷ ὅσῳ τῷ πλείοντι
τῷ τε ἔδρῳ καὶ τῷ φλάσιν. τέταρτος ὅτος τρό-
πος, καὶ ἔδρη δὲ ὁ βέλεος γίνεται ἐν τῷ ὅσῳ. ἔδρη
δὲ καλεῖται, ὅταν μένον τὸ ὅσῳ ἐν τῇ ἐαυτῆς φύ-
σει τὸ βέλος σπείξαι ἐς τὸ ὅσῳ δῆλον ποιήσῃ ὅπῃ
ἐσπείξεν. ἐν δὲ τῷ τρόπῳ ἐχάτω πλέονες ιδέαι
γίνονται. καὶ πλεῖν μὲν φλάσιος καὶ ῥωγμῆς, ἢν ἄμφω
ταῦτα πρὸς γένεσσι τῇ ἔδρῃ, καὶ ἢν φλάσις μόνῃ
γένεσσι, ἢ δὴ πέφραται, ὅτι πολλαὶ ιδέαι γίνονται
καὶ τῆς φλάσιος καὶ τῆς ῥωγμῆς. ἡ δὲ ἔδρη αὕτη ἐφ'
ἐαυτῆς γίνεται μακροτέρη καὶ βραχυτέρη, εὐστα καὶ
καμπυλωτέρη, καὶ ἰσχυτέρη καὶ κυκλωτέρη. καὶ πολ-
λαὶ ἄλλαι ιδέαι τῶ τοιοῦτου τρόπου, ὅποιον ἂν τι
καὶ τὸ σχῆμα τῶ βέλεος ᾗ. καὶ δ' αὖτα καὶ βαθύ-
τερά τε καὶ ὥς καὶ μᾶλλον καὶ ἥσσον, καὶ σπείντερά,
καὶ ευρύτερα, καὶ πάντα εὐρέα ἢ διακεκόφεται.
Διακοπὴ δ' ὅποση τις οὖν γενομένη μήκεος τε καὶ
ευρύτητος ἐν τῷ ὅσῳ ἔδρη ἐστὶν. ἢν τ' ἄλλ' ὅσα
τὰ πλείοντα τῷ διακοπῇ μένη ἐν τῇ φύσει
τῇ ἐαυτῶν, καὶ μὴ σπασφλάται τῇ διακοπῇ ἔσω
τῆς φύσεως τῆς ἐαυτῶν. οὕτω δ' ἐσφλάσις ἂν εἴη, καὶ
ὁ ἐπὶ ἔδρη ὅσῳ.

T Eli autem sede in osse relicta, fieri potest vt fissura sedi accedat, atque fissuræ contusionem accedere necesse est, magis aut minùs, si qua parte fissura contigit, eadem teli sedes sit, estque fissura in osse quod sedem & contusionem continet; & hæc est quarta fracturæ species, cum teli sedes in osse appareat. Vocatur autem sedes, cum os in naturali suo statu permanens telum ossi infixum perspicuū fecerit, qua parte insederit: in vnoquoque autem genere plures sunt species: & de contusione quidem & fissura, si ambo hæc cum sede coniuncta fuerint, aut si sola fuerit contusio, iam dictum est multas esse contusionis & fissuræ species. Sedes verò ipsa per se longior est aut brevior, sinuosior aut rectior aut rotunda, multæque aliæ sunt huius generis species, pro varia teli figura, atque aliæ profundiores deorsum & magis & minùs, & angustiores & latiores, & valdè patentes, aut præcisum est os: præcisio autem cuiuscumque fuerit longitudinis & latitudinis in osse sedes est, si alia ossa quæ præcisionem continent, in suo naturali statu maneant, & non vna cum præcisione intro effringantur, & ex suo naturali

statu moueantur, sic enim effractura esset, non sedes.

EΔε sedes, quarta & species fracturæ cranij, estque soluta continuitas in osse capitis facta ab aliquo acuto atque abscindente, ita ut teli vestigium remaneat, & appareat quā telum sit impactum. In sede verò os affectum in suo naturali statu manere debet, & non intrò effringi. Eius duę sunt species. ἐκκομή, excisio, quæ Paulo definitur, diuisio cranij cum ossis offensi euerfione aut elatione. Galenus aliquando ἐκκομὴν, διακομὴν & ἑδ' ἑγὼ non distinguit vltimo capite libri de morborum causis. Altera sedis species ἀποσπένταρυσμός dicitur, cum os caluariæ fractum ab alio osse recedit, perinde ac si ascia ligni fragmentum abscindatur, ossis ablationē dicere possumus. σπένταρυνος autem asciam significat, ideoque Græca quadam similitudine ἀποσπένταρυσμόν vocarunt. Διακομή potest esse tertia sedis species, præcisio Latinis dicitur, estque magna & profunda ossis dissectio, & sæpius apud Hippocratem διακομή significat vulnus altè descendens & penetrans, ut etiam annotat Philotheus commentario in aphorismum 18. lib. 6. cum διακομὴν explicat διὰ τὰς ὁδούς διασπένταρυν, diuisionem profundam. Paulò post tamen Hippocrates διακομὴν & ἑδ' ἑγὼ idem esse dicit. Plures autem hîc constituuntur sedis species: est enim aliquando sedes simplex sine fissura, collisione, & effractura, ut dixit sententia decima: est aliquando sedes cum fissura & contusione, est sedes cum sola contusione, Suntque alię minores

tiores differentia, sedes longior, breuior, re-
ctior, circularis, angusta, profunda, latè patens.
Circa finem huius contextus, & circa principiū
sequentis, quidam interpretes nonnullis verbis
inimutatis & detractis non corrigunt sed cor-
rumpunt Hippocratem, cuius aperta & nota
etiam tonforibus sententia.

Τι τρώσκεται δ' ἄλλη τῆς κεφαλῆς, ἢ ἡ τὸ ἐλ-
κός ἐχέι ἄνθρωπος, καὶ τὸ ὅστέον ἐψιλώθη τῆς σαφ-
κός. πέμπλος ὅτος τρέπος. καὶ ταυτίωτικὴ συμφο-
ρίῳ ὅταν γένηται, ἐκ ἀνέχουσιν ὠφελῆσαι ὅθεν. ὅδ' ὁ
καὶ εἰ πέπονθεν τὸ κακὸν τὸ τοῦ ἐκ' ἐπὶ ὅπως καὶ αὐ-
τὸν ἐξελέγξαι τα εἰδέναι, εἰ πέπονθεν τὸ κακὸν
τὸ τοῦ ἀνθρώπου, ὅδ' ὅπῃ τῆς κεφαλῆς.

SAuciatur homo alia capitis parte,
quam eâ qua vulnūs accepit, & os
carne nudatum est. Hęc est quinta fra-
cturæ species. Quam calamitatem, cum
inciderit, nullo modo iuuare potes. Ne-
que enim si quis hoc damno sit affectus
examinando scire potes, illud ne malum
homo patiatur, neque qua capitis parte.

Quinta & postrema fracturæ capitis species
est cum os alia parte finditur, quam ea in
qua plaga est, solet enim euenire, ait Celsus lib.
8. cap. 4. vt altera parte fuerit ictus, altera os fi-
derit. Iuniores medici hoc fracturæ genus Ἀπί-

ἤχῃ quasi ab Echo responsionem nominarunt, quidam *ἀπὸ ἤχῃ* quasi resonitum, aut è regione respondentem sonum. Paulus Ægineta non admittit hanc fracturæ speciem libro 6, falluntur inquit, qui putant à contraria ictus parte, calvariae fracturam fieri posse, non enim fit in hominis cranio, quemadmodum in vitreis quibusdam vasculis fieri illi docent, illa siquidem vacua sunt, ideoque id patiuntur, calvaria autem hominis vndique plena, & alioquin solida est, & fissura, quæ aliarum complurium capitis partium ictarum lapsu, vel citrà cūctis continui solutionē generatur, quæque postea abscessu in ea factō, eodemque secto apparuerit, in opposita ictus parte facta esse ipsis videtur. Soranus autem voluit sicut in vitro, ita in calvaria, ictu vnius partis, non modo eam quæ percussa est, sed etiam contrariam findi posse. Observatū à Chirurgis sæpe *ἀπὸ ἤχῃ* in parte opposita fieri. Hippocrates tamen & Celsus minimè affirmant in opposita parte fieri fissuram, sed in alia capitis parte, quam quā ictus fuerit, & os carne nudatum, neque tamen negant fissuram in oppositam partē cadere posse, fieri enim potest, vt alia ossis pars findatur, & vt in oppositam partem etiam fissura incidat: fallitur vidius, qui putat Galenū Paulo fauere quod nono de vsu partium voluit calvariam solidam, ac sine suturis non fuisse factam, ne percussa vna parte: magna ossis portio violaretur, quod eueniret, si solida esset, efficiunt quidem suturæ, ne fissura vnius ossis, offendat os alterum, quod vltra futuram est, noxa enim ad futuram terminatur, non tamen impediunt, quo

minus, abiectū osse vno sauciato & carne nudato, in opposita parte si ndatur aliud os. Α' π' ῥήματος autem nulla remedia & auxilia esse dicit Hippocrates, neque etiam huius fracturæ curationem ullam postea tradet, quod pars affecta dignosci non possit. Cū tamen suspicio fuerit ossis fracti, nullaque fractura appareat in osse saucio & carne nudato, si videamus agrotum sæpe parti alicui manus admouere, coniectura non medio-
cris erit, ea in parte latere τρεῖς μα. Itaque suadent neoterici, vt admoueatut amplastrum, raso prius capillitio, quod comparatur ex pice, cera, terebinthina, cum mastiche & puluere ireos, & si pars aliqua mollior, humidior, tumentior appareat, in ea fracturam subesse arbitrabimur. Atque eiusmodi noxa curabitur vt fissura.

Τέτων τῷ πρόπιν τῆς κατ' ἥξις ἐς ὀρίσιν ἀφίκει ἥτε φλάσις ἢ ἀφανὴς ἰδεῖν, καὶ ἡνπὼς τύχη φανερὴ γενομένη, καὶ ῥωγμὴ ἢν ἀφανὴς ἰδεῖν, καὶ ἢν φανερὴ ἦ, καὶ ἢν ἔδρης γενομένης τῷ βέλους, ἐν τῷ ὅτεω πρὸς γένηται ῥωγμὴ καὶ φλάσις τῇ ἔδρῃ, καὶ ἢν φλάσις μόνον πρὸς γένηται ἀνευ ῥωγμῆς τῇ ἔδρῃ, καὶ αὕτη ἐς ὀρίσιν ἀφίκει. τὸ δ' ἔσω ἐσφλῶμενον ὅτεον ἐκ τῆς φύσις τῆς ἐαυτοῦ ὀλίγα τῷ πολλῶν ὀρίσιος πρὸς δέεται, καὶ τὰ μάλιστα ἐσφλασθεῖτα, καὶ μάλιστα κατὰ ῥαγέντα, ταῦτα ὀρίσιος ἡκιστα κέχρηται, ἔδὲ ἔδρη αὕτη ἐφ' ἐαυτῆς γενομένη ἀπὲρ ῥωγμῆς καὶ φλάσιος, ἔδὲ αὕτη ὀρίσιος δέεται. ἔδ' ἢ διακοπὴ ἢν μεγάλη καὶ εὐρέη ἔδ' αὕτη. διακοπὴ γὰρ καὶ ἔδρη τ' αὐτό ἐστιν.

IN his fracturæ modis ad ferram veniendum est, siue obscura, siue manifesta fuerit contusio, siue latens siue perspicua fuerit fissura. Præterea si sedes & teli vestigium in osse sit, adiunctaque sedi sit fissura & contusio, aut etiam si sola contusio sine fissura ad sedem accedat, hæc etiam ipsa ferræ vsum postulat. Quod autem quod ex suo statu effractum abscedit, rarissime sectionem requirit, quæque maxime effracta sunt, maximeque abrupta, ferram minime desiderant. Neque verò sedes ipsa fissuræ aut contusionis expers ferra indiget, ut neque præcisio si magna & ampla sit. Præcisio enim & sedes idem est.

Commemoratis quinque præcipuis fracturarum differentiis, alias recenset ex praxi & sectione desumptas. Quædam enim capitis fracturæ sectionem requirunt, quædam verò non desiderant. Quibus autem in fracturis ad sectionem veniendum sit, hic docet Hippocrates eamque convenire dicit fissuræ, contusioni, sedi quæ adiunctam habet fissuram & contusionem, aut etiam solam contusionem. In his enim fracturæ modis sanies quæ ad cerebri membranas confluit, exitum non habet. Videtur autem Hippocrates in libello de locis in homine, paucis fracturarum capitis curationem complecti.

& ferræ vtilitatem ac necessitatem demonstrare: os capitis fractum & contritum *ακίνηδυνον*, si verò rumpatur, & adsit fissura *ἐπικίνηδυνον*, huicque ferram adhibere oportet, ne per ossis fissuram fluens *ἰχθὺρ*, cerebri membranam putrefaciat, ut ergo huic *ἰχθὺς* pateat non solum *ἡσυχὸς*, sed etiam *ὀξυδὸς*, ferra est adhibenda: fissuræ quæ ad imum feruntur & per totum os, sectionem requirunt, quia tunc sanies ad cerebri membranam defluit, cum autem ad membranam usque non penetrant, sectione non egent: nam ut ait Paulus, cum fractura cranij ad diploen duntaxat perucinerit, ad hanc etiam usque solum perforanda est, idem de contusione sentiendum, notandum tamen contusionem in cranio puerorum, & potissimum in osse bregmatis, sectionem non ferre propter mollitiem. Hanc autem in pueris vel natura ad statum naturalem attollit, vel saltem admota cucurbitula cum copiosa flamma restituit, quod nos observauimus in puero septem annorum in ædibus Caussi mercatoris Burdigalensis opulentissimi, qui ab equo currente in via deprehensus, humique prostratus concidit, eiusque bregma dextrum ferrata equi calce ita depressum & contusum fuit: ut contusio manifestissima remanserit, osse tamen non nudato, ex eoque ictu quasi dormiens sine sensu iacuerit, oculi eius obcæcati fuerint, per nares & aures sanguis effluerit, obmutuerit, in eaque *ἀσπνία* per septemdecim dies fuerit, tandemque sine cranij sectione pristinae sanitati restitutus fuerit, eaque nunc integra fruitur annisdecem post casum & ictum. Effractura etiam

sectionem non postulat, minúsque ossa quæ maximè fracta, maximèque abrupta sunt, cum saniei satis pateat exitus, cumque citra sectionem eiusmodi ossa demi possint. Sedi simplici cum ossis superficies inciditur, aut cum incisio per totum os penetrat, & satis magna & ampla est, sectio inutilis est, in illa enim saniei nihil ad cerebrum confluit, in hac spatium satis magnum ad sanie extrahendam relinquitur. Hippocrates autem hîc ἀπὸ τοῦ κεφαλῆς non meminit, quoniam curatur ut fissura, sicut dictum est. Memineris verò in omnibus sectionibus, ut quam minimū ex osse dematur. Galenus in fine libri sexti methodi, quod vehementer est confractum, id totum auferendum censet, si verò ab eo fragmenta quædam longius excurrant, quemadmodum aliquando cernitur accidere, hæc persequi ad finem non expedit, quòd nulla inde sequatur noxa, modo reliqua rite sint confecta.

Πρῶτον δὲ χρὴ τὸν τραυματίαν σκεπτεῖσθαι, ὅπῃ τὸ τραῦμα τῆς κεφαλῆς ἔχῃ, εἴ τ' ἐν τοῖσιν ἀσθενεστέροισιν. καὶ τὰς τρίχας καταμεινῆσαι ἐν ταῖς περὶ τὸ ἕλκος. εἰ διακεκόφαται ὑπὸ τοῦ βέλους, καὶ εἰ ἔσω ἔησαν ἐς τὸ τραῦμα, κινδυνεύειν τὸ ὅστέον ψιλὸν εἶναι τῆς σαρκός. καὶ ἦν τὸ τοῦ φαναιῆσαι τὸ σῖνος τὸ ὅστέον ὑπὸ τοῦ βέλους. ταῦτα μὲν οὖν χρὴ ἀπὸ τοῦ τραύματος σκεψάμενον λέξαι, μὴ ἀπὸ μόνον δ' ἀνθρώπου.

I Mprimis verò considerandum qua tandem capitis parte vulnus sit acce-

ptum, an ossibus infirmioribus : explorandi etiam circa vulnus capilli, an à telo præcisi sint, introque ipsum vulnus subierint, tunc enim periculum est, os ipsum carne nudatum esse. Quod si ita sit, dicendum est, os à telo violatum esse: atque hæc vbi diligenter consideraueris, dicenda sunt, antequam homini manum admoueas.

Non præter ordinis rationem, ossis fracti signa & indicia proponit Hippocrates, enumeratis prius fracturarum differentiis. Cum enim negotium magni momenti sit cranium aperire, quod cerebri propugnaculum sit os: idcirco certioribus notis & indiciis explorandum diligenter est, an os capitis sit fractum. Antequam vero manum homini sauciato medicus admoueat, duo imprimis debet considerare, an vulnus sit in capitis partibus debilioribus, nempe in osse bregmatis, in suturis, aut in osse temporum, & an capilli circa vulnus sint à telo præcisi, si enim ytrumque adsit certum est fracti ossis indicium. Capilli autem qui in ipso vulnere præcisi reperiuntur, opinionem fracti ossis non frustra faciunt, difficile enim est capillos præcidere, quia cedunt, nisi ad os ipsum noxa perueniat. Admonet tandem medicum Hippocrates, non solum vt hæc signa tacitus consideret, sed etiam vt prædicat & prænunciet, sibi que apud ægrotantes maiorem auctoritatem & dignitatem compa-

ret. Gloriam autem & laudem sibi comparare debet medicus & Chirurgus non tanquam φιλόσοφος. sed tanquam φιλάνθρωπος, eò incumbens ut apud ægros magis valeat autoritate, quandoquidem sibi magis obsequuntur, quod illis utilissimum est, magis enim ægros iuuat, qui apud eos in honore & admiratione est, ait Galenus commentario primo in lib. 2. de officina medici. Medicos alibi monet Hippocrates, ut morbis qui videntur graues, nec tamen sunt, manū admoveant, ab illis se subducāt, qui leues videntur, cum reuera graues sint, ut ita apud ægrotantes à culpa semper absint, & laudem plerumque inueniant, commentario 4. in librum de articulis, cū agit de ossibus præcidendis, & commentario tertio sentent. 37. in eundem librum, cum agit de fractura costarum. Melius tamen Celsus libri. 5. cap. 26. sentent. 54. & 55. Prudentis hominis est, eum qui seruari non potest, non attingere, nec subire speciem eius ut occisi, quem fors ipsius peremit: deinde ubi grauis metus sine certa desperatione est, indicare necessariis periclitantis, in difficili rem esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse se videatur: sed ut hæc prudenti viro conueniunt, sic rursus histrionis est, paruum rem attollere, quò plus præstitisse videatur: obligarique equum est confessione promptæ rei, quò curiosius etiam circumspiciat ne quod per se exiguum est, maius curantis negligentia fiat.

Α' πόμενον δ' ἤδη πειράσθαι εἶδέναι σάρκα,
εἴ ἐστι ψιλὸν τὸ ὄστέον τῆς σαρκὸς ἢ ὕ. καὶ ἦν μὲν κατὰ

φανές ἢ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι τὸ ὅστέον Ψιλόν. εἰ δὲ μὴ, τῇ μῆλῃ σκέπτεσθαι. καὶ ἢν μὲν εὐρὴς Ψιλόν εἶναι τὸ ὅστέον τῆς σαρκὸς, καὶ μὴ ὑγρὸς ἀπὸ τοῦ τραύματος. καὶ εἰ ἐν τῷ ὅστέῳ εἶναι τι διὰ γινώσκιν πρῶτα ποιεῖσθαι, ὁρῶντα ὅσον τὸ ἐστὶ τὸ κακόν, καὶ τίος δαίται ἔργου. καὶ δὲ καὶ ἐρωτᾶν τὸν τετραμένον ὅπως ἐπαθε, καὶ πῶς τρώπον.

V Bi manum admoueris, elaborandum vt certo scias, sit ne os carno nudatum nec ne, & an oculis perspicuū sit os nudatum, sin minus specillo explorare oportet. Si carne nudatum os inueneris, & minimè integrum, primum cognoscere oportet, quid mali sit in offe, quantaque noxa sit inspicere, & cuiusnam sit opis indigens: deinde conuenit fauciatum interrogare, quo pacto, quoque modo percussus sit.

A Ntequam egro manus admoueat medicus notis & coniecturis ex parte debiliore & ex capilis sumptis colligit & prædicat os violatum esse, vbi autem manus iniecta est, certius idem explorat oculis vel specillo. Specillum autem, vt ait Celsus, qua plaga est, demitti oportet, neque nimis tenue, neque acutum, ne cum in quosdam sinus naturales inciderit, opininem fractū ossis frustra faciat, neque nimis plenum,

ne paruulæ rimæ fallant. Vbi specillum ad os ve-
nit, nihil nisi lene & lubricum occurrit, inte-
grum id videri potest, siquid asperi est, vtrique
qua futuræ non sunt, fractum os esse testatur.
Tria verò consideranda proponit in osse carne
nudato & saucio, morbi speciem, magnitudinē,
& remedij genus. Deinde non solis sensibus esse
fidendum in exploranda ossis fractura, sed inter-
rogandum etiam ægrotum quo pacto, quòue-
modo vulneratus sit. Hippocrates addit duo ὅπως
καὶ τίνα τρόπον. ego existimo ὅπως referri ad telum
interrogamus enim ægrotum lapide, an ligno
an ferro an alio telo percussus sit, & hoc ipso læ-
ni an aspero, mediocri an vastiore, vehemen-
ter an leuiter. τίνα τρόπον vero, ad ictum, siue te-
lum manu teneatur, siue iaciatur, ad lapsum, &
casum, è loco sublimi, æquali, è latere, de in-
dustria, ex improuiso, de quibus statim po-
stea.

Ἦν δὲ μὴ καταφανὲς ἢ τὸ ὅστέον, εἰ ἔχει τι χα-
κὸν, εἰ μὴ ἔχει, πολλῶν ἐπὶ γῆν μάλλον τιμὴν ἐρώ-
τησιν ποιεῖσθαι, μὴ δὲ ἔοντος τῶ ὁστέου, τὸ τεω-
μα ὅπως ἐγένετο καὶ ὅν τινα τρόπον. ταῖς γὰρ φλά-
σιας καὶ ταῖς ῥωγμαῖς ταῖς ὀφαινομένας ἐν τῷ ὁστέῳ,
ἐνέδουσαι δὲ ἐκ τῆς ὑπεκρίσιος τῶ τε τεωμένῳ τῷ
τον διαγινώσκειν πειρῆσθαι, εἰ τι πέπονθε τὸ το
ὁστέον, ἢ ὅς πέπονθεν. ἔπειτα δὲ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ
ἐξελέγχοντα, πλὴν μυιλάσιος γὰρ οὐκ ἐξελέγχει
εἰ πέπονθε τὸ το τῶν χακῶν τὸ ὁστέον, καὶ ἐπὶ ἔχει ὅ

αὐτῷ, ἢ ὅτι πέπονθεν, ἀλλ' ἐδρην τὸ ὄστέον ἐξε-
λέγχει μὴ λῶσις. καὶ ἢν ἐμφλάσθῃ τὸ ὄστέον ἔσω ἐκ
τῆς φύσεως τῆς ἐαυτοῦ. καὶ ἢν ἰσχυρῶς ῥαγῇ τὸ ὄστέον,
ἅπερ καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι καταφανέα ὄντι ὁρῶν-
τα γινώσκειν.

SI verò perspicuum non sit, an os vio-
latum sit nec ne, multò adhuc dili-
gentiùs inquirendum, nudato osse quo
pacto, quòue modo vulnus sit illatum.
Contusiones enim & rimas minimè in
osse apparentes, quæ tamen in sunt, ex
fauciati responso primùm eniti debes vt
cognoscas, nunquid os eiusmodi aliqua
noxa affectum sit nec ne! deinde vt ra-
tione & opere citra specillum depre-
hendas. Specillum enim non depre-
hendit an os his malis sit affectum, nec
ne, nec quid in se vitij habeat sed se-
dem relique vestigium indicat specil-
lum, ipsùmque os effractum cùm è suo
naturali statu intro cessit, cùmque ve-
hementer perruptum est quæ etiam o-
culis perspicua cognoscere licet, si quis
velit intueri.

CUm ossis carne nudati fractura oculis &
specillo cognosci non potest, diligentiori
interrogatione primùm perquirenda, deinde

ratione & opere exploranda. Sunt autem duæ fracturarum species, quæ oculis aut specillo non facile deprehenduntur, fissura nempe tenuis & angusta, & contusio, ut prius etiam dictum fuit. Sedes verò & affractura & oculis deprehenduntur, & specillo explorantur. Apechematis non meminit, quod in eo violatum os non sit carne nudatum. Contusiones autem & rimæ in osse minime apparentes deprehendendæ sunt ex responso ægrotantis ut antea diximus, item ratione & opere. Rationem vocat λόγον Hippocrates. Galenus autem commentario in aphorismum tertium libri primi de Officina Medici, scribit γνώμην, διανοίαν, νοῦν, φρένα λόγον ἢ λόγον ἐν διαθετοῖς idem significare, sententiam, cogitationem, mentem, intellectum, rationem & rationem interiorem. Continet autem ratio interior consequentia & repugnantia ijsquæ cognoscuntur, & præterea diuisionem compositionem, analysim demonstrationem & si quid est generis eiusdem. Itaque ad rationem pertinent quæ postea dicet, si offensus sine sensu quasi dormiens iacuerit, si oculi obiacati fuerint, vertigo ipsum occupauerit, si conciderit, & ex aphoris. 50. lib. 6. si bilis vomitus supervenerit, & similia, quæ non nisi osse fracto eveniunt. Ad ἔργον siue opus referuntur scalpri usus, & admotio atramenti vel medicamenti nigri, de quibus etiam postea.

Ρήγνεται δὲ τὸ ὀστέον τὰς τὲ ἀφανείας ρωγ-
μαῖς ἢ τὰς φανεράς. ἢ φλάται τὰς ἀφανείας φλά-
σιας, ἢ ἐσφλάται ἑσώκ τῆς φύσεως τῆς ἐαυτοῦ,
μάλιστα

μάλιστά ὅταν ἕτερος ὑφ' ἑτέρου πιπρωσόμενος ὅπῃ
 τῆδες τρώσῃσι βυλομένῃ, ἢ ὅταν ἐξ ὑψηλοτέρου γί-
 νηται ἡ βολή, ἢ ἡ πληγή, ὅπότερ' ἂν ἢ μάλλον, ἢ
 ὅτ' ἀν' ἐξ ἰσοπέδου τῷ χωρὶς. καὶ ἢν περικρατέῃ τῇ
 χεὶρὶ τὸ βέλος, ἢν τὸ βάλλῃ, ἢ τὸ τύπῃ, καὶ ἰσχυρό-
 τερος ἐὼν ἀσθενεστέρας πιπρώσκει. ὅσοι δὲ πίπτοντες
 πιπρώσκονται, πρὸς τὸ τὸ ὀστέον, καὶ αὐτὸ τὸ ὀστέον
 ὁ ἄπο ὑψηλοτάτης πίπτων, καὶ ὅπῃ σκληρότατον
 καὶ ἀμβλύτατον, τέτρω κίνδυνος τὸ ὀστέον ραγῆναι
 τε καὶ φλασθῆναι, καὶ ἔστω ἐσφλασθῆναι ἐκ τῆς φύ-
 σιος τῆς ἑαυτοῦ. Τὰ δ' ἐξ ἰσοπέδου μάλλον χωρὶς
 πίπτοντι καὶ ὅπῃ μαλθακώτερον, ἥσων ταῦτα
 πάσχει τὸ ὀστέον, ἢ οὐκ ἂν πάθοι. ὅσοι δὲ ἐσπίπτον-
 τα ἐς τιὴν κεφαλὴν βέλεα πιπρώσκει, πρὸς τὸ
 ὀστέον, καὶ αὐτὸ τὸ ὀστέον, τὸ ἄπο ὑψηλοτάτης ἔμπε-
 σόν, καὶ ἥκιστα ἐξ ἰσοπέδου, καὶ σκληρότατόν τε καὶ ἀμ-
 βλύτατον, καὶ βαρύτατον, καὶ ἥκιστα κοῦφον,
 καὶ ἥκιστα τε καὶ ὀξύ καὶ μαλθακόν, τέτο ἂν
 ῥήξειε τὸ ὀστέον καὶ φλάσει. καὶ μάλιστά γε ταῦ-
 τα πάσχειν τὸ ὀστέον κίνδυνος, ὅταν ταῦτα τε γί-
 νηται, καὶ ἐς ἴθῦ πρῶτῃναι κατ' ἀντίον γίνηται
 τὸ ὀστέον τῷ βέλει, ἢν τε πληγὴ ἐκ χειρὸς, ἢν τε
 βλητῇ, ἢν τε τί' ἐμπέσῃ αὐτέῳ, καὶ ἢν αὐτὸς χτυ-
 πεσῇ πρῶτῃ. καὶ ὅπως αὖ πρῶτῃς κατ' ἀντίον
 γένοιτο τῷ ὀστέῳ τῷ βέλει. τὰ δὲ πλάγιον τῷ ὀ-
 στέῳ ὡς ἄσθενεα βέλεα, ἥσων καὶ ῥήγνυσιν τὸ
 ὀστέον, καὶ φλάσει ἔισω ἐς κεφαλὴν, καὶ ἢν φιλω-
 γῇ τὸ ὀστέον τῆς σαρκὸς. ἕνια γὰρ τῶν τραυμά-

των τῶν οὕτω τραυμένων οὐδὲ ψιλῶς τοῦ ὅτι ἐν
τῆς στερνός.

FInditur autem os rimis, tūm obscu-
ris, tum manifestis, contunditur e-
tiam obscuris contusionibus, effractum-
que intrō cedit ex suo naturali statu, po-
tissimū cū alter alterū de industria lau-
ciare voluerit, aut cū ē sublimiore loco
fit iactus, vel ictus vter tandē fuerit, ma-
gis quā ex æquali loco, & si manu telum
contineat, seu iaciat, seu percutiat, & ro-
bustior infirmiores offendat. Ex caden-
tibus autem, siue partibus ossi vicinis, si-
ue osse ipso vulnerentur, quicumque ex
altissimo loco in durissimum & obtusis-
simum decidit, periculum est, ne os fin-
datur, contundatur, & effractum intrō
cedat ex naturali statu. Qui verò ex æ-
quali magis loco, & in mollius quippiam
decidit, minus his noxis os afficitur, aut
ne omnino quidē afficitur. E telis verò
quæ in caput incidūt, & partes ossi vici-
nas & os ipsum lauciāt, quod ex altissimo
loco decidit, & minimē æquali, quodque
durissimū obtusissimū, grauissimūque
fuerit, minimē vero leue, minimēque a-
cutum aut molle, hoc ossis findendi &

contundendi vim habet, & tunc maxime noxas eiusmodi os sentit, cum & hæc fiunt, & ad rectam lineam è regione teli os sauciatur, siue manu plaga infligatur, siue iaciatur, siue in ipsum aliquid incidat, siue ipse homo cadens vulneretur, siue quocumque modo fuerit telo sauciatus è regione. Tela verò quæ ex obliquo feriunt os, minus findunt, & intro ad caput contundunt, quamuis os carne sit nudatum. Nonnulla enim vulnera sic inflicta ne os quidem carne nudant.

EX responso sauciari, ictus & teli genus & speciem cognoscimus, per quæ deprehendimus morbum, eiusque magnitudinem. Sic robustus infirmiore de industria ex loco sublimiore offendens, magis os findit, contundit & effringit, quàm si debilis robustum imprudenter ex æquali loco percutiat. Sic qui ex altissimo loco decidit in corpus durissimum maximèque habes magis os findit, contundit & effringit, minus vero hæc patitur, vel omnino non patitur, qui ex plano, in mollius decidit. Sic etiam quæcumque in caput incidunt ex altissimo loco, si sint durissima, obtusissima, grauissima, & ad rectam lineam ferantur, magis findunt, contundunt & effringunt, quàm quæ ex æquali loco, leuia aut mollia ex obliquo in caput incidunt. Hinc tria collige ictus genera, cum alter alterum vulnerat, cum quis cadit, aut cum quid in caput

incidit. Telum siue *βέλος*, ut ait Homeri interpretatio libro Iliados, *καλεῖται τὸ ἐκ χειρὸς βαλλόμενον*, quod manu iacitur aut in longum emittitur. Hippocrates autem teli nomine intelligit ea quibus alter alterum vulnerat, ea quæ in caput incidunt. & in quæ decedit caput. Cum dicit partes ossi vicinas vulnerari, carnem intelligit, quam tela contundunt, incidunt & lacerant, ut statim dicet.

Τῶν δὲ βελέων ῥήγνυσι μάλιστα τὸ ὀστέον τὰς τε φανερὰς, ῥωγμὰς, καὶ τὰς ἀφανέας, καὶ φλάται, καὶ ἐσφλάττω ἐκ τῆς φύσεως τῆς ἐαυτοῦ τοῦ ὀστέου, τὰ τρογυλάτε καὶ περιφερέα, καὶ ἀρτίστομα, ἀμβλέα τε ὄντα καὶ βαρέα, καὶ σκληρά. καὶ τὴν σάρκα ταῦτα φλάται, καὶ πέπειρον ποιεῖ, καὶ κόπτει, καὶ τὰ ἔλκεα γίνεται ὑπὸ τῶν τοιούτων βελέων ἐς τὸ πλάγιον, καὶ ἐν κύκλῳ ὑπὸ κοίλα καὶ διάπυρά τε μᾶλλον γίνεται, καὶ ὑγρὰ ὄσι, καὶ ὅτι πλέονα χρονον καθαίρεται. ἀνάγκη γὰρ τὰς σάρκας τὰς φλασθεύσας καὶ κοπέσας πύον γενομένας ἐκλακίῃαι. τὰ δὲ βέλεα καὶ περιμήκεα ὅτι πολὺ λεπτὰ ὄντα καὶ ὀξεία καὶ κῆφα, τὴν τε σάρκα διατέμνει μᾶλλον ἢ φλά, καὶ ὀστέον ὡσαύτως, καὶ ἔδριον μὲν ἐμποιεῖ αὐτὸ καὶ διακόφαν. διακοπὴ γὰρ καὶ ἔδρη ταυτὸν ὄσι. φλά δὲ ἔμματα τὸ ὀστέον τὰ τοιαῦτα βέλεα, ἔδὲ ῥήγνυσιν, ἔδὲ ἐκ τῆς φύσεως ὄσω ἐσφλά.

EA tela maximè findunt os fissuris tum manifestis tum obscuris, contundunt, intróque effringunt ex suo naturali statu, quæ sunt rotunda, globosa, plana, obtusa, graua, dura. Hæc enim carnem contundunt, maturant & lacerant, & ab huiusmodi telis fiunt vlcera in obliquum, in orbem subcaua, eaque purulenta magis, & humida, & longiori tempore expurgantur. Necesse est enim carnes contusas & laceras, in pus versas tabescere. At vero tela oblonga, admodum tenuia, acuta, leuia carnem incidūt magis quàm contundunt, & similiter os sedemque relinquit, id quod præcidit: præcisio autem & sedesidem est. Sed nõ admodum os contundunt eiusmodi tela, neque findunt, neque de suo statu intró effringunt.

Teli multa genera proponit Hippocrates, quibus os capitis vulneratur. Si pondus teli consideremus, vnum est graue, alterum leue. Si verò figuram spectemus, telorum diuersa sunt genera, videtur autem hoc loco, telo rotundo & globoso, opponere oblongum, plano, admodum tenue, obtuso, acutum, graui, leue. Durities verò telis omnibus conuenit. Molle enim vt neque findendi, contundendi, aut effringendi vim habet, sic neque incidendi. Te-

lum autem graue, siue rotundum siue globosum, aut planum, aut obtusum fuerit, os findit, contundit aut effringit. Telum verò leue siue sit oblongum, admodum tenue, aut acutum, os magis incidit. Vocat autem Hippocrates *έίλος άετίσμον*, τὸ πανταχθεν ὀμαλόν, telū omni ex parte planum, vndique æquale, quod est enodē & siue spiculis. Tela grauia & obtusa, siue teretia siue rotunda, vel plana sunt, rarō os violant, nisi caro etiā vulneretur, vnde excitare solent ne vulnera caua vel in obliquum, vel in orbem pro teli specie. Cū enim caro in orbem contusa & lacera est, in pus vertitur, vlcusque reddit cauum & rotundum. Cū verò in obliquum collisa & detrita est, vlcus reddit cauum in obliquum. Hanc sententiam de carne contusa & lacera bis repetit hoc libro, de qua re dictum fuit commentario in sententiam sextam libri de vulneribus.

Ἀλλὰ καὶ πρὸς τῇ ὅψει τῇ ἑαυτοῦ ὅτι ἄν σοι φαίνεται ἐν τῷ ὄσσει, καὶ ἐρώτησιν ποιεῖσθαι πάντων τέτων. τὸ γὰρ μᾶλλον τε καὶ ἥσσον πρῶτον γένος ταῦτ' ἐστὶ σημεῖα. καὶ ἢ ὁ πρῶτος καὶ ῥῶτος, καὶ σφόδρα ῥῆχθῃ, καὶ δύνος, ἢ καὶ πέση.

DE his omnibus interrogandus est æger, præter id quod oculorum sensu in osse tibi apparuerit, maioris enim aut minoris noxæ hæc sunt signa. Est etiam requirendum num sine sensu

quasi dormiens homo sauciatus iacuerit, num oculi eius obcæcati sint, num vertigo superuenerit, num conciderit.

Quamuis aspectabilis sit in cranio fractura, interrogandus tamen æger est quo pacto, quoue modo vulneratus sit; ictus enim & telum signa dant grauioris aut leuioris plagæ. Præter hæc omnia, inquirenda & obseruanda sunt symptomata quæ superuenerint, his enim tanquam rerum iudiciis mens recta ratione ducitur, & in morborum etiam reconditorum notitiam penetrat. Itaque dicebat Hippocrates paulo ante coniecturis, oculis, specillo, sauciati responso, & tandem ratione & opere explorandam esse capitis fracturam. Quatuor autem proponit cranij violati signa, quamuis alia multa esse possint indicia, cuiusmodi sunt bilis vomitus, sanguinis per nares vel aures effluxus, ἀφωνία, vocis priuatio, & præterea ἐκπληξίς & παρὰφροσύνη idest stupor & desipientia ex aphorismo 14. lib. 7. Primum signum est κάρος grauis & altus sopor, qui commentario in aphorismum 5. lib. 5. proprie dicitur totius corporis repentina motus sensusque priuatio, spirandi tamen facultate illæsa quem affectum per ἀφωνίαν solet sæpius Hippocrates exprimere. Galenus lib. de symptomatum differentiis cap. 5. καὲν τῆς φανταστικῆς παρὰφροσύνης facit, idest, carum imaginatricis facultatis resolutionem. Sopor autem iste profundus fracto cranio compressionibus cerebri, vel oblæsis meningibus superuenit. Secundum signum est σκό-

ms, tenebriosa oculorum caligo, quæ fit cum commoto cerebro, vapores aut humores crassi caliginem menti iuducunt, *σκότμα* etiam dici potest. Tertium signum est *δνός* siue vertigo, cum omnia circum agi & in orbem verti videntur. Fitque cum læso cerebro humores in ventriculis inordinatè mouentur. Aliquando duo hæc symptomata, nempe tenebriosa oculorum caligo, & omnium rerum apparens quædam circumactio simul concurrunt, tuncque fit *σκότμα δνός* siue tenebriosa vertigo. Vertigo autem ita cerebrum, sensusque exagitat vt sæpe laborans corruat, hic autem casus noxæ gravitatem indicat. Meminiris autem hæc signa & præterea vomitum & *παρρηγεσώλιν* superuenire vulneribus musculorum temporalium etiam citra cranij aut cerebri noxam. Quod vidimus in Petro Blanchardo puero 14. aut 15. annorum, qui dū hæc scribebamus, accepto vulnere circa originem musculi temporalis tribus digitis supra aurem sinistram non solum vomitu premebatur, sed, etiam inexpugnabili tenebatur dormiendi cupiditate cum delipientia. Cūque Chirurgus hæc non nisi osse fracto euenire diceret, & ideo secandum & dilatandum esse vulnus, ad ossis læsi inspectionē, & speciei fracturæ dignotionē, eius consilium probare nolimus, primum quod os carne sua nudatum non apareret, secundo quod temporum regio sine periculo incidi minimè posset, diximusque ista symptomata minimè esse indicia cranij violati, sed à plaga musculi temporalis proficisci. Scribit enim Hippocrates sententia. 7. lib. 2. de articulis, plagas in tempo-

rum musculis graues esse & stuporem inferre siue *χάεον*. Itaque intra septem dies sine vlla plaga dilatatione cōualuit æger, qui sine periculo conuulsionis incidi non poterat. Quod si vulnere vulnus additum fuisset, curatio certe morbo fauior extitisset & longior.

Ὅτ' ἂν δὲ τύχη ψιλωθῇ τὸ ὀστέον τῆς σαρκὸς ὑπὸ τῆ βέλεος, καὶ τύχη κατ' αὐτὰς τὰς ῥαφὰς γεόμενον τὸ ἔλκος χαλεπὸν γίνεται καὶ τὴν ἑδρὴν τῆ βέλεος φράσσασθαι τὴν ἐν τῷ ἄλλῳ ὀστέῳ φανερὴν γινομένην, εἴτ' ἐνεστὶν ἐν τῷ ὀστέῳ, εἴτε μὴ ἐνεστὶν. ἢν τε τύχη γινομένη ἡ ἑδρὴ ἐν αὐτῇσι τῇσι ῥαφῇσι συμβλέπει γὰρ αὐτῇ ἡ ῥαφὴ τραχυτέρῃ εἶναι ἢ ἄλλῃ ὀστέῳ. καὶ δὲ διὰ δὴλον ὅτι τε αὐτὴ ῥαφὴ ἐστίν, καὶ ὅτι τῆ βέλεος ἑδρὴ. ἢν μὴ χάριτα μεγάλη γένηται ἡ ἑδρὴ. προσγίνεται δὲ καὶ ῥῆξις τῇ ἑδρῃ ὡς ἐπὶ τὸ πούλν αὐτῇ ἐν τῇσι ῥαφῇσι γινομένη, καὶ γίνεται καὶ αὐτῇ ἡ ῥῆξις χαλεπωτέρῃ φράσσασθαι ἐρρωγτος ἢ ὀστέου διὰ τοῦτο, ὅτι κατ' αὐτὴν τὴν ῥαφὴν ἡ ῥῆξις γίνεται, ἢν ῥηγνύνται ὡς ἐπὶ τὸ πούλν. ἔτοιμον γὰρ ταύτῃ ῥηγνύσθαι τὸ ὀστέον, καὶ διαχαλᾶν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἢ ὀστέου ταύτης, καὶ ἀραιότητι, καὶ διὰ τὴν ῥαφὴν ἐτοίμης εἶσεως ῥηγνύσθαι. καὶ διαχαλᾶν. Ἄλλα τὰ ὀστέα τὰ περὶ ἑλκὸς τὴν ῥαφὴν μένει ἀρραγέα, ὅτι ἰσχυρότερά ἐστι τῆς ῥαφὸς ἢ δὲ ῥῆξις ἢ κατ' αὐτὴν ῥαφὴν γινομένη καὶ διαχάλασις ἐστὶν τῆς ῥαφὸς, καὶ φράσσασθαι ἐκ εὐμαρῆς ἢ, ἢ ἐπὶ ἑδρῆς ἢ βέλεος γεόμενης ἐν τῇ ῥαφῇ, ἐπὶ

δαν ῥαγὶ καὶ διαχαλάσει, ἀλλ' ὅτι χαλεπώτερον
 φερόσθαι τὴν ἀπὸ τῆς φλάσιος ῥωγμῆς συγ-
 κλέπουσιν γὰρ τὴν γνώμην καὶ τὴν ὅψιν ὅτι ἰητῆ-
 ῖς αὐταὶ αἰσθάνονται ῥωγμοειδῆς φαινόμεναι καὶ τετηχί-
 τεραι εἶναι ὅτι ἄλλο ὅτι, ὅτι μὴ ἰσχυρῶς διακο-
 πῇ καὶ διαχάλασεν. διακοπῇ δὲ καὶ ἔδρη τῶν τῶν ὅτι,
 ἀλλὰ χεῖρ ἐκ τῆς ῥαφῆς τὸ τεῶμα γένοιτο, καὶ
 πρὸς τὸ ὅτι ἐκ τῆς ῥαφῆς τὸ βέλος, πρὸς τὸν
 τὸν νόον ἀνεύεισκειν ὅτι πέποιθεν τὸ ὅτι ἀπὸ γὰρ
 ἴσων βελέων τὸ μέγεθος καὶ ὁμοίων, καὶ πολλόν τε
 ἐλασσόνων καὶ ὁμοίως τεῶται, καὶ πολὺ ἥσσων,
 πολλῶ μείζον ἐκτῆσαι τὸ κακὸν ἐν τῷ ὅτι ἐς
 τῆς ῥαφῆς δεξιόμενος τὸ βέλος, ἢ ὁ μὴ ἐς τῆς ῥαφῆς
 δεξιόμενος.

SI verò carne sua nudatum os fuerit à
 telo, vulnusque ad ipsas futuras ex-
 titerit, difficile est afferere teli vestigium,
 quod in alio osse apparet, sit ne in osse,
 necne, cum præsertim teli vestigium in
 ipsis futuris fuerit. Apparet enim ipsa fu-
 tura reliquo osse asperior, nec perspicuū
 quid in ipso vel futura sit, vel teli vesti-
 gium, nisi admodum insigne fuerit vesti-
 gium. Adiungitur autem fissura sedi ple-
 rumque in ipsis futuris existens, eaque
 fissura difficilior deprehenditur, si finda-
 tur os, quia tunc fissura plerumque in
 futuris accidit. Facile enim est os findi ac

resolui, propter ossis hac in parte infirmitatem ac raritatē, tūm quòd etiā ipsa futura facilè findatur ac resoluatur. Cætera ossa quæ futurā ambiunt, infracta manent, quoniam futura sunt robustiora. Fissura verò quæ fit in futura, resolutio est ipsius futuræ, nec facile deprehenditur cū sedi adiungitur in futura, cū nempe futura ipsa finditur ac resoluitur. Sed multò difficilior est fissuram quæ fit à collisione deprehendere. Sutura enim fissuræ ipsi assimiles, & reliquo osse asperiores, medicamentum & oculos fallunt, nisi os admodum præcidatur aut dissoluatur. Præcisio autem & sedes idem est. Verū oportet cum vulnus in futuras inciderit, telumque ipsi ossi infederit, animum adhibere, vt deprehendamus, quid os patiatur. Etenim à paribus telis magnitudine, atque similibus, aut etiam multo minoribus si quis sauciatus fuerit eodem modo, aut etiam multò leuius, longe grauiori noxa afficietur os, si ad futuras telum exceperit, quàm si ad easdem futuras non exceperit.

Dixit Hippocrates sententia 20. huius libri sedem relique vestigium oculorum sensu & specilli vsu facilè posse deprehendi, nunc au-

rem demonstrat sedem ipsam non facile discerni posse à sutura, cum fortè teli vestigium in ipsis futuris fuerit, nisi ampla sit, latèque patens sedes, præterea difficilior cognosci fissuram in futuris existentem, sedi ipsi adiunctam, difficillimè verò dignosci fissuram, quam contusio peperit, si fortè vulnus ipsum in suturas inciderit. Ad exactam autem fracturarum cognitionem non solum necessaria est causarum & signorum diligens inquisitio, sed etiam corporum vulnera excipientium distinctio, quoniam sutura, ut dictum est sententia undecima huius libri, in vulnere si appareat osse nudato, quacumque tandem capitis parte vulnus extiterit, infirmissima est ad resistendum ictui & telo. Hic autem contextus obscurus videtur, mirèque lectorum ingenia torquet, quia multa videntur addita, aut sæpius frustra repetita, ideoque quidam interpretes plurima quæ putant mala inserta, delent. Inscrit etiam Vidijs quæ nusquam in Græcis exemplaribus leguntur. Ego quinque Græcorum exemplarium fidem secutus nihil immutare volui. Sensus autem verborum Hippocratis est huiusmodi. In osse capitis vulnerato & carne sua nudato, non facile deprehenditur sedes, si in suturas incidat, quæ alioquin in alia ossis parte esset manifesta, cum enim in osse integro, nihil nisi lene & lubricum occurrat, si quid asperi est, fractum os esse testatur, utique qua suturæ non sunt, suturearum autem certa perpetuo non est sedes. Itaque cum sutura reliquo osse asperior appareat, difficile est sedem à sutura distinguere. Difficilior verò dignoscitur fissura sedi adiuncta,

cum vulnus est in futuris, vulnus enim si in futuris incidat, facile futuræ franguntur & dissolvuntur. Difficillimè deprehenditur rima ex contusione, si sit in futuris, quoniam futuræ ipsius rimæ speciem referunt. Si verò magna & ampla sit futurarum dissolutio aut dissectio, iam non erit rima, sed sedes, fissuram autem & contusionem sedi adiungi posse, dictum fuit sententia decimaquinta huius libri.

Καὶ τῶν τὰ πολλὰ τῶνδε δει. ἀλλ' ἔ
 γὰρ αὐταῖς τὰς ῥαφὰς τῶνδε, ἀλλ' ὑποχωρήσαν-
 τα ἐν τῷ πλησίον ὅτις τὴν τῶνδε ποιεῖται, ἢ
 τῶνδε.

ATque horum plurima ferra aperi-
 re oportet, futuris verò non est
 admouenda ferra, cuius cum erit usus
 necessarius, declinando futuras, in osse
 vicino sectionem moliri oportet.

CUm enumeraret fracturarum differentias,
 docuit Hippocrates in quibus fracturæ
 modis ad ferram esset veniendum, ut videre li-
 cet sententia decima septima huius libri, Quia
 tamen fieri potest, ut noxæ hæ quæ sectionem
 requirunt, in futuras incidant, idcirco nunc
 admonet futuris nunquam admouendam esse
 ferram, sed tunc proximum os esse secandum.

Duabus potissimum de causis futura ferræ

vsu ferre non potest. Cùm enim per futuras dura meninx ossi capitis alligetur, cumque per futuras vasa tenuia ingrediantur & excidant, ferra duræ meningi vim inferret, & eiusmodi vasa secaret, sequereturque inde non levis hæmorrhagia, sicque non leuior esset ferræ calamitas, quàm fracturæ: præterea cùm futuræ sint infirmissimæ ad resistendum ictui & telo, ferræ etiam vsu non ferrent. Cùm autem dicit Hippocrates recedendum esse à futura, et os vicinum esse secandum, id ex utroque latere futuræ fieri debet. Si enim vnius tantum lateris futuræ vicinum os secaretur, ex ea parte tantum efflueret sanies, & retineretur in altera, propter interpositam membranam. Galenus autem in fine sexti libri methodi medendi, docet cur in cranij fracturis sectio sit necessaria. Necesse est, inquit, fracturam cranij aperire, ut detergere & abluere saniem à membrana liceat, nam si ex læsis partibus nulla sanies intro conflueret, superfluum esset os excindere, vnicum autem remedium in huiusmodi capitis fracturis est sectio siue apertio nam neque diligaturā, quam in alijs fracturis ceu phlegmonas maximè arcentē ratio inuenit, capiti adaptare possis, itaque nec quod affluit reprimi, nec quod in ægris partibus continetur, exprimere queas, sine quibus præsidij nec reliquorum ossium vllum seruari sanum potest, nec medicamentum est vllum, quod vel in alijs partibus citra deligaturam os fractum siccumatque ab super vacuis purum reddere valeat. Celsus li. 8. apertionis cranij rationem hanc affert. Cùm humor ad membranam descendit, sed exitum

non habet, ne eam irritet & graues inflammationes moueat, aut cum eandem cerebri membranam, os quod medium defedit, vrget, vel ex fractura veluti aculei quidam pungunt, his ita succurrendum est, vt tamen quam minimum ex osse dematur.

Περὶ δὲ ἰήσιος τραύσιος τῆς ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ ὡς χρὴ ἐξελέγχειν τὰς πάθας τὰς ἐν τῷ ὀστέῳ γινόμενας τὰς μὴ φανεράς, ὧδέ μοι δοκέει. Ἐλκος ἐν τῇ κεφαλῇ ὃ χρὴ τέλειν ὀδεῖν, ὃ δὲ οἶνω ἄλλος ἰκίσει.

DE curatione autem plagarum capitis, & quomodo noxas ossis minime manifestas deprehendere liceat, ita censeo. Vulnus in capite nulla re madefacere oportet, ne quam minimum quidem, vino.

Curationem vulneris capitis nunc exponit, vulnusque capitis nulla re humectandum esse dicit, quemadmodum nec aliarum etiam partium, omnia enim vulnera desiccari postulant, cuius rei causam reddit Hippocrates, initio libri de vulneribus, quia siccum sano vicinum est, humidum non sano. Cum autem vnaqueque pars, quatenus siccior est, eate nus siccio rem curationem requirat, idcirco ossa caluariæ fracta curationem siccio rem requirunt, quam ossa aliarum partium. Et remedia quæ fracturis capi-

tis admouentur, communi nomine *κεφαλικὰ* proprio verò *κεφαλικά* dicta, detergendi, digerendi & siccandi facultate prædita sunt, suntque catagmaticis fortiora & valentiora cephalica proprie dicta. Funit verò vtraque ex thure, myrrha, aloë, ex Iridis Aristoloehiæ & gentianæ radice, farina erui, alumine, mastiche, Symphyti radice, sanguine draconis, spuma argenti, squama æris panacis radicis cortice, & similibus. Cephalicorum remediorum Syluam vide apud Galenum libro 2. *κεφάλων*. Hippocrates autem in curatione vulnerum capitis, vinum rejicit, quia nō simplicis vulneris curationem tradit, sed illius, in quo caluaria carne sua nudata, noxa aliqua afficitur. Vinum quidem vulneris, qua vulnus est, optimum est medicamentum, ait Galenus libro 3. methodi medendi capite 4. Hippocrati etiam initio libri de vulneribus, vulnera quælibet madesacere non oportet, nisi vino. Cum enim vulnus omnē desiccandum sit, vinum nigrum & austerum, quod intelligit Hippocrates, optimum est remedium, quia & per se & per accidens desiccet: habet enim per se naturam siccandi, repellendo etiam desiccet, repulsis enim humoribus, qui alioquin affluerent, locum affectum reddit sicciorem: præterea cum simplex vulnus postulat tantum agglutinari, optimum *κολλήτικόν* est vinum, cū enim sit austerum & astringens coniungit & vnit diuisas partes, vt in pristinam vnitatem reducantur. Ergo cum vinum simplici vulnere admoueatur, quia siccet & agglutinat, neutrum in vulneribus capitis cum cranij fastura præstare potest. Cranium enim non solum
quali-

qualitate, sicca medicamenta, sed etiam tactu ipso requirit, agglutinato præterea in calvaria fractura, minimè speranda est, nec violato osse, vulnus capitis agglutinari expedit, ergo vinum in curatione vulnerum capitis locum habere non potest. ἄλλως ἤκιστα quidam vertunt, ne temerè quidem ac sine delectu, alij verò interpretantur, aut certè quam minimum: quasi concedat Hippocrates vsum vini, sed pauci, in frõte & in reliquo capite ad aliquod tempus, cùm inflammationis suspicio est, aut cum scalpelli opera necessaria est. Ego tamen verto, quam minimum, aut minimè, vt ἄλλως ἤκιστα sit quasi ὡς ἤκιστα. Videtur enim Hippocrates vini vsum in omnibus capitis vulneribus osse patefacto semper relictum. Paulo enim post, quamvis in fronte, ad oculos, ad supercilia cataplasmata & vincula admittat, quæ prius reiecerat, & statim alio loco, dum plaga secatur, vulnus vniuersum linamentis impleat, & cataplasma imponat, nullam tamen vini mentionem facit, quasi omnino respiciat. Paulus tamen dum carnem incidit, vt totum os, quod secandum est, nudum existat, si superueniat hæmorrhagia, linamentis ex oxycrato iniectis cohibet, deinde linteolo complicato ex ænolæo vtitur, sed aduertendum est Pauli hæc remedia non ad vulnerum curationem, sed ad symptomatum correctionem ad moueri.

Οὐ δὲ καταπλάσσειν, ὅ δὲ μοτὰ τὴν ἡσυχίαν ποιεῖσθαι.

NEquē cataplasmate, neque linamento curare.

Cataplasma propriè est medicamentum molle & consistentia mediocri, quod concoquendo, laxando, repellendo, digerendo, dolorique sedando potissimum adhibetur, etsi ad alios etiam vsus referri potest. Cataplasmatis nomen sumitur aliquando etiam pro emplastro, cerato, vnguento, linimento, hoc autem loco intelligit Hippocrates cataplasma, quod humectat & calefacit, purique mouendo aut dolori sedando adhibetur, cuiusmodi est quod ex farina hordej vel tritici cum oleo, vel aqua, vel aceto componitur, vt paulo post docebit, cum ager de pericranio ab ossè diducendo. Itaque in curatione vulnery capitis cataplasma reijcit, quoniam ossa caluariæ, medicamenta qualitate & consistentia sicca postulant. Sic in fractura auris cataplasmata aliena inducat Hippocrates in fine secundi libri commentariorum de articulis, quia maximi sunt ponderis, abscessum concitant, & suppurationem infestam reddunt. Sic initio libri *ἐπὶ ἐλκῶν*, quædam vulnera cataplasma ferre non possunt, potiusque recentia, & ea quæ sunt in articulis *Μοτὸς* siue *μοτὸν*. Latine penicillus aut penicillum, & linamentum, est lineum carptum, aut simile aliquid, quod vulneribus, vlcerybus aut corporis sectionibus inditur, aut siccum aut medicamentis quæ *ἐμμοτὰ* dicuntur, oblitum, ad dilatandum, siccandum, detergendum, exedendum, sanguinem sistendum, pus educendum & ad alios vsus, & potissimum

ad caua vulnera carne implēda. *μοτὰ* enim dicuntur, *τὰ ἐπιπλεμένα τοῖς κοίλοις τραύμασιν ὀδόνια πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς σαρκός*. Lintea quæ vulneribus cauis imponuntur, vt carne expleantur, apud Fauorinum. Sunt autem τῶν μοτῶν quinque differentia: *σπῆλῖς*, linamentum tortile, *ξύς*, rasile, *πλῆς*, concerptum, *ἐλυχνιωτός*, quod ex ellychnio fieret, erat autem ellychnium apud antiquos, certum quoddam materiae genus molle quod *εἰς τοὺς λυχνούς*, ad funiculos lucernarum aptissimum erat, ex eo format linamenta Galenus in fine quinti capitis, libri 13. methodi medendi, ad cicatricem inducendam. Initio vero tertij capitis libro decimoquarto methodi eiusdem, ad curationem œdematis vitur ellychnio molli, loco nouæ spongiæ, vbi vtrumque in oxycrato in quo aliquid aluminis sit, infundit & præparat. *πριαπισκωτός*, a pudendi humani similitudine, linamentum oblongum, ad Galani formam. Apud Celsum etiam libro septimo capite 28. *λημνίσκος* est linamentum in longitudinem implicitum, & aliquando linamentum inuolutum & oblongum. Apud Aëtium etiam est *σπηνίσκος* linamentum in cunei formam conuolutum, id autem maius fere est, quo chirurgi potissimum vtuntur in separandis ab inuicem durioribus corporibus. Apud Hippocratem lib. 2. *πρὶ γυναικείων* est *μοτὸς μολύβδινος*, linamentum plumbeum. Apud eundem libro secundo *πρὶ νούσων* est *μοτὸς χαλκῆς* isque duplex *κοίλος* & *σπῆλῖς*, linamentum stanneum duplex cauum & solidum. Cæterum a linamentis abstinet Hippocrates in curatione vulneris capitis osse disse-

cto, vel in conspectu posito & sectionem non requirente, quia neque tunc dilatandum, neque plaga aperta seruanda, neque pus effundendum est, solisque tunc medicamentis siocis, quæ cephalica dicuntur, ad finem vsque medendum est, vt ait Galenus in fine sexti libri methodi medendi. Animaduerte autem Hippocratem, vbi cataplasma reijcit, a linamentis quoque abstinere, Sic in fine libri secundi commentariorum de articulis, in aure secta ab omni cataplasmate, atque ab omni linamento dicit abstinendum, quia onerant & dolorem excitant. Paulò post cum vulnus in capite secat ad ossis noxas minimè manifestas deprehendendas, vulnus omne linamentis implet, quæ in posterum diem vulnus ipsum amplissimum præbeant, & quandiu linamentis, tandiu cataplasmate vtendum est, vtrūque autem non ad curationem ossis, sed ad dignorionem fracturæ vsurpatur,

Οὐδὲ πιεῖν καὶ ἐλκος ἐν κεφαλῇ, ἢν μὴ ἐν τῷ μετώπῳ ἢ τὸ ἐλκος, ἢ ἐν τῷ ψιλῷ τῷ περὶ χῶν, ἢ περὶ τῶν ὀφθῶν καὶ τὸν ὀφθαλμὸν. ἐν ταῦτα δὲ γινόμενα τὰ ἔλκεα, κατὰ πλάσιος καὶ ἐπιδέσιος μᾶλλον κέχρηται, ἢ πρὸς ἄλλοι τῆς κεφαλῆς τῆς ἄλλης. περὶ γὰρ ἡ κεφαλὴ ἢ ἄλλῃ τὸ μετώπον πᾶν, ἐκ δὲ τῶν περὶ χῶν τὰ ἔλκεα καὶ ἐν ὅτῳ ἂν ἢ τὰ ἔλκεα φλεγμαίνει καὶ παρνοιδισκεται δι' αἵματος ἐπιρροῆν.

N Ec verò constringere conuenit vulnus capitis nisi in fronte fuerit

vulnus, aut in parte pilis nudata, aut circa supercilia & oculos. Vulnera enim quæ hîc fiunt, cataplasmate & vinculo magis opus habent, quàm alia capitis parte, reliquum enim caput totam frontem continet. Vulnera verò quacumque parte oborta fuerint, ex partibus continentibus inflammantur & intumescunt ob sanguinis influxum.

V Inculum vt ait Hippocrates sententia 4. sectionis 2. commentarij de officina medici, aliud per se remedio est, aliud ijs quæ remedio sunt, subseruit. Vinculum per se remedio est, quod separata coniungit, quod influentem materiam repellit, & contentam exprimit. Vinculum subseruit ijs, quæ remedio sunt, & efficiendi veluti socium est, quod imposita præsidia & medicamenta continet. Neutrum vinculum in vulneribus capitis conuenire potest, neque enim illud aptum est, quod per se remedio est, cum neque diductas vulneris oras coniungere necesse sit, patefacto & violato osse, deligaturam etiam quam in alijs fracturis ceu maximè phlegmonas arcentem ratio inuenit, capiti adaptare non possis, vt paulò ante diximus, Itaque nec quod affluit reprimere, nec quod in ægris partibus continetur, exprimere queas, vt docet Gal. in fine sexti libri methodi medendi. Vinculum verò subseruiens & medicamentum retinens, multò minùs necessarium est, cum capitis vul-

nus simplex osse in conspectu posito neque linamenta neque cataplasmata requirat: expedit enim cum cataplasma non inducitur, à vinculo quoque abstinere sententia secunda libri *ἐλκ. βγ.*

Hippocrates libro *περὶ ἰγρῶν*, quatuor potissimum medico & chirurgo considerata dicit in curatione vulnerum, *ὀπιδέσματα, φάρμακα, καὶ τὰ περὶ τὸ ἕλκος ὀθόνια, καὶ τὰ καταπλάσματα*, fascias, medicamenta, lintea circa vulnus, & cataplasmata. Cum enim hæc in partibus affectis diutius relinquantur, longiori mora vel profunt magis vel obsunt, quam ea quæ paucò tempore absoluntur, neque diu parti affectæ inhærent. Itaque hîc in curatione vulnerum capitis, quatuor hæc potissimum examinavit & destinxit, solumque pharmacum cephalicum, idque siccum & aridum vsurpandum esse suadet, frons autem capitis pars anterior est crinibus nuda & supercilijs superposita, & lineis quibusdam distincta, quam Hippocrates hîc videtur distribuere in partem capillis nudatam, & eam quæ circa supercilia est, frons vero non habet pilos, quod à capitis pilis regi possit, si velimus, & si pilos ipsa produceret, oculis esset impedimento, natura autem magna cura prouidit, ne corpus homini negotium faceretur, eumque mancipij instar sibi seruiendo semper addictum haberet, ob eamque etiam causam, superciliorum & palpebrarum pilos æqualem semper seruare magnitudinem instituit, cum capitis & genarum pili plurimum augeri possint. Ait Gal. cap. 14. lib. 11. de vsu partium.

Cæterum frontis vulnera indigent cataplas-

mate & vinculo, propter inflammationem & tumores, quibus ea pars opportuna est ob defluxiones: Fiunt enim facile defluxiones ex partibus superioribus in inferiores, aut ex membris continentibus in contenta, unde scribit Hippocrates frontem à reliquo capite contineri, duobus autem modis pars dicitur contineri situ, & vasorum productione,

Χρή δὲ ὃ δὲ τὰ ἐν τῷ μετώπῳ διὰ παντὸς τῷ
 χρόνῳ καταπλάσσειν καὶ ὀπιδεῖν ἀλλ' ἐπιδαν
 παύσονται φλεγμαίνοντα, καὶ τὸ αἶδημα καταστῇ,
 παύσασθαι καταπλάσσοντα, καὶ ὀπιδεῖν, ἐπὶ
 δὲ τῇ ἄλλῃ κεφαλῇ ἕλκος ὅτε μοτοῦ χρόνῳ,
 ὅτε καταπλάσσειν, ὅτ' ὀπιδεῖν, εἰ μὴ καὶ το-
 μῆς δέοιτο.

N Ec verò frontis vulnera toto morbi tempore cataplasma aut vinculum requirunt, sed quum inflammatio cessat & tumor remittitur, tunc & cataplasmata admouendi & vincien- di finem facere oportet. In reliquo capite vulnus neque linamentis, neque cataplasmate neque fascijs curare oportet, nisi se etione sit opus.

S I propter inflammationem & tumores vulnera frontis cataplasmate & vinculo opus habent, rationi consentaneum est, ut finita in-

inflammatione & sublato tumore, à cataplasmate & vinculo abstineamus. Repetit deinde quod supra docuit vulnera reliqui capitis non esse curanda linamētis, cataplasmate, aut fascijs, sed ea solum hīc excipit, in quibus sectioni locus est, quæ linamenti implenda sunt, ut in posterum diem minimè labore aperta seruentur, sicque possit medicus inspicere, qua noxa os teneatur. Quandiu autem adhibentur linamenta, tandiu imponendum cataplasma ut dolorem leniat & inflammationem arceat, ut statim docebit Hippocrates, fascia etiam tandiu necessaria, quandiu cataplasma admouebitur, ut ipsum contineat. frontis verò sectio, cum cutis satis non patet ad ossis læsi inspectionem, recta sit secundum longitudinem aut saltem obliqua, nunquam enim secunda cutis musculosa frontis per transversum aut secundum fibras, alioquin supercilia non attollerentur, essetque horridus aspectus.

Notabis hic Hippocratem in vulneribus capitis, dum sit sectio, cataplasmata, linamenta & vincula concedere, nullam autem vini facere mentionem, quod vino, nullo modo humectanda capitis vulnera existimet.

Τάμνειν δὲ καὶ τῶν ἐλκῶν ἐν τῇ κεφαλῇ
 θινόμενων καὶ ἐν μετώπῳ. ὅπῃ δὲ τὸ μὲν ὀστέον
 ψιλὸν ἢ τῆς σαρκὸς, καὶ δοκέη τι σῖνος ἔχειν
 ὑπὸ τῷ βέλει. τὰ δὲ ἔλκεα μὴ ἱκανὰ τὸ
 μέγεθος ἢ μήκος καὶ τῆς εὐρύτητος, ἐς πλὴν
 σκέψιν ἢ ὅσους, εἴτε πέποιθται ὑπὸ τῷ βέλει

κακόν, καὶ ὁπῶόν τι πέπονθεν, καὶ ὅσον ἢ μὲν σαροῦ
πέφλαται. καὶ τὸ ὁστέον ἔχει τὸ σῆμα. Καὶ δ' αὖτε
εἰ αἰσινές τε ἐστὶν τὸ ὁστέον ὑπὸ ὧ βέλεος. καὶ μη-
δὲν πέπονθε κακόν, καὶ ἐς τὴν ἴησιν, οἷος δεῖται
πινός τότε ἔλκος, ἢ τὸ σαροῦ, καὶ ἢ πάθη ὧ ὁστέα
τὰ δὴ τοιαῦτα τῶν ἐλκῶν τομῆς δεῖται. ἀν καὶ
τὸ μὲν ὁστέον ψιλάθῃ τῆς σαρκὸς ὑπὸ κοίλα δὲ
ἢ ἐς πλάγιον ὅτι πολὺ, ἐπανατάμνει τὸ κοί-
λον, ὅς μὴ εὐχρὲς τῷ φαρμάκῳ ἀφικέσθαι,
ὅμοίῳ ἀν τίνι χεῖρ. καὶ τὰ κυκλοτερέα τῶν ἐλ-
κῶν ὑπὸ κοίλα ὅτι πολὺ, καὶ τὰ τοιαῦτα
ἐπανατάμνων τὸν κύκλον διχῶν καὶ μῆκος, ὥς
πέφυκεν ἀνθρώπος, μακρὸν ποιεῖν τὸ ἔλκος.

C Apitis & frontis ea vulnera fecan-
da sunt, in quibus os carne sua nu-
datum est, atque à telo violatum esse vi-
detur, vulnera verò in longitudinem &
latitudinem non satis sunt patefacta ad
inspectionem ossis, num detrimenti quid
à telo acceperit, quæ ne noxa teneatur,
tum quantum caro ipsa sit contusa, quæ-
tæque sit ossis calamitas, & rursus utrum
os inuiolatum manserit, nihilque mali à
telo susceperit, & quod ad curationem
attinet, quo tandem remedio indigeat
vulnus, siue caro, siue os afficiatur, huius-
modi sane vulnera sectionem postulant.

Quin etiam si os carne nudatum fuerit, vulneraque valde, subcaua in obliquum sint, quod cauum est disseccare conuenit, quâ medicamentum facile non admittitur quocumque tandem indigeat. Vulnera etiam rotunda multumque subcaua sectionem requirunt, orbemque vulneris duabus lineis diuidere oportet, secundum naturalem hominis longitudinem, vulnusque ipsum longum efficere.

Vulnera capitis quæ sectione indigent, admittunt linamenta, cataplasmata & fascias, idcirco nunc docet in quibus vulneribus necessaria sit sectio. Constituit autem tres vulnorum differentias, quæ sectionis usum requirant. Primum ea plaga secanda est & latius aperienda, in qua os quidem nudatum est, & à telo videtur esse violatum, sed non satis patefacta est, ut os læsum in conspectu esse possit, eiusque fracturæ species deprehendi, & conueniens remedium admoueri. Secundò, secandum & dilatandum est vulnus, quod osse nudato subcauum est, ut admittat medicamentum. Tertiò plaga rotunda & caua disseccanda est in longitudinem hominis duabus lineis, hoc postremum generalius repetitur libro *ἐπὶ ἐλκῶν* his verbis. Circularia vlcera si subcaua sint, circulo præcidere oportet unde quaque quæ abscesserunt aut omnia, aut dimi-

dium circuli, secundum naturalem hominis longitudinem.

Cur autem ulcera rotunda fiant, cur difficilius curentur, curque in longitudinem secanda sint, docet Alexander Aphrodisiensis problemate 97. libri primi, vide commentarium in sententiam 16. libri *πρὸ ἐλκῶν*. Hinc autem discant Chirurghi non quævis capitis vulnera temerè disseccare aut dilatare, sed diligenter observent tria hæc vulnerum genera, quæ sectionem postulant, quod à paucis hodie observatur qui *κακουζήσαν* potius quam Chirurgiam exercent.

Τάμνοντι δὲ κεφαλῇ, τὰ μὲν ἄλλα τῆς κεφαλῆς ἀσφαλεῖν ἔχει τεμνομένα. ὁ δὲ κρίταφος, καὶ ἄνωθεν ἐπὶ τῇ κροτάφῃ καὶ τῇ φλέβῃ διὰ τῇ κροτάφῃ φερομένην, τὸτο δὲ τὸ χειρὶον μὴ τάμνειν, πᾶσι γὰρ ἐπιλαμβάνει τὸν τμηθέντα, καὶ ἢν μὲν ἐπ' ἀεὶ τερά τμητῇ κροτάφῃ, τὰ ἐπιδεξιὰ ὁ πᾶσις ἐπιλαμβάνει, ἢν δ' ἐπὶ τὰ δεξιὰ τμητῇ κροτάφῃ, τὰ ἐπ' ἀεὶ τερά ὁ πᾶσις ἐπιλαμβάνει.

Quoties caput secandum est, aliæ quidem partes sine periculo inciduntur, sed tempus, regioque superior iuxta venam quæ per tempora ducitur, tutò non secantur, itaque eam partem minimè incidere oportet, eum enim qui dissectus fuerit, convulsio corripit, ac si

sinistrum tempus incisum fuerit, conuulsio dextrum apprehendit, sin autem dextrum fuerit dissectum, conuulsio sinistrum occupat.

Secundum & dilatandum vulnus capitis, Cū est angustum, cū culosum aut rotundum, tempus tamen vtrumque eiusmodi sectionem non fert, Cū enim per musculum crotaphitam (qui à temporum cavitare exoriens ossa omnia temporum contegit) ferantur vena iugularis interior, carotis arteria, rami nervorum à sexta & quinta coniugatione, non sine periculo conuulsionis, aut hæmorrhagiæ incidi possunt temporum partes. Præterea cum maxillæ inferioris *κόρυον* à musculo temporali descendente tendonem recipiat, motus maxillæ labefactaretur inciso crotaphita musculo, eiusque musculi vulnus difficillimè agglutinetur propter motum maxillæ in mandendo & loquendo. Hippocrates autem horum incommodorum non meminit, sed vnius duntaxat conuulsionis, oppositæ & sanæ partis. Si enim, inquit, incidatur tempus sinistrum, conuulsio corripit dextrum, aut contra. Nam vbicumque musculi sunt congeneres, pares numero, robore ac magnitudine, in oppositis partibus, resolutio vnius partis, conuulsionem efficit alterius, Musculos autem congeneres vocat Hippocrates *ἀδελφεῖας* commentario tertio de fracturis & commentario 3. de articulis, quasi fratres, cognatos, germanos, valde similes, maxime coniunctos quique inter se

confortium ita habeant, vt vna parte vitiata, alterius actio, situs, habitus & figura lædatur. Itaque vbi muscoli ab altera maxillæ parte resoluntur, fit vt altera pars breuior appareat & quasi contracta, ait Galenus commentario 100. in librum tertium de articulis : vbi notandum est Galenum dicere partem quasi contractam & conuulsam, *ὅτι οὐ συνεσπασμένη*, quasi ea non sit vera conuulsio, vnde etiam Vessalius conuulsionem quæ fit inter musculos fraternos dicit esse naturalem. Hippocrati autem hoc loco *σπασμὸς* simpliciter dicitur, vt etiam est, Cùm enim conuulsio sit musculi aut nerui ad suum principium contractio citra voluntatem, in parte opposita & sana erit conuulsio inciso musculo temporali, quamuis enim muscoli suo fungantur munere, dum principium suum versus contrahuntur, quia tamen præter voluntatem retrahuntur, conuulsione tentantur. cùm musculus sit motus voluntarij instrumentum, de conuulsione quæ superuenit morituris ex vulnere capitis dicemus postea.

Ὅτ' ἀνὸς τὰ μνηστὴ ἐλκος ἐν κεφαλῇ, ὅτεον
 εἶνεκα τῆς σαρκὸς ἐψιλωμένων, φέλων εἶδεναι
 ἐπ' ἔχει τὸ ὅτεον κακὸν ὑπὸ τῷ βέλους, ἢ καὶ ἔκ
 ἔχει, τὰ μνηστὴ καὶ τὸ μέγεθος τὴν ἀπειλήν, ὅση
 αὖ δοκῇ αὐτῷ καὶ ἔχει. τὰ μνηστὴ δὲ καὶ ἀνα-
 γνῶναι τὴν σάρκα ὑπὸ τῷ ὅτεον, ἢ πρὸς τὴν μή-
 νην καὶ πρὸς τὸ ὅτεον πέφυκεν. ἐπειτα διαμο-
 τῶσαι τὸ ἐλκος πᾶν μοτῶ, ὅς τις αὖ ἐν ὑπὸ τῷ

τὸ ἔλκος παρέξει ἐς τὴν ὑπερίκην ζωὴν ἐλάχιστον
 πόνον. μοτώσαντα δὲ καταπλάσματι χρῆσθαι
 ὅσοι ἂν χρόνον καὶ τῷ μοτῷ, μᾶλλον ἐκ λεπτῶν
 ἀλφίτων, ἐν ὅξει διαμάσσειν ἢ εἶναι, καὶ γλί-
 σσιν ποιέειν ὥς μαλιστα.

Cum vulnus in capite secas ossium
 carne nudatorum causa, ut scias sit
 necne os à telo violatum, ea magnitudi-
 ne incidenda est plaga, quæ videbitur ne-
 cessaria, incidendo autem diducere ab
 osse oportet carnem quæ membranæ &
 ossi adiuncta est; deinde vulnus omne li-
 namentis implere, quæ in posterum diè
 vulnus amplissimum præbeant minimo
 dolore. Cum linamenta immiseris, tan-
 diu cataplasmate utendum, quandiu li-
 namentis, mazæque extenui polenta in
 aceto subigenda & incoquenda est do-
 nec maxime glutinosa fiat.

Quid observandum sit in capitis incisione
 demonstrat, & quatuor nobis potissimum
 proponit, primum, plagam eatenus dilatandam,
 quatenus os læsum conspici possit, deinde, peri-
 cranium esse ab osse diducendum, ut nihil ex eo
 super os relinquantur, siquidem ut ait Celsus, mē-
 branula quæ sub cute calvariam cingit, scalpro
 terebrisue lacerata vehementes fobres cum in-

flammationibus excitat. Tertiò, vniuersum vulnus esse linamentis implendum, vt in posterum diem apertum seruetur sine dolore, & cohibeatur sanguis, si forte quis erumpat. Quartò, vt superponatur cataplasma ex tenuissima farina hordei torrefacti aceto subacta & incocta donec glutinosa & tenax reddatur. Cuius cataplasmatibus vsus dolorem lenit, inflammationem arceat, & nonnullam desiccandi habet facultatē. Cæterum per carnem ossi & meningi adiunctā, intelligit pericranium, quod ab osse diducendum est vt os conspicuum sit. Non describit Hippocrates qua figura secundum sit vulnus & dilatanda plaga, id Paulus exprimit lib. 6. cap. 90. his verbis, derafo super vulnus capite, duas lineas iuxta rectos angulos mutuo se secantes, quæ literæ X figuram accipiant, incidemus. Harum autem alteram esse conuenit, quæ iam antea erat, deinde quatuor in vertice angulos exoriantes, vt totum os quod perforabitur nudū existat: siquidem sanguis fertur, linamentis ex posca obiectis, cohibebimus, sin minus, siccis, deinde implicito linamēto ex vino & oleo iniecto, conuenienti vinculo vtemur, sequenti die nisi recentius aliquod symptomā prohibeāt, perforare os vitiatum aggrediemur. Idem etiam declarat Celsus libri octauī capite quarto, his verbis, plaga si manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transuersis lineis literæ X figuram accipit, vt deinde à singulis procedentibus angulis cutis subsequatur, inter quæ si sanguis fertur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus est, occupandusque obiectis lina-

mentis, & caput altius excitandum. *Μάζα* Latinum vocabulum non habet. Scribit autem Aetius libri primi capite de hordeo, mazam esse polentam hordeaceam, quæ sit humore confusa, & liquore aliquo subacta. *Ἀλφιτον*, apud græcos quamlibet farinam significat, sæpius verò denotat farinam hordei tosti vel fricti quæ latinis polenta dicitur, polenta enim distat à farina hordei, eo quòd torretur, Plinio lib. 22. cap. 25. Pluribus autem modis fieri polentam scribit idem Plinius libri decimi octavi cap. 7. Græci perfusum aqua hordeum siccant nocte una, ac postero die frigunt, deinde molis frangunt. Sunt qui vehementius tostum, rursus exigua aqua aspergant, siccantque prius, quàm molant. Alij verò virentibus spicis decussum hordeum recens purgant, madidumque in pila tundunt, atque in corbibus eluunt, ac siccatum sole rursus tundunt, & purgatum molunt. Galenus libro primo de alimentorum facultatibus ex hordeo recenti & nouo mediocriter tosto laudatissimam fieri polentam scribit.

Τῇ δ' ὑστερίῃ ἡμέρῃ ἐπειδὴν ἐξέλῃς τὸν μὲ-
 τὸν, κατιδὼν τὸ ὄστέον ὅτι πέπονθεν, εἰ μὴ σοὶ
 καταφανὲς ἢ ἡ τρώσις, ὅποιον τις ἐστὶν ἐν τῷ
 ὄστέῳ, μὴ δὲ διαγνώσκῃς εἴ τι ἐχει τὸ ὄστέον
 κακὸν ἐν ἐαυτῷ, ἢ καὶ ὅκ' ἐχει, τὸ δὲ βέλος
 δοκέει ἀφικέσθαι ἐς τὸ ὄστέον καὶ σινᾶσθαι, ὅπ-
 ῃ ξύειν καὶ τῷ ξυστῆναι καὶ βάθος καὶ καὶ μήκος ὅ
 ἀνθρώπου ὡς πέφυκεν, καὶ αὐτῆς, ἢν ἢ χάριστον τὸ
 ὄστέον,

ὄσπεον, τῇ ῥήξει ἔινεχα τῇ ἀφανέων ἰδεῖν, καὶ
 τῆς φλάσιος ἔινεχα τῆς ἀφανέος τῆς ἐκ ἐσφλω-
 μένης εἶστω ἐκ τῆς φύσεως τῆς κεφαλῆς τὰ ἄλλα
 ὅσα. ἐξελέγχει γὰρ ἡ ζῆσις μάλλον, ἢ μὴ καὶ
 ἄλλως κατὰ φανέας ᾗσιν αὐταὶ αἱ πάσαι ὁρα-
 ῖν τῷ ὄσπεω ὃ βέλεις. καὶ ἢν ἔδρην ἰδῆς ἐν τῷ
 ὄσπεω τὸ βέλεις, ὁππότεν χεῖρ αὐτὴν τὴν πρὸς ἔδρην
 τὸ βέλεις, καὶ τὰ ἀείχοντα αὐτὴν ὅσα, μὴ
 πολλὰς τῇ ἔδρῃ παρσγένητο ῥήξις καὶ φλάσις,
 ἢ μόνη φλάσις, ἔπειτα λαμβάνῃ ὃ κατὰ φανέας
 ὄντα.

P Ostridie cum linamentum exeme-
 ris; oīque lasum inspexeris, si non
 perspicua sit noxa, quæ in osse est, nec
 discernere possis, an os in se aliquid vitij
 habeat, necne, ipsum verò telum ad os
 penetrasse & violasse videatur, tunc os
 scalpro deradendum est secundum pro-
 funditatem & longitudinem hominis,
 atque ex aduerso, si os transversum sit,
 propter fissuras quæ aspectum fugiunt,
 & propter obscuram contusionem, quā
 caput ex suo naturali statu nō intro ces-
 sit dimotum ab alio osse vicino. Scalpro
 enim facile deprehenduntur affectiones
 ossis à telo illatæ. siquidem alioquin ma-
 nifestæ non fuerint. Quod si teli vesti-

gium in osse animaduertas, deradendū erit ipsum teli vestigium, & quæ in vicino sunt ossa, ne forte sæpius sedi adiuncta sit fissura & contusio, aut sola contusio, quæ cum perspicuè non sunt, postea latent & sensum fugiunt.

P Laga à Chirurgo incisa linamentis impletur, vt in posterum diem aperta maneat, vt. que patefacto osse & dilatato vulnere, tunc oculis subiiciatur ossis fractura si quæ sit. Si verò ne tunc quidem deprehendi possit, ex sermone verò saucij, ex ictu, ex telo, & ex symptomatis quæ superuenerunt, probabile sit os à telo esse violatum, tunc ad scalpri vsum veniendum esse docet. Itaque nunc demonstrat, quomodo deradendum sit os, & quibus fracturæ modis necessarius sit scalpri vsum. Admonet autem Hippocrates os abradendum esse non solum in altitudinē & longitudinem hominis, sed etiam in latitudinem, aut aliter, si forte os violatum transuersum sit. Itaque nihil mutandum in verbis Græcis Hippocratis. Cum autem rima tenuis & angusta non sit perspicua, neque statim post ictum, neque ijs diebus, quibus opis aliquid contra mortem homini possit afferri: cumque quod contusum est, statim ab ictu sub oculos non cadat, neque etiam specillum eiusmodi rimas, & contusiones deprehendere possit, meritò dixit antea, eiusmodi ossium noxas opere esse explorandas. Quid per ἡρπυρ sine opus intellexerit, nūc aperit, dum os scalpro deradendum dicit, ad eo-

gnoscedas eiusmodi fracturas, paulo post adiunger, atramenti, vel medicamenti nigri admotionem. Sedem autem relique vestigium, ipsamque effracturam indicat specillum, quæ etiam oculis facile cognoscuntur; si quis velit intueri, dixit antea Hippocrates, sed quoniam sedi adiungitur etiam aliquando fissura, & contusio, vel sola contusio; idcirco etiam suadet ut & sedem & adiacentia ossa scalpro abradamus, ut latentes rimæ & contusiones in conspectum venire possint.

Επειδὴν δὲ ζύσης τὸ ὀστέον τῷ ζυστῇ, ἢν μὲ δοκῇ ἐς ὥρισιν ἀφήκειν ἢ τεῶσις τ' ὀστέα, ὥριεν ἄλλ', καὶ ταῖς τεύσις ἡμέρας μὴ ὑπερβάλλειν ἀπώριον, ἀλλ' ἐν ταύτῃσι ὥριεν ἄλλος τε καὶ τῆς θερμῆς ὥρης, ἢν ἐξ ἀρχῆς λαμβάνῃς τὸ ἵημα.

CUm os scalpro derafum fuerit, si videatur ossis noxa serræ vsum considerare, tunc protinus serra excidendum, nec tertium diē præteribis, ut excidas, sed intra triduum secabis, tūm alias tum potissimum tempore calidiore, si modo ab initio curationem susceperis.

Os derafum scalpro si habeat rimam aut contusionem, aut sedem rimæ & contusioni adiunctam, vel soli contusioni, serra secandum est, & intra triduum, si modo ægrum statim ab initio curandum susceperis, potissimumque tempore calidiore, quoniam ut prius dixi, ho-

mo quacumque parte capitis acceperit vulnus, diutius vitam protrahet hyeme, quam æstate. Intra triduum os excidendum dicit, antequam nempe inflammatio & alia mala symptomata superueniant. Hanc autem sententiam sic exprimit Celsus lib. 8. cap. 2. Si ossis capitis excidendi necessitas est, non sunt audiendi, qui osse nudato, diem tertium expectant, ut tunc excidant, ante inflammationem enim tutius omnia tractantur, itaque quantum fieri potest eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum & omni vitio liberandum. Paulus autem libro sexto Hippocrati repugnare videtur, qui hyeme quidem ante decimum quartum, æstate vero ante septimum os auferri iubet, cum vulneratum ab initio curandum susceperis, priusquam praua oboriantur symptomata. Tutius tamen consiliū Hippocratis quam Pauli. Nonnulli etiam hunc Pauli contextum mancum & mutilum existimant, sicque restituendum censent, membrana quidem si abscessit, & tu ab initio ægrum curandum suscepisti, continuo ferra eximendum os, nec ultra triduum differendum. Si vero ab initio curandum ægrotum non suscepisti, hyeme quidem ante decimum quartum omnino os auferre tentato, æstate ante septimum, priusquam commemorata oboriantur symptomata. Consultis Hippocrates sectione tertia de fracturis sententia 40. ossa fracta & luxata impellenda & extendenda esse eodem die vel postridie, non autem tertio, quarto vero vel quinto minimè, nam si his diebus lacerata ossa nequeant in suam sedem reuerti, inflammatio superueniet, in vniuersum

enim, inquit sententia 33. eiusdem sectionis, omnia vulnera tertio & quarto die minimè vexanda sunt, omnisque opera specilli fugienda est his diebus, & quibuscumque alijs vulnera recrudescunt & exasperantur, in summa enim vulnera pleraque tertio aut quarto die recrudescunt, tū quæ inflammatione tum quæ sordibus grauiter excipiuntur aut febrem inferunt, quo præcepto nullum aliud tradi potest vtilius, nam quæ sunt in arte medendi grauissima, quibus id non sit commune? non enim pertinet ad vulnera tantum sed ad alios quoque morbos complures. Vbi autem septem dies aut paulo plures transierint, ait sententia 42. eiusdem sectionis, si febris non adsit, atque vulnus inflammatione vacet, tunc minus prohibemur eniti ad reponendum, vbi voti compotes fieri posse non desperemus, ἢν δὲ μὴ, ἔσθ' ἂν δ' αἰ μάστιγι ὀχλῆσθαι, ἢ ἰχλῆσθαι. Aliter non conuenit temerè suscipere & exhibere molestiam. In vulneribus autem capitis non licet expectare. Septimum diem, aut tempus quo inflammationis impetus conquieuerit, quia periculum est, ne interim corrumpatur cerebrum. Cæterum quæ hîc præcipiuntur, peragenda sunt cum per initia ad ægrum curandum vocatus fueris, postea docebit, quid agendum sit, cum ab initio curationem non susceperis, neque enim eodem modo secandum os initio & alijs diebus.

Ἡν δὲ ὑποπίεσις μὲ τὸ ὅτεον ἐρρωγέται, ἢ πεφλασθαι, ἢ ἀμφοτέρω ταῦτα, τεκμαιρόμενος ὅτι ἰσχυρῶς τέτρωται ἐκ τῆς λόγων τῆς τρωμα-
Λα iiij

πίς, καὶ ὅτι ὑπὸ ἰσχυρῶς ὁ τραύσαντος, ἢ ἕτερος
 ὑπὸ ἑτέρου τραύτη, καὶ τὸ βέλος ὅτῳ ἐτραύτη, ὅτι
 τῷ χακούργῳ βελέων ἦν. ἔπειτα τὸν ἀνθρώπου
 ὅτι δίνος τὲ ἐλάβεν. καὶ σκότος, καὶ ἐκράθη, καὶ κα-
 τέπεσεν. τῶν δὲ ὅτω γινομένων, ἢ μὴ διαγι-
 νάσκῃς, εἰ ἔρρωγε τὸ ὅτεον, ἢ πέφλασαι, ἢ καὶ ἀμ-
 φότερα ταῦτα, μὴτε ἄλλος ὅρων διειδῇς, ὅτι τὰ
 ὅτεον τήκων τὸ μέλαι, δέυσας τὲ τῷ μέλαι φαρ-
 μάκῳ τῷ τηκόμενῳ τὸ ἔλκος, ὑποτρίνας ὁπό-
 νιον, ἐλαίῳ τέγξας, ἔτα καταπλάσας τῇ μάζῃ
 ὅπιδῃσαι. τῇ δεύσεραίῃ, σπολύσας καὶ ἐκκαθῆ-
 ρας τὸ ἔλκος ὅπιζῦσαι. καὶ ἢ μὴ ἢ ὑγιές, ἀλλ' ἐρρώ-
 γη καὶ πεφλασμένον ἢ, τὸ μᾶλλον ἔσαι ὅτεον λευκὸν
 ζυόμενον, ἢ δὲ ῥωγμὴ καὶ ἢ φλάσις, καταβαλέντος
 τοῦ φαρμάκου, δεξαμένη τὸ φάρμακον ἐς ἐαυτὴν
 μέλαι ἔον, ἔσαι μέλαινα ὅν λευκῷ τῷ ὅτῳ τῷ
 ἄλλῳ.

QUod si suspiceris os fissum, aut con-
 tusum, aut utroque modo læsum
 esse, coniecturam faciens ex vulnerati
 sermone, quod vehemēter sauciatus fue-
 rit, & à valido vulnus inferente, si alter
 ab altero fuerit læsus, quodque telum
 quo percussus fuit, ex genere malefico-
 rum sit. Quòd præterea vertigo superue-
 nit, oculi obcæcati sunt, sine sensu quasi
 dormiens iacuit, & concidit. Quæcùm

ita sint, si tamen perspectum non habeas, sit ne fissum os, aut contusum, aut utroque modo violatum, nec aliter oculis dignoscere possis, super os inducendum est atramentum scriptorium, plagæque nigro medicamento liquido oblinenda, linteumque oleo imbutum super tēdendum, & dein cataplasma ex diluta polenta imponendum, fasciisque alligandum: postridie autem resoluta & expurgato vulnere, os abradendum est, quod si non fuerit integrum, sed vel fissum, vel contusum, reliquum quidem os abrasum, album erit, fissura verò vel contusio quæ medicamentum nigrum dilutum imbibit, nigra conspicietur in alio osse albo.

CUm ex vulnerari responso, ex vulneris magnitudine, ex vulnerantis robore, ex teli genere, ex symptomatis superuenientibus probabile est os esse violatum, neque tamen osse nudato, noxa deprehendi potest, oculis, specillo, aut scalpro, post usum scalpri, vel atramentum scriptorium, vel nigrum medicamentum dilutum, super os inducit, plagæ linteum prætendit, oleoque madefacit, cum cataplasma ex polenta diluta imponit, & alligat, postridie verò iterum abradit, nigritiem continet si quid fissum aut contusum est. Hic autem locus apud Hippoc. Græcum, mendosus & corruptus apparet, ideoque

asterisco notatus, quem nos restituiimus nonnullis tantum literis immutatis, ut veteremlectionem tot sæculis totque doctorum medicorum calculis comprobata[m] retineremus. Ut etiam τὸ μέλαν χαρικόν, & τὸ μέλαν φάρμακον non mutarem, suadet Paulus qui libro sexto ad explorandam rimam angustam & capillarem sensum fugientem, infundit φάρμακον τὸ μέλαν ὕγρον ἢ καὶ αὐτὸ τὸ χαρικὸν μέλαν. pharmacum aliquod nigrum liquidum, aut etiam atramentum scriptorium. Cornelius item Celsus aperto vulnere, si ne tum quidem rima manifesta est, inducit super os atramentum scriptorium, deinde scalp[ro] id deradendum dicit, continet enim nigritiem, si quid fissum est. Galenus etiam in exegi linguarum Hippocratis hinc μέλαν φάρμακον legit, & in dictione μέλαν φάρμακον admonet hoc nigrum medicamentum ab Hippocrate describi libro περὶ ἐλκῶν, quod est vel Caricum vel aliud simile: quamvis etiam describat Hippocrates aliud μέλαν φάρμακον, in notis quæ adiecta sunt libro primo de morbis mulierum, quod fit ex squama æris, & flore acris, seorsim tritis, & simul mistis. Itaque nihil temere in authoribus obliterandum. Cum autem oleum ulceribus alienū sit, eaque reddat sordida, cumque oleum cranio humectando sit iuviticum, cur lintheum plagæ supertensum oleo in adfaciē non certē, ut quidam putant ad dolorem leniendum, qui osse, deducto pericranio, nullus esse potest, sed ad penetrationem atramenti, quod cum astrictione sit præditum, non penetraret in rimulas tenues & angustas, nisi adderetur oleum, quod cum acreum, humidum & tenuius h

partium sit, facile huc & illuc defluit. Itaque valeat Auicennas qui statim super fissuram oleum rosatum tepidum infundendum censet. Eousque autē olei rosati usus processit, ut Chirurghi quodlibet capitis vulnus ad satietatem & nauseam usque eo perfundant, quod contra Hippocratis præcepta fieri nemo non videt.

Ἀλλὰ χεὶρ αὐτῆς τὴν ῥωγμὴν τάντην φανέσθαι ὅτι ξέειν καὶ βάθος, καὶ ἢ μὴ ὅτι ξέειν τὴν ῥωγμὴν τάντην φανέσθαι μέλαινα ἐξέλκῃ καὶ ἀφανέει ποίησις, φλάσις μὲν γινέσθαι τὰ ὅσα ἢ μάλλον ἢ ἥσων, ἢ τις τῶν ἑρρηξέων καὶ τὴν ῥωγμὴν τὴν ἀφανισθεῖσαν ὑπὸ τῶν ζυγῶν. ἥσων δὲ φοβερόν, καὶ ἥσων ἀνὰ τῷ ῥωγμῇ ἀπὸ αὐτῆς γινέσθαι ἀφανισθεῖσιν τῆς ῥωγμῆς. ἢν δὲ καὶ βάθος ἢ, καὶ μὴ ἐτέλη ἐξέλκῃ ὅτι ξέειν, ἀφίκει ἐς τῶν ἢ τοιαύτην ζυμφορὴν.

I Terum autem rimam quæ nigra apparet, profunde radere oportet, quod si radendo rimam hanc quam nigram conspicis, exémeris, & cōspectu omnino summoueris, contusio quidem fuit ossis magis aut minus, quæ rimam hanc a scalpro detractam, interrupit. Sed minus verenda, minusque negotij exhibet rima eiusmodi delitescens. Sin autem profunda sit & abradendo non possit deleri, ferre vsum postulat ista calamitas.

C Vm inductum fuerit super os atramentum vel medicamentum aliquod nigrum, posteróque die resolutó & expurgato vulnere, si os abrasum fissuram aut contusionem in se habeat, nigritiem retinebit, quo loco fissum aut contusum erit, ideò nunc admonet, vt iterum rimam quam nigram intuemur, profunde abradamus. Sunt enim quædam rimæ superficiales, quædam quæ ad diploem vsque perueniunt quædam minus profundæ, tuncque conuenit tandiu rasuræ insistere, donec rimæ signum aboleatur. Cùm autem rima per totum os ad imum penetrat, tunc ferræ vsus necessarius est, vt saniei & lædentibus membranam pateat exitus. Hic locus subobscurus est, & à Vidio non deprehensus, quod vim verbi græci ἐπὶ τῆς οὐχὶ non considerarit. Sic enim transtulit, Collisum quidem os fuit magis aut minus, atque ob id etiam rima fissum, quã scalper detraxit. Alius ita vertit, Contusio facta est in osse, vel magis vel minus, quæ rimam fecit. Cornarius propius ad sensum Hippocratis accedit, sic, Contusio ossis aut magis aut minus facta fuit, quæ sanè etiam fissuram à scalpro rasorio deletam, rupit. Vult enim significare Hippocrates, non os ideo fissum, quod collisum, nec à contusione ossis fieri istam rimam, sed à contusione abrumpi, diripi, interfecari, reprimi. Cùm enim quod contunditur, in sese cogatur, fissurâ dirimit & intercidit, quod videre licet in plumbeis & æneis vasis, quæ colliduntur quidem & contunduntur, nec facile finduntur. Dixit quidem Hippocrates, antea, quodcumque telum os findit, idem etiam contundit os magis aut mi-

nus, & paulo post. Collidi & contundi potest os, nullaquē fissura contusioni adiungitur in osse.

Ἀλλὰ ζῆν ὀρίσαντα τὰ λοιπὰ ἰητρεύειν τὸ ἔλκος. φυλάσσεσθαι δὲ ζῆν ὅπως μὴ τι κακὸν ἀπολάβῃ τὸ ὅσπερ ἀπὸ τῆς σαρκὸς, ἣν κακῶς ἰητρεύηται. ὅσπερ γὰρ καὶ πεπορισμένῳ, καὶ ἄλλως ἐπιλωμένῳ, ὑγίει δὲ ἔονται, καὶ ἔχοντι τι σῖνος ὑπὸ τῷ βέλει, δοκέοντι δὲ ὑγίει εἶναι, κίνδυνός ἐστι μᾶλλον ὑποπύον γενέσθαι ἢ καὶ ἄλλως μὴ μέλλῃ, ἢ καὶ ἡ σὰρξ ἢ πείσσει τὸ ὅσπερ κακῶς θεραπεύηται, καὶ φλεγμαίνηται, καὶ πείσσει γίνεσθαι. πυρετὸς γὰρ γίνεται, καὶ πολλὰ φλογμὸς πλέον. καὶ δὴ τὸ ὅσπερ ἐκ τῆς πείσσει σαρκέων ἐς ἑαυτὸ θερμὸν καὶ φλογμὸν, καὶ ἀσθὺν ἐμποίει καὶ σφυγμὸν, καὶ ὅσα τὰ ἡ σὰρξ ἔχει κακὰ ἐν ἑαυτῇ, καὶ ἐκ τούτων ὧδε ὑποπύον γίνεται.

V Erum enim verò postquam ferra os aperueris, vulnere adhibenda curatio, cauendumque nequid detrimenti percipiat os ex carne perperam curati. Ossi enim aperto, aut alioquin carne nudato, sed integro, aut quamvis à telo violatum sit, sed integrum appareat, periculum imminet magis ne purulentum euadat, quod alioquin euenturum non esset, si caro ipsum ambiens male curetur, in-

flammetur & comprimatur: igneum enim euadit, multoque calore flagrat: etenim os ipsum ex ambiente carne, calorem, inflammationem, perturbationem, pulsationem in se contrahit, & quæcumque caro in se habet mala, & ab ijs sic purulentum euadit.

FRacturæ ubi carnis vulnus adijcitur, duplicem curationem admouet Hippocrates, initio tertie sectionis commentar. de fracturis. Sic etiam hoc loco, explorata ad vnguem ossis nudati fractura, cum os ferri excidendum docuit, non negligendam esse vulneris quod in carne est, curationem præcipit, quoniam os ambientis carnis mala in se facile contrahat. Curandi autem vulneris quod in carne est præcepta repetenda sunt ex libro de vulneribus. In curatione autem vulneris, quod in carne est, tria proponit, ex quibus ossa vitia protinus contingit, cum caro male curatur, inflammatur, & constringitur. Caro autem male curatur, cum medicus abstinentiam & aquam non imperat, cum sanguinem non mittit, cum aluum non purgat, cum vulnus non desiccât, sed nimium humectat, cum carnem contusam & contritam non celerrime suppurat, cum carnem supercrescere sinit. Inflammatur etiam caro ab iisdem neglectis, & præterea cum cataplasma non vicinis partibus impositum, sed oris plagæ receptum pus supprimit, dum caput multis operimentis oneratur,

dum linamenta, lintea copiosa iniiciuntur, quæ calorem mouent. Comprimitur caro ab arctioribus vinculis, a fasciis multis, & similibus. Sic etiam Hippocrates in fine sectionis secundæ commentariorum de articulis, vinculum quodlibet in fractura auris inimicum esse dicit, neque enim ita laxum circumdabitur, quod si magis astringatur, plurimum officiet, quandoquidem integra auris sub vinculo astricta dolet, pulsu vexatur atque inflammatione. Quomodo os fiat *ὑποπυρρὸν* & purulentum declarat postea Hippocrates cum agit de prognostico mortis. Os fieri dicit *πυρετώδες* febricitans, ut libro de vulneribus, sententiā quinta. Pus nominat *πυρεώδες* igneum. Sic sententiā octaua lib. 1. commentar. de fracturis, vlcus appellat *σφυγμώδες* & *πυρεώδες*, pulsu affligens & igneum, & Galenus in commentario inquit. Poterat Hippocrates vlcus dicere *πυρετώδες* febricitans, sed dixit *πυρεώδες* igneum, sumpto vocabulo ab igne quem *πυρ* vocant, quo ardorem, ut mea fert opinio, nobis reduceret in memoriam, quoniam & febris quæ *πυρετός*, Græcè nuncupantur, ab eodem vocabulo ducitur, quum nihil aliud sit febris quam igneus calor. Omnibus malis afficitur os, quibus caro vexari solet, inquit Hippocrates, quod ne mirum videatur, asserit os ex carne ambiente contrahere calorem, inflammationem, perturbationem, & pulsationem, addit postea sphacelum siue corruptionem, quæ mala per accidens ossi communicantur. Caro inflammata & putrescens, os vicium igneum & calidum reddit, eandem etiam & corruptionem inducit: veram autem inflam-

mationem non patitur os, sed inflammatorium
quid, & potius phlogosim, quam phlegmonem:
Dicit etiam perturbationem cadere in os. Est au-
tem *ἀρεστος* siue perturbatio, turbulenta motio &
pugna, quam in ventriculo affert ciborum va-
rietas, aliquando est cordis pulsatio & motio ex
vehementi exercitatione, hīc autem significat
agitatiōnem & *ταραχὴν* siue turbulentam motio-
nem quæ in ossibus oboritur. *Σφυγμὸς* siue pul-
sus, motus est cordis & arteriarum. Commenta-
rio verò in aphorismum 21. lib. 7. *σφυγμὸς* siue
pulsatio, molestus est quidam sensus & dolor,
arteriarum motione factus. Arteriæ quidem in
homine bene valente, sine dolore pulsant, cum
dolore verò quando oborta est inflammatio, aut
affectus aliquis phlegmonodes, aut abscessus, &
ὁ δὲ ὡν σφυγμῶδης ἢ σφυγματώδης, dolor pulsato-
rius, propriè & per se ad arterias pertinet, estque
inflammationi proprius, non omni quidem, sed
maiori. Pulsatio autem in osse, ad arterias, quæ
in diploe sunt, referri potest. Cū enim inter
duas cranij laminas contineantur venæ & arte-
riæ, cur non ibi pulsatio & suppuratio fieri po-
test:

Κακὸν δὲ ἐν ὕψει τε εἶναι τὴν σάρκα ἐν τῷ
ἔλκει, καὶ μυδαῖσαι, καὶ ὅτι πολλὸν χρόνον καθαί-
ρειται. ἀλλὰ χρόνιά πῦρον μὲ ποιῆσαι τὸ ἔλκος ὡς
τάχιστα. ὅτι γὰρ ἀνὴρ καὶ φλεγμαῖνοι τὰ πλεί-
οντα τὸ ἔλκος, καὶ τάχιστα καταρὸν εἴη. ἀνάγκη γὰρ
εἶναι τὰς σάρκας τὰς κοπέϊσας, καὶ φλασθεῖσας

ἔπειδ' ὁ βέλεος ἔποπύετο γινόμενας, ἐκτακῆναι.
 ἔπειδ' αὖ δὲ καθαρθῇ, ξηρότερον γὰρ ἡγνεῖσθαι τὸ
 ἔλκος. ὅπως γὰρ αὖ τὰ χυμὰ ὑγρὰ γένοιτο ξηρῆς σαρ-
 κὸς βλαστῶσης καὶ μὴ ὑγρῆς, καὶ ὅπως ἔκ' αὖ ὑπερσσω-
 κίση τὸ ἔλκος.

C Alamitosum etiam in vulnere car-
 nem humidam esse, & pernicioſa
 sanie madentem, & longiori tempore
 expurgari, sed ut quàm celerrimè vul-
 nus suppuret, elaborandum, sic enim
 minimè inflammabuntur vicinæ partes,
 ipsùmque purum citissimè reddetur, ne-
 cesse est enim carnes contritas & à telo
 contusas, in pus versas tabescere: postea
 cùm expurgatum fuerit, siccus red-
 datur vulnus necesse est. Sic enim statim
 sanum fiet, emergente carne sicca, non
 humida, sic etiam caro vulnere minimè
 supercrescet.

C Vm siccum ad sanum propius accedat, hu-
 midum ad non sanum, caro vulneris hu-
 mida, vulnus à sanitate longius abesse testatur.
 Caro etiam pernicioſa sanie madens, & nimia
 vligine marcescens, nimioque humore putref-
 cens, vulnus malignum ostendit. Galenus com-
 mentario in sententiam 20. lib. 2. de fracturis,
 cùm os ex toto corrumpitur, Veteres id vitium
 σπράκελον appellasse scribit, quod ubi carnosus par-

tibus accidit, alijs nominibus nuncupasse. Vocat etiam Hippocrates carnem tota substantia corruptam, *σείκη σαρρὰν, μύδωσιν, ἀπόμεινιν*, putridam humore vitioso madentem & marcidam. *Μύδωσις* etiam propriè est putredo earum partium quæ vitioso aliquo humore madent & defluunt. Periculosum est etiam vulnus longiori tempore expurgari, id enim arguit partis aut nativi caloris infirmitatem, aut humoris affluentis copiam & prauitatem, quod potissimum prouenit ex vulneris carne lacerata & contusa, expirat enim per vulnus calor natiuus, & ex perruptis venulis suffunditur sanguis, qui inhiberi non potest quominus putrescat, vnde elaborandum, vt quam celerrimè eiusmodi vulnus suppuret. Vbi autem suppuraerit, tollitur & vulneris & partium vicinarum inflammatio, imò & febris, ex Aphorismo 47. libri 2. Inflammatum autem vulnus, & quod iuxta est, cum ad suppurationem spectat, quod in suppuratione sanguis eo usque feruet & immutatur, donec putrescens conuertatur in pus, ait Hippocrates lib. *πρὶ ἐλκῶν*. Idem etiam declarat Galenus commentario in aphorismum 47. lib. 2. Dum pus conficitur fit dolor, extensa simul & calefacta præter naturam inflammata particula, febres sequuntur, vbi cor vitæ principium accensum fuerit, & hæc ambo contingunt ex quadam veluti ebullitione atque exustione sanguinis, qui vbi ex toto exustus fuerit, reliquū eius fit pus, quemadmodum ex lignorum exustione cinis. Necesse autem esse, carnem contusam & contritam a telo, putrefactam & in pus versam tabescere, deinde nouam creari, docuit

Hippocrates libro *περὶ ἐλκῶν*, & hoc etiam libro, cum ageret de telis quæ ossis findendi, collendi, & effringendi vim habent. Caro autem non supercrefcit ijs vulneribus quæ rectè, atque vt res postulat assidue purgantur, quæque siccis præfidijs curantur, nisi contusa sint, docet Hippocrates eodem libro *περὶ ἐλκῶν*, & Galenus lib. 4. Therapeut. cap. 5. Vulnus enim humidum plurimum solet generare carnis infirmioris, quæ supercrefcit, siccum verò & bene purgatum, minus quidem carnis sed siccioris & fir-
 minoris producit, vnde statim sanescit, sicque caro minimè supercrefcit.

Οὗ δὲ αὐτὸς λόγος, καὶ ὑπὲρ τῆς μῆνιγγος τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον. ἦν γὰρ αὐτὴ ἐκπερίσσει τὸ ὀστέον, καὶ ἀφελὼν ὑπὸ πᾶς μῆνιγγος ψιλώσας αὐτὴν, καθαρίων καὶ ποιῆσαι ὡς τάχιστα καὶ ξηρὴν, ὥς μὴ ὅτι πονίῳ χροῖον ψιλὴ εἶσσι μωδῇ τε καὶ ἐξαίρηται. τούτων γὰρ οὕτω γινόμενων, σαπῆναι αὐτὴν κίνδυνος.

EAdem quoque ratio est membranæ quæ cerebrum regit, nam si protinus secto osse & à membrana separato eam nudaueris, quàm celerrimè purganda & siccanda est, ne diutius nudata existens superfluo humore madeat & intumescat, quæ cum accidunt, periculum est ne putrescat.

Exciso osse rationem habendam dicit dura meningis, eamque citissimè siccandam & expurgandam esse, si enim diutiùs nuda relinquatur, aërique externo & insueto exponatur, faciliè corrumpetur. Quod etiam docet euenire omento Hippocrates, aphorismo 58. lib. 6. Si omentum exciderit, necessariò computrescit. Si vulnerato ventre extra corpus excidat omentum, nudatumque fuerit, aërique externo exponatur faciliè putrescit, cum enim omentum sit *πυλωδὲς ἢ ἰσώδης*, pinguis & nervosæ substantiæ, aëris occursum non fert, & quamvis vel minimo tempore nudetur, tamen putrescit, ait Galenus in commentario. Sic etiam dura & crassa cerebri meninx si post excisionem ossis, diutiùs nuda relinquatur, aërique exponatur, periculum est ne computrescat, citius tamen multo epiplooni quàm meninx, cum hæc siccior sit, illud humidius. Hic autem locus mutilus antea in Hippocrate legebatur, nos ex Hippocrate vocem *ψιλή* quæ desiderabatur restituumus, cum alij *ὕδαρ*, alij *οἰδέουσα* perperam legant, eadem enim hæc verba postea repetuntur, *οὐ γὰρ συμφέρει πλεονέκην ψιλήν εἶναι τοῦ ὀστέου ὅτι πολὺν χρόνον κατακαθούσιν, ἀλλὰ τελευτάδιον σάπη ἢ διαμυδῶσι*. non enim confert membranam vexatam diutiùs relinqui nudam, tandem enim putrido & fatido madore corrumpetur. Satim in codice veneto, Basilien- si, Parisiensi *μυδῶν* legebatur, in œconomia Hippocratis à Fœsio descripta *μυδῶν*, quàm lectionem probare non potimus. Scaliger *μυδῶν* legendum putat. Sed non conuenit cum

modo proximi verbi ἐξαιρῆται, itaque *μυδᾶν* legere malo, sine contractione, Ionica enim lingua nihil contrahit. Cæterùm Galenus commentario in sententiam 43. sectionis 3. de fracturis, docet etiam vulnus musculorum non esse nudandum sua cute. Scire licet, quæcumque cute conteguntur, hac eadem delectari, καὶ μὴ δὲν ἀεὶ λαβῶς γομνοῦνθαι, nihilque nudari innocenter. Nuda caro si sine cute relinquatur ægrè ad cicatricem perducitur, præterquam quòd morsum omnino sentit & redditur sordida. Membrana præterea quæ cerebrum tegit, iisdem etiam afficitur malis quibus os ipsū, nam ignea euadit, inflammatur, pulsatione agitur, purulenta fit, denique putrescit; imo & quândoque squamas ex se emit. Vnde fortasse dixit Hippocrates, eadem quoque est ratio membranæ quæ cerebrum tegit. Remedia quæ vim habent siccandi & expurgandi proposuit libro περὶ ἐλκῶν, quibus cerebri membranam, osse secto purgare & siccare licet. Nos ex Galeno, Celso, & Paulo, huius etiam curationis præsidia proponemus. Mēbranæ igitur cerebri post ossis sectionem, duplex apud veteres fuit purgatio, una quidem ἀεριοτάτη καὶ παρηγεῖλαιωτάτη, lenissima & blandissima, Altera ἡ τῶντις ἐναντιωτάτη, hinc penitus contraria, quæ perficitur per medicamenta vehementissimè siccantia. Tempore Galeni, Pergameni, atque adeo qui per totam Asiam, capitis ossa fracta perforabant, columbæ sanguinem in crassam cerebri membranā effundere solebant. Romani vero oleum ro-

faciem, scribitque Galenus se sexentos nouisse eorum quibus Romæ perforata fuerunt capitis ossa, nec quicquam ab usu rosacei, citra columbæ sanguinem offensos, verum id calidum sit, æque atque columbæ sanguis necesse est, circa principium 10. libri de simplicium medicamentorum facultatibus. Et hæc fuit lenissima curatio. Contrariam vero per siccantia laudabat Meges Sydonius, & Eudemus ciuis pergamenus, qui nudatæ membranæ ilico emplastrum quod Isis vocant, imponebat, & extrinsecus oxymel. Isis autem emplastrum describitur à Galeno lib. 4. *ἡ ἰς* circa finem, & à Paulo lib. 7. hoc modo. Squamæ æris, æris combusti, aristolochiæ rotundæ, singulorum 3. 8. aluminis scissi 3. 6. salis ammoniaci, thuris, guttæ ammoniacæ, singulorum 3. 8. myrrhæ, aloes, galbani, singulorum 3. 12. dracunculi radicis succi 3. 8. ceræ libra, resinæ colophonix, libræ duæ, olei veteris, vnciæ tres aceri quod satis est. Galenus in fine libri 6. methodi medendi, testatur Eudemum qui siccante curatione utebatur, plures sanasse, quàm qui blanda vterentur, concluditque, cum meatus auditorius cerebri duram membranam attingat, neruūque recipiat à cerebro, tamen vehementissima remedia tolerat, nihil mirum si post excisiones ossis, crassa meninx antequam *ἡ ἀσθὴν* inflammetur, vehementissimis gaudeat medicamentis, cum à natura sicca substantia constet, vnde colligimus, membranæ conuenire medicamenta sicca, cum neque dolore, neque inflammatione infestatur, ybi autem adhuc

dolor vel inflammatio, blanda & leni curatione esse vtendum. Vtraque etiam curatione vtitur Celsus, his verbis, his factis, quæ ad ossis excisionem pertinent, membrana acri aceto inspergenda est, vt siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur, siue intus concretus cruor remanet, discutiat, tum aliquod emplastrum quod caluarie causa componitur, aceto molli- tum, ipsi membranæ imponendum est, deinde eodem medicamento illitum linteolum, & præ- terea succida lana aceto tincta, collocandusque æger in loco tepido, & curandum quotidie vul- nus, bis etiam æstate. Quod si membrana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepida, si vsque eò tumebit, vt super ossa quoque emineat, coercebit eam bene trita lenticula, vel folia vitis contrita, & cum recenti vel butyro, vel adipe anserina mista, ceruixque molliri debet liquido cerato ex irino facto. At si parum pura membrana videbitur, par modus eius emplastri, & mellis miscendus erit, idque super infundendum, eiusque conti- nendi causa, vnum aut alterum linamentum injiciendum, & super linteolo cui emplastrum illitum sit, contegendum. Vbi plus pura mem- brana est, eadem ratione adiiciendum empla- stro ceratum, vt carnem producat. Paulus etiam tribus primis diebus blanda & leni vtitur cura- tione, post tertium diem siccante. Sic enim in- quit, post Chirurgiam qua os perforatur & au- fertur, panniculo simplici lineo vulnere æquali rosaceo madenti, cerebri membranam operie- mus, exiguumque lanæ floccum similiter rosac-

eo imbutum prædicto panniculo imponemus, deinde linamentum implicitum duplex in vino & oleo, aut ipso rosaceo tinctum, toti vulneri circumponemus, diligentia adhibita ne cerebri membrana grauetur, postea latiore vtemur ligamento, neque hoc astringentes, verum vt linamenta solum retineat, Victus adhibebitur, qui inflammationem arceat, & febribus peculiaris est, membra cerebri crebrius interea rosaceo superfusa. Post tertium diem, vbi vinculum solueris, & sordes spongia deterferis, remedium induces, quod cruentis iniicitur, & inflammationem repellit, super accommodans membranae aliquod ex cephalicis aridis, vsque dum carne oppleatur. Frequenter cerebri membrana post Chirurgiam inflammatur. Origo inflammationis, aut ex acuta quadam ossis eminentia pungente ducitur, aut ex linamentorum grauitate, aut refrigeratione, aut multo esu, aut vini potione, aut alia quadam occasione latente. Si ex manifesta occasione inflammationem contraxerit membrana, ea protinus amputanda est, sin ex latenti, magis pugnare conuenit, vtpote sanguinis missione, si causa non obstiterit, victu qui inflammationi congruat. Item loco induci remedia debent, calentis rosacei fots, & superfusio ex althææ decocto, aut fœnugræci, seminis lini, chamæmeli, similiumque. Cataplasmata vero ex cruda hordei farina, aut lini semine, cum prædicto decocto, & gallinarum adipæ, ad hæc fomentum ex lana adhibebitur. Capiti & occipitio, meatusque auditorio oleum aliquod inflammationem prohibens instillabitur. Si per

seueret inflammatio, & nihil aliud prohibet, medicamento cholagogo purgare ipsos Hippocrates præcipit, ait Paulus libro sexto. Non solum autem inflammatur cerebri membrana, sed aliquando vulneratur, ex eaque copiosus sanguis fertur, ex quo fluxu, si affatim fiat in cerebrum eiusque ventriculos, mortis certum imminet periculum. Itaque ad sanguinis fluxum cohibendum, ex aloë & thure pulueres præamus, diluimusque oui candido ad mellis crassitudinem, membranæ inspergimus, aut imponimus linamenta ex pilis leporinis aut ex xylo hoc medicamento tincta, quotidie mutamus, aut alternis dieb. Membranâ cerebri vulneratam egregiè glutinat calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inspersa, deinde butyrum & rosaceum, ac adeps suilla vetus insulsa tepe facta ac mistim infusa. Vt recenset Galenus, ex Archigene, secundo libro $\epsilon\tau\ \tau\omicron\alpha$. Recentiores infundunt huiusmodi puluerē qui habet colophonix drachmas tres, myrrhæ, aloës, mastiches, sanguinis, draconis ana drachmam vnâ, croci sarcocollæ ana drachmam mediam fiat puluis, & misceatur. Suppuratur aliquando membræ ex inflammatione statimque aperienda est, ne vomica rumpatur ad interiora, & in cerebrum feratur pus. Periculosa est eiusmodi suppuratio, periculosa etiam membranæ apertio, sed incertum periculum certa desperatione optabilius, & satius est anceps experiri remediū, quàm nullum. Rupto abscessu, statim infundimus mel rosatum cum oleo rosato, vel syrupum rosatū mistum sanguini columbæ, vel terebinthinam

cum melle rosato, deterſo prius pure ex membrana xylo vel linteo molliori. Quod ſi effluxerit inter cranium & craſſam meningem puris aut ſaniei copia, linteum molle duplicatum, his medicamentis imbutum, aut ſyrupo roſato, aut abſinchte imponendum, ſvt puri pateat exitus, vtque membrana non offendatur à cranio aſperiore propter exciſionem. Et quoties vulnus ſoluis & medicamentum imputas, iube vt ægrotus clauſis naribus & ore inſufflet & expiret, vt purgetur quod inter cranium & membranam continetur. Cerebri craſſa meninx diutius nudata, aërique expoſita, non ſecus atque os ſquamas emittit, tuncque primis quatuor diebus inſundimus oleum roſatum cum terebinthina, deinde poſt quartum diem poſſumus pulueres ſiccantes imponere, quemadmodum autem in oſſe, cùm natura ſquamas emiſerit, & quod ab aëre immutatum alioquin viciatum fuerit, ſepararit, apparet caruncula adhuc tenera, quæ tandem firmior & ſolidior fit. Idem accidit in membrana quæ cerebrum cingit, itaque inſpergentur pulueres ſiccantes ſine corroſione, ne conſumatur & tabeſcat eiufmodi caro.

Cerebri membrana ſi in ſuperficie nigra fuerit, medicamentorum uſu, mel triplum roſaceo miſcentes, & per linamenta id applicantes, curabimus, & deinceps reliqua admouentes. At ſi nigrities ſua ſponte prouenerit, idque in impoſſiſſimum, cùm alijs grauibus indiſciis, attingi tunc non debet, vt quæ natium calorem emortuum inuiuat. Ait Paul. lib. 6. Nigreſcit membrana vel à contuſione & ictu valido, vel à ſan-

guine effuso & concreto, vel ab aëre frigidiorē, vel medicamentis in id efficacibus, vel ex putredine, contra quæ singula propriis remediis purgandum.

Ὅτεν δὲ ὅτι δὴ σποσθῆναι δεῖ ὅτου ἄλλῃ ὀστέου ἕλκος ἐν κεφαλῇ γινομένη, ἑδρῆς τε ἑούσης ὃ βέλους ἐν τῷ ὀστέῳ, ἢ ἄλλως ὅπῃ πούλῳ ψιλωθέντος ὃ ὀστέου, ἀφίσταται ὅπῃ πούλῳ ἕξαιμος γινόμενον. ἀναζητεῖται γὰρ τὸ αἷμα ἐκ ὃ ὀστέου ὑπὸ τε τοῦ χροῦνου, καὶ ὑποφαρμάκων τῶν πλείστων. τάχιστα δ' ἂν σποσθῇ, εἴ τις τὸ ἕλκος ὡς τάχιστα καθήρας ξηραῖνοιτο λοιπὸν τὸ τε ἕλκος καὶ τὸ ὀστέον, καὶ τὸ μείζον καὶ τὸ ἥσσον. τὸ γὰρ τάχιστα σποσθῆναι καὶ σποσθῆναι, ἐν τούτῳ μάλιστα ἀφίσταται σπὸς ὃ ἄλλου ὀστέου ὃ ἐναίμου τε καὶ ζῶντος αὐτέου, ἕξαιμόν τε γινόμενον καὶ ξηρὸν τῷ ἐναίμῳ καὶ ζῶντι μάλα ἀφίσταται.

OS autem quod ab alio quouis osse abscissurum est, capite vulnerato siue teli vestigium in osse appareat, siue alioquin multum denudatum sit os, abscedit tunc cum admodum exangue factum est. Sanguis enim exhauritur ab osse & tempore & multis medicamentis. Celerrimè autem abscesserit, si quis vulnus ipsum citissime purgaue-

rit, & deinceps ipsum vulnus, ipsumque os siccauerit, idque magis aut minus. Quod enim celerrimè resiccatum est, & in testæ modum induruit, ideo maximè ab alio osse sanguinem habente & viuente abscedit. Quodque exangue & aridū est, ab eo quod sanguinem habet & viuit, potissimū separatur.

D Ocuit Hippocrates quando ferra sit os excidendum, eoque exciso non esse neglegendum vulnus carinis, cum carnis mala ossibus facile cōmunicentur, præterea cum osse secto & a mēbrana separato necesse sit mēbranā nudari admonuit prōtinus membranā esse purgandam & siccandam, nec diutius nudam relinquendam. Iterum redit ad ossis curationem, sine qua nec regi membrana, nec vulnus carne impleri aut agglutinari potest. Os autem capitis siue a telo violatum sit, siue aeri expositum, necessario squamas ex se emittit, & ab alio osse abscedit. Recedunt autem ab osse aliquando tenues admodum partes, aliquando maioris ossis portio aut fragmentum, appellat Hippocrates ἀπὸσπασθεῖς καὶ τὰ λεπτὰ ὀστέων, καὶ μείζονος ὀστέου, tenues partes ab osse recedentes, vel grandius fragmentum ab osse abscedens, sententia 20. & 21. sectionis tertiæ de fracturis, abscedit os, quū exangue factum est, quod enim exangue est, nutrimento caret, quodque non nutritur, emoritur, itaque

exanguis & arida superficies mortua est, omnem autem mortuum à viuo separandum. Cognoscimus inter abradendum superficiem ossis viuere, quando sanguinem emittit, ex osse enim viuente flores emittuntur & carunculae quaedam, quae ad agglutinationem plurimum faciunt. Celsus idem dicit euenire osse adusto, cap. tertio libri octauo, si quod os, inquit, adustum est, à parte sana recedit, subitque inter integram atque emortuam partem caruncula, quae quod abscessit, expellat, eaque fere quia testa tenuis & angusta est, squama est, id λεπίς à græcis nominatur. Os fit exangue cum alimento & sanguine destituitur, quod temporis spatio fit, & usu medicamentorum cephalicorum citius contingit. Itaque cum voluerimus os læsum ab integro recedere, vulnus purgandum est, deinde & ipsum & os etiam siccandum. Quod autem resiccatum est & in testæ modum induruit, non solum exangue, sed etiam mortuum redditur, ideoque facile separatur à reliquo osse viuente & sanguinem habente. Hoc in contextu ἀποσπᾶκος retinui, quod præcedentem vocem oculis quasi subiicit, illud autem λεπτικὸν ἀποσπᾶκος pro ἀφίστακος probare non possum, est enim ridiculum, dicere os quod iam abscessit, abscedere, circa finem huius contextus nihil volui delere, sed mallet legere τὸ ἐναίμιον καὶ ξύνητος μάλα ἀφίσταται.

Ὅσα δὲ τῶν ὁσίων ἐσφλᾶται ἔσω ἐκ τῆς φύσεως τῆς ἐαυτοῦ καταρράγοντα, ἢ καὶ διακοπέντα πάνευρέα, ἀκινδυνότερα τὰ τοιαῦτα γίνε-

ται, ἐπὶ τῇ μὲν γὰρ ὑγίης ἢ. καὶ τὰ πλεόσιν ῥωγμῶ-
 σιν ἐσκατὰ ῥρα γένετα, καὶ εὐρυτέρησιν, ἐπὶ ακινδυνό-
 τερα καὶ εὐμαρέστερα ἐς τὴν ἀφαίρεσιν γίνετα. καὶ
 ὁ γὰρ ὁρίειν τῷ τοιούτων ὁδὸν, ὁ δὲ ακινδυνεύειν τὰ
 ὅτ' αὖτε πειρώμενον ἀφαίρειν ὧρὴν ἢ αὐτόματ' ἐπαίνει,
 ὑμέος ὧρῶτον χαλάσαντος, ἐπ' ἀνέρεται δὲ τῆς
 σαρκὸς ὑποφυομένης. ὑποφύεται δὲ ἐκ τῆς δι-
 πλῆος τῶ ὅσ' ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ ὑμέος, ἢ ἢ ἀνωθεν μοῖρα
 τῶ ὅτ' ἐξ μοιρῆ σφρακίση. ὅτ' αὖτε τὰ χεῖρα ἢ τε
 σπέρξ' ὑποφύοιτο καὶ βλαστάνοι, καὶ τὰ ὅτ' αὖτε ἐπα-
 νίοι, εἴ τις τὸ ἔλκος ὡς τὰ χεῖρα διάπυον ποιήσας, χα-
 ραρόν ποιήσεται. καὶ ἢν διὰ παντὸς τῶ ὅσ' αὖτε ἀμφοῖ
 μοῖρα ἐσφλασθῶσιν ἔσω ἐς τὴν μὲν γὰρ, ἢ τε ἀνω
 μοῖρα τῶ ὅτ' ἐξ καὶ ἢ καὶ τῶ, ἢ τε ἐκοντὶ ὡσαύτως τὸ ἔλ-
 κος ἢν τὰ χεῖρα ἔσται, καὶ τὰ ὅτ' αὖτε τὰ χεῖρα ἐπ' ἀνέεισιν
 ἔα ἐσφλασθῆναι ἔσω.

Q Væcumque autem ossa defidunt è
 suo statu effracta aut dissecta val-
 delata, minus eiusmodi periculosa sunt,
 vbi membrana fuerit integra. Et quæ
 multis fissuris & latioribus perfracta
 sunt, multò etiam minus sunt periculo-
 sa, & facilius auferuntur nihilque horum
 ferra excidendum, neque periculum sub-
 eundum est enitendo detrahèrè ossa,
 priusquam sponte sequantur, sano osse
 primùm relaxante, recedunt autem su-

percreſcente carne. Caro ſubnaſcitur ex oſſis diploe, & ex oſſe ſano, ſi ſuperior oſſis pars ſola fuerit corrupta. Sic verò quàm celerrimè & caro ſubnaſcetur ac producet, & oſſa recedent, ſi quis vulnus ſtatim purulentum reddiderit & expurgarit. Sicque totius oſſis pars vtraque ſuperior & inferior effracta deſidat ad duram meningem, modo curatio ſimilis adhibeatur, & vulnus ipſum celerrimè ſaneſcet, & oſſa intro effractę ſtatim ſequentur.

Paradoxon quoddam proponere videtur Hippocrates, nempe effracturam aut valde patentem diacopen, inuiolata meninge, exigui eſſe momenti, oſſa etiam multis & amplioribus rimis perfracta minèſ eſſe periculofa, cùm antea dixerit, anguſtas & capillares fiſſuras, & contuſiones ipſas periculofas eſſe, quòd non ſine aſpectabiles, neque ſtatim poſt ictum, neque ijs diebus, quibus opis aliquid contra mortem homini poſſit afferri. Idem etiam ſcribit libro de locis in homine, ἢν μὲν τὸ ὀστέον τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν χεῖρα συντεταμένον, ἀκίνδυνον, ἢν δὲ ῥαγὴ καὶ ῥωγμὴ ἐγγένηται ἐπικίνδυνον. Si os capitis fractum ac contritum ſit, periculo vacat, ſi verò fractum ſit ita ut adſit rima, periculofum. Idcirco verò inſignis effractura & ampla diacope periculo vacat, quòd ſtatim à medico dignoſcantur, quòd ſerrę uſum non requirant, quòd oſſa facile detrahant.

tur, quod pateat exitus saniei, & alijs la dentibus membranam. Fissura verò angusta & contusio medici visum & intellectum fallunt, ferræ vsum requirunt, vt sanies exitum habeat, vtque excidatur quod membranam cerebri vrget, eiusmodi autem curationes quæ periculosæ videntur, nec sunt, libenter suscipiendas esse monet Hippocrates sententia 37. sectionis 4. commentar. de articulis, quia magis terrent dum accipiuntur, quam dum adhibentur. Sic iugulum ex toto fractum videtur malum graue & ægre sanabile, contra fractum in longitudinem, leuius, quod tamen secus se habet, iugulum enim ex toto fractum facilius curatur, in longitudinem ægrius, circa finem sectionis primæ commentar. de articulis, multa etiam alia, inquit Hippocrates sententia 54. sectionis 3. commentar. de articulis, in medica arte quis inspiciet, quorum quæ vehementia sunt, quum morbi momentum omne in se continent, non nocent: quæ leuiorem offensam afferunt, mala concitant diuturna, & reliquum corpus plurimum afficiunt, quod accidit costis fractis, in quibus si fractura simplex & sola sit, in qua costa fracta non nudetur superiecta carne, nec scindatur membrana quæ costas cingit, casus quidem asperior videtur, licet leuior sit, quam vbi atteritur, celerrimè enim curatur, & sine periculo, sed absque fractura, vbi caro circa costas atteritur, in maximo interdum periculo sunt, qui sic affecti sunt, vt statim post docet Hippocrates & Galenus in commentario. Consulit autem hoc loco, ne magno conatu, aut ferramentis ossa detrahamus, sed expectemus

ut facile & sponte sequantur, osse sano primum remittente & relaxante. Hic omnes codices legunt, εἰκὸς ὀφθαλμὸν χαλαρῶσαι. Admonuit me Boissonadus medicus doctissimus Collega & coteraneus meus, illud εἰκὸς pro ὀφθαλμῶ, malè insertum fuisse, quam lectionem maximè probo, illūque sua laude fraudare nolo. Os autem abscessurum a carne subnascēte expellitur. Signa autē quæ denūciant os, quod carne vulnerata tegitur, abscessurum, demonstrat Hippocrates sententia 18. sectionis tertiæ comment. de fracturis, his verbis, denunciat futurum esse, ut recedant, pus quod ex ulcere amplius profluit, & videtur ὀρῶν & ad exitum festinare. Galenus illud dilucidius explicat in commentario, ubi copiosius, quam pro ulceris magnitudine pus profluit, verendum est ne subiectum os vitiatum sit, sed si præter id videtur turgere, hoc est, si festinanter à vitiata parte expellatur, iam certa res est. At unde cognoscemus partem festinare ad expellendum? primum ex oris plage, quæ inter se non committuntur, sed dehiscunt & inuertuntur, deinde ex ægrotantis sensu, qui exiguum quendam motum sentire, sibi in profundis partibus videtur, ubi cæteras non animo, non sensu aduertens, hanc unam observat, cui hæc superveniunt. Unde producat & suboriaturo caro, & quomodo celerrimè subnascatur, curvè ossa facile sequantur, ex Hippocratis verbis luce meridiana clarius est. An verò cum os abscesserit, cicatrix cana inducatur, ut ait Hippocrates libro ἐν ἰσχνῶν sententia 14. & Aphorismo 45. lib. 6. & quomodo restituatur, vide commentarium in eandem sententiam 14.

Τῶν δὲ παιδίων τὰ ὁτὲρὰ καὶ λεπτότερα ὄντι καὶ
 μαλακώτερα διὰ τὸτο, ὅτι ἐναιμιώτερα ὄντι, καὶ
 κοῖλα, καὶ ὅτε σκληρώδεα, καὶ ὅτε πυκνὰ, ὅτε στερεὰ,
 καὶ ὑπὸ τῇ βελέων ἴσῳ τὲ ὄντων, καὶ ἀσθενετέ-
 ρων, καὶ τρωθέντων ὁμοίως τὲ καὶ ἥσων, τὸ δὲ νεωτέ-
 ρα παιδί, καὶ μάλλον καὶ θάσσον ὑποπίσκειται, ἢ
 τὸ τῷ παρεσβυτέρῳ καὶ ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ. καὶ ὅσα
 ἀν' ἄλλως μέλλη ἀποθανεῖσθαι ἐκ τῆς τρώματος, ὁ
 νεώτερος τῷ παρεσβυτέρῳ θάσσον ἀπόλλυται.

PVerorum ossa tenuiora sunt & mol-
 liora, quoniam plus habent sangui-
 nis, & caua sunt, non dura, non densa, ne-
 que solida. Et si à telis paribus vel infir-
 mioribus æqualiter & leuius vulneretur
 iunioris pueri os, magis & citius puru-
 lentum redditur, quam senioris, & bre-
 uiori tempore. Quòd si ex vulnere alio-
 quin moriturus sit, iunior citius morie-
 tur, quàm ætate prouectus.

EXtremæ dementiæ est putare communem
 quandam esse omnium hominum curatio-
 nem. Ratio enim & experientia confirmant nō
 omnem naturam eadem medicamenta require-
 re, sed infirmiores mollioresque mitiora, vali-
 diores siccioresque valentiora, ait Galenus li-
 bro 3. methodi medendi. cap. 7. Idcirco nunc
 Hippocrates agens de ossibus suppurandis, vel
 refic-

ficcandis, puerorum ossa molliora, tenuiora, humidiora rariora esse dicit, eaque magis & citius purulenta reddi, calida enim & humida citius putrescunt, omniaque remedia quæ calefaciunt & humectant pus celerrimè mouent, vt docet Galenus libri quarti methodi medendi capite quinto. Ossâ in pueris nuper natis tanquam cerea sunt, estque summa in eorum corpore humiditas, ita vt prima hominis ætas sit calidissima & humidissima, postrema nempe senilis siccissima & frigidissima, ait Galenus 2. de temperamentis. Cæterum quod ait vulnus alioquin mortiferum, iunioribus citius mortem afferre, quam ætate prouectis, controuersia non videtur carere. Confert enim aliquid vulneribus ætas, quia facilius sanescit puer vel adolescens, quam senior, Ex celfo libri 5. cap. 26. Aristoteles etiam problemate 7. sectione 32. probat vlcera iuniorum promptius agglutinari, quam seniorum, quod partes calidiores & humidiores consolidari facilius possunt, vt apparet in plantis tenellis, & viridibus, in quibus coïtus & corporum vnio facilius peragitur. Galenus etiam commentatio in Aphorismum 42. lib. 7. scribit senibus mala omnia peiora & grauiora esse solere, propter ætatis imbecillitatem: hoc quidem in carnis vulneribus & alijs plerisque morbis locum habet, in cranijs tamen fractura, ex vulnere lethali citius morietur Iunior, quam senior, propter ossis mollietatem & infirmitatem, quod minùs & ictui & putredini resistat. Et si quis rursus obijciat ex Hippocrate circa finem sectionis primæ commentario de articulis. Sanescere citò iugulum

fractum, atque alia ossa quæcumque rara sunt, ideóque puerorum ossa, quæ caua, rara, & spongiosa sunt, celeriter etiam sanescere posse. Dic Hippocratem hoc loco de conglutinatione iuguli propriè loqui, quæ etiam facilis & prompta est in ossibus raris sed in fractura cranij puerorum, non est commoda eiusmodi conglutinationis, quum os ferræ vsum requirat, vtitur etiam eo loco Hippocrates, verbo *συμψύεται*, quod non propriè significat, sanescit, sed coalescit & conglutinetur. In codice Aldino lego *σκληρῶδεα*, in alijs omnibus *σπερμαγῶδεα*, retinui *σκληρῶδεα* vna cum Vidio, quia tamen dictionem hanc non alibi reperiō, vel *σκληρῶ* legendum suspicor, vel vna cum alijs codicibus retinendum *σπερμαγῶδεα*, detracta negatione *οὐτε*. tunc enim sensus quadrabit. Puerorum ossa tenuiora sunt & molliora, quoniam plus habent sanguinis, & caua & spongiosa sunt, non autem densa, neque solida.

Ἀλλὰ καὶ ἡν ψιλῶς ἢ τῆς σαρκὸς τὸ ὄψέον
 προσέχοντα τὸν νόον πειρῆσθαι διαγινώσκειν, ὅτι
 μὴ ἐστὶ τοιοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν καὶ γινῶναι, εἰ ἔρρωγε
 τὸ ὄψέον, καὶ εἰ πέφλαται, ἢ μὲνον πέφλαται. καὶ
 εἰ ἔδρης γενομένης τῆ βέλεος πρὸς σεσι φλάσις ἢ
 ῥωγμὴ, ἢ ἀμφω ταῦτα. καὶ ἡν τὸ τούτων πεπόνθη τὸ
 ὄψέον, ἀφείναι τὸ αἵματος τευπῶντα τὸ ὄψέον σμι-
 κρῶ τευπάνω φυλασσόμενον ἐπ' ὀλίγον. λεωτό-
 ιeron γὰρ τὸ ὄψέον, καὶ ὅτι πολαιότερον τῶ νέων ἢ
 τῶ πρεσβυτέρων.

V Erum si carne nudatum os fuerit, oportet omni animi contentione in eam curam incumbere, ut dignoscamus quod oculis videre & cognoscere non licet, fissumne sit os & contusum, an solum modò contusum, & si, relicto teli vestigio, accedat contusio aut rima, aut vtrumque & si aliquo horum violatum sit os, extrahendus est sanguis osse parua terebra perforato, sæpiusque foraminis altitudo considerata, est enim tenuius, minúsque profundū puerorum os, quàm seniorum.

D Ocuit antea Hippocrates in genere, nulla habita ætatis ratione, in contusione obscura siue manifesta, in rima latente siue perspicua: in sede etiam cui adiuncta sit rima & contusio, ad ferram esse veniendum. Idem admonet nunc etiam in cranijs puerorum esse obseruandum, sanguinemque qui per eiusmodi noxas ad meningem confluxit, esse extrahendum. Circumspectiùs tamen & maiori cura perforandum & excidendum est os puerorum. Itaque parua & exigua terebra vtendum est, eaque lentius du-cenda, sæpius attollenda & foraminis altitudo considerata, ut quandocunque os perrumpitur sentiamus, caueamúsque ne mucrone membrana cerebri lædatur, ex quo graues inflammationes cum mortis periculo suboriuntur. Cùm enim ossa puerorum tenuia sint, minúsque alta

& profunda, si quis terebram magnā adhibeat, audaciūque impellat, & grauius imprimat, nec sæpius remoueat, ad os obseruandum, faciliè cerebri membranā violauerit. Somniat autem interpres ille, qui putat Hippocratem hīc ex professo fracti ossis apertionem, vt fieri debeat, præscribere, sanguinēque prius mittere, ne ex apertione inflammatio accersatur, & medicamentū aliquando exhibere, quem tamen admonuerat Vidius initio commentarij, animaduersionem ponere Hippocratem in osse puerili..

Οἷς δὲ μέλλει ἐκ τρωμάτων ἐν κεφαλῇ σπο-
θῆσκειν, καὶ μὴ δυνατὸν αὐτὸν ὑγῶ γενέσθαι, μὴ δὲ
σωθῆναι, ἐκ τῶν δὲ τῶν σημείων χρὴ τὴν διάγ-
νωσιν ποιεῖσθαι ὅτι μέλλοντος σποθῆσκειν, καὶ περ-
λέγειν τὸ μέλλον ἔσεσθαι. πάσχει γὰρ ταῦτα. ὅπουται
τις ὁστέον κατεηγὸς, ἢ ἐρρωγὸς, ἢ περπλασμένον, ἢ
ὀτωριῶν πρόσθεν κατεηγὸς ἐννοήσας ἀμαρτή, καὶ
μήτε ξύση, μήτε ὀρίση, μήτε δεόμενον, ὡς ὑγιὲς
ὄντος ὅσπερ, περὶ τῶν τεσσάρων καὶ δεκά ἡμέ-
ρων πυρετὸς ὀπιλήσεται ὡς ὀπιπολὺ ἐν χειμῶνι,
ἐν δὲ τῷ ἔρει, μετὰ τὰς ἐπὶ αἷμα ἡμέρας ὁ πυρετὸς
ὀπιλαμβάνει. καὶ ἐπειδὴν τὸ γένηται, τὸ ἔλκος
ἀχρὸν γίνεται, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἰσχυρὸς σμικρὸς. καὶ τὸ
φλεγμαῖνον ἐκτεθνήκεν ἐξ αὐτοῦ καὶ γλισχρῶδες
γίνεται. καὶ φαίνεται, ὡς περὶ τὰς χροῖας, χροῖον πυρ-
ρὸν, ὑποπέλιον, καὶ τὸ ὁστέον σφακελίζειν τήν-
καὶ αὐτὰ ὀρᾷται, καὶ γίνεται ὀρκνὸν λευκὸν ὄν. τε-

λευταῖον δὲ ἔπαχρον γινόμενον ἢ ἐκλευκον. ὅτ' ἀν
 δ' ἤδη ὑπὸ πυρὸς ἢ, ὅπῃ τῇ γλώσσει φλυκταῖναι
 γίνονται, καὶ ὡς φρονέων τελευτᾷ, καὶ σπασμὸς
 ὀπιλαμβάνει τὰς πλείους τὰ ὅπῃ θάτερα ἔ
 σώματος. ἢν μὲν ἐν τῷ ἑω' ἀριστερὰ τῆς κεφαλῆς
 ἔχη τὸ ἔλκος, τὰ ὅπῃ δεξιὰ ἔ σώματος ὁ σπασμὸς
 λαμβάνει. ἢν δ' ἐν τῷ ὅπῃ δεξιὰ τῆς κεφαλῆς
 ἔχη τὸ ἔλκος, τὰ ἐπ' ἀριστερὰ ἔ σώματος ὁ σπασμὸς
 ὀπιλαμβάνει. εἰσὶ δ' οἱ καὶ ὑπὸ πληκτοὶ γίνονται,
 καὶ ὅπως ὑπόλλυνται ὡς ἐπὶ ἡμερέων ἐν θέρει,
 ἢ τεσσάρων καὶ δέκα ἐν χειμῶνι. ὁμοίως δὲ τὰ ση-
 μεῖα ταῦτα σημαίνει, καὶ ἐν ὡρεσβυτερώ ἐσσι τῷ
 τρώματι, ἢ καὶ ἐν νεωτέρῳ.

C Vm verò aliquis ex capitis vulne-
 ribus moriturus est, neque sanesce-
 re, seruarique potest, his notis colliges
 moriturum, prædicésque quod euentu-
 rum est. Hæc enim ei accidunt. Quo-
 tiescumque aliquis os fractum, aut fis-
 sum, siue contusum, aut alio quouis mo-
 do fractum percipiens deliquerit, neque
 abraferit, neque serra aperuerit, neque
 quod opus erat præstiterit, tanquam os
 integrum esset, ante decimum quartum
 diem febris superueniet hyeme vt pluri-
 mum, æstate verò post septimum diem
 febris inuadit. Quòd cùm acciderit,

vulnus fit decolor, ab eoque sanies pauca effluit, quodque ex ipso inflammatum est moritur, & glutinosum fit, & apparet tanquam caro sale condita, colore ruffo, subliuido, tūmq̃e corrūpi os incipit, & nigrū fit, quod fuit albū, tandē supallidū aut albidū euadit. Cū verò iā purulentum fuerit, in lingua pustulæ suboriuntur, & cum delirio moritur. Plurimosque conuulsio corripit in altera corporis parte, ac si parte sinistra capitis vulnus fuerit, dextram corporis partem occupat conuulsio, sin autem dextra capitis parte fuerit vulnus, sinistra corporis pars conuulsione tentatur. Sunt verò qui apoplectici fiunt, atque ita pereunt ante septimum diem æstate, aut ante decimum quartum hyeme. Hæc verò signa idem significant & in vetusto vulnere & in recenti.

Prudens hominis est, eum qui seruari non potest, non attingere, nec subire speciem eius vt occisi, quem fors ipsius peremit, ait Celsus libri 5. capite 26. Et Hippocrates libro *de viis*, suadet ne victis à morbo, manus admoveamus, medicus autem prænoscens & prædicens morituros, *ἀναισθητός* est & culpa vacat, ex primo prognostico. Itaque indicia & notas mortis

in vulneribus capitis nunc proponit. Primum autem mortis indicium, in tromate capitis malè curato, aut neglecto, febris est superueniēs hyeme, ante decimum quartum diem, vt plurimum, æstate verò post septimum. Solet etiam febris inuadere primis diebus ob dolorem, inflammationem, aut suppurationem, quæ non est ita periculosa, febris enim terrere non debet si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet, illa periculosa est, quæ vltra tempus inflammationis durat, vel delirium mouet, ait Celsus lib. 5. cap. 26. Præterea vt scribit Hippocrates sententia 33. sectionis tertiæ commentariorum de fracturis, Vulnere pleraque tertio aut quarto die pariunt exacerbationes & recrudescunt, tum quæ inflammatione tum quæ impuritate & for-
dibus tentantur, tum quæ febrem inferunt. Cum autem septem dies aut paulò plures transierint, opportunissimum inflammationis & febris tempus præterijt, ex sententia 36. & 42. eiusdem sectionis de fracturis. Si ergo post septimum diem æstate, aut ante decimum quartum diem hyeme, superueniat febris, terrere medicum debet, suspicio enim non levis est, eiusmodi febrem excitari à corruptione cerebri, membranæ, aut cranij, tuncque potissimum cum alia sinistra signa comitantur, quæ Hippocrates recenset, vt vulnus malè coloratum, vulnus autem illud sinistrum est cuius color liuidus, aut pallidus, aut varius, aut niger est, Album enim aut rubicundum esse vulnus commodissimum est, Celso lib. 5. capite de ratione victus & notis vulnerum. Ab eo vulnere profluit pauca sanies, vnde vulneris *καχονέδωκε*

colligitur. Cum enim tria ex vulneribus procedere soleant, sanguis, sanies, pus. Exit sanguis ex vulnere recenti aut sanescente. Pus ex vulnere iam ad sanitatem spectante. Sanies autem ex malo ulcere profluit, eaque pauca, quia cum pars iam corrumpi incipiat, facultas attractrix paucū ad se trahit alimentū, pars inflāmata & alimentō destituta, emoritur, fitq; glutinosa & pinguis, à carnis consumptione & colligatione. Hic Etorianus videtur legisse ἔλκος ἐλκυσσῶδες, vulnus lento humore sordidum & turgescens, sed in meis quinque exemplaribus græcis γλιγῶδες legitur. Apparet deinde tanquam caro sale condita, quia redditur vlcus siccum & aridum, non solum excrementis, sed & propria substantia. Sic dixit prognostico 18. lib. primi, In homine morituro vlcus, si aliquod sit, reddiliuidum aut siccū, aut pallidum & siccum. Color autem rufus qui in vulnere apparet, medius est inter flauum & pallidum, sequiturque calorem & siccitatem. Deinde subliuidus fit, cum calor natiuus suffocatur & extinguitur, tunc os incipit σπικερίζειν & corrumpi. Omnibus enim malis afficitur os, quibus caro vexari solet, vt paulò ante dixit, quo tempore nigrum fit, quod erat prius album, lego enim hic, λευκὸν ὄν, cum legant alij λεῖον ὄν. facilis enim fuit scribentis lapsus, si quis autē mali retinere, λεῖον ὄν legat antè, κερχόν, sicque conueniet sensus. Os enim secundum naturam læue est & æquale, cū verò cariem sentit, fit asperum. Subpallidum tandem & albidum euadit os, quia inflammatio sanguinem omnem exhaurit, vt etiam ligna humiditate omni ab igne consumpta

in cinerem mutantur, cuius color subpallidus aut albicans est. Tunc os purulentum dicit Hippocrates, quæ enim suppurant albidiora euadunt, cum pus cinerei coloris sit, Galeno commentario in sententiam. 32. sectionis 2. de fracturis, hic autem ἑκλευκον albidum dixi, quasi ὑπόλευκον subalbidum. Sic lienosi lenticolores apud Hippocratem 2. epidem. ἑκλευκοι dicuntur, qui idem tertio epid. ὑπόλευκοι nominantur, unde apparet ἑκλευκον aliquando subalbidum significare. Cumque purulentum os fuerit, in lingua pustulæ nascuntur, ex cerebro enim defluit sanies acris, quæ in lingua subsistens, pustulas eiusmodi excitat, quo tempore delirium superueniens, consumpro per inflammationem cerebro aut corrupto, ad ultima ventum esse testatur. Magnis autem capitis vulneribus peculiare symptoma est conuulsio, itaque plurimos corripit conuulsio in altera corporis parte. Cur autem conuulsio occupet dextram corporis partem, si capitis sinistra pars sit violata, aut contra, causam se nescire fatetur ingenuè Vidius. Sunt qui putent in opposita & sana parte fieri conuulsionem ab inanitione & penuria humorum & spirituum. Cum enim in parte læsa sit acerrimus dolor, humores & spiritus partis oppositæ, ut suppetias ferant, ad eam concurrunt, sicque exhausta remanet pars sana, & idcirco conuulsione tentatur. Verum dices conuulsionem de qua hic loquitur, quæque mortis certissimum est indicium, superuenire carnis gangrenæ, & ossis sphacelo, quo tempore sanies mali odoris ex parte læsa in sanam defluit, vapor item malignus & putridus ex parte corrupta

promanans partem sanam afficit, hinc fit ut opposita pars, cuius sensus integer est & exactus, ad expellendum quod est molestum sese concutiat, hincque nascatur convulsio. Addit Avicennas lib. 3. sen. 1. tract. 3. cap. ultimo resolutionem accidere parti læsæ, his verbis, In vulneribus peruenientibus ad panniculum cerebri, accidit laxitas in latere vulnerum & spasmus in opposito eius, quod intelligendū est superuenire morituris, cum iam adest carnis gangræna aut ossis sphaelus aut cerebri corruptio, tunc enim spiritus animalis ad partes inferiores eiusdem lateris descendere non potest, & si fortasse liberum etiam habeat aditum, vim tamen sentiendi & mouendi partibus non communicat, cum sit omnino impurus, & à partium ex quibus profluit corruptione labefactatus, vnde pars è latere vulnerum paralyti tentatur. In non morituris contra sepius euenit, videmusque per multos cadere in resolutionem partis integræ, offenso capite. Apoplexia quæ est repentina motus & sensus priuatio, omnisque animalis functionis, si statim ab ictu hominem corripiat aut paulo post superueniat, ægrotum de medio tollit. Apoplexiæ nomen apud Hippocratem non solum totius corporis motus, sensus, mentisque resolutionem significat, sed aliquando etiam partis alicuius ἀκίνησίαν ἢ ἀνααιθεσίαν denotat, & pro paraplegia sumitur. Hic autem veram apoplexiam, eamque fortem intelligit.

Ἀλλὰ καὶ ἐν εἰ ἐννοίῃς τὸν πυρετὸν ὀπιλαμβά-
νοντα, καὶ τῷ ἄλλῳ τὶ σημεῖον τοῦτο πρὸς τὴν

γινόμενον, μὴ διατρίβειν, ἀλλὰ τμήσαντα τὸ ὀστέον
 πρὸς τὴν μὲνινγιν, ἢ κατὰξύσαντα τῷ ξυστήρι.
 Ἐπιτομή δὲ γίνεται καὶ ἑυξυστον. Ἐπειτα τὰ λοιπὰ
 ὅπως ἰατρῆς εὖειν ὅπως αὖν δοκέη συμφέρειν, πρὸς τὸ
 γινόμενον ὀρώων.

C Vm autē animaduertes febrē inua-
 dere, & aliquod aliud signum acce-
 dere, cum ea non est cunctandum, sed os
 ad membranam vsque ferra secandum,
 aut scalpro deradendum, facile verò se-
 catur & facile deraditur, deinde reliqua
 sic curare oportet, quemadmodum con-
 sentaneum videbitur, rebus præsentibus
 bene perspectis.

S I forsan non deprehensa cranij fractura in-
 tra triduum os non sit excisum, & tandem
 superueniat, post septimum diem æstate, aut an-
 te decimum quartum hyeme, febris, febrique
 coniungatur signum aliud sinistrum & funestū,
 tunc eodem momento excidendum os aut ra-
 dendum, omnique vitio liberandum. Ad mem-
 branam autem vsque secandum os eo tempore,
 quia ex dolore & febre, alijsque pravis sympto-
 matis colligimus à cranio recessisse membranā.
 Si enim cranio affixa permanet, inflammatio
 nulla vulnus infestat, si recessit membrana ab
 osse, augentur dolores & febris Paulo lib. 6. cap.

90. Cum verò ante diem tertium in principio os secatur, præcipit paulo post Hippocrates ad meningem usque os excidatur, ne diutius denu- data relinquatur meninx, aut ne laceretur, cum adhuc sit affixa cranio. Os autem purulentum aut sphacelo tentatum facilius secatur & raditur, quia mollius, minusque solidum euasit. Exciso vel derafo osse, non negligendum vulnus carnis, habenda etiam est ratio membranae, curandum etiam ut citò abscedat os, si quod abscessurum est, non negligenda etiam symptomata, si quæ superueniant.

Όταν δ' ἐπὶ τρώμοσι ἐν κεφαλῇ αἰθρώπου ἢ πεσσωμένῃ, ἢ ἀσπιδώτῃ, ἐψλωμένῃ δὲ ἔσθ' ὅτε, οἰδήμα' ἐπιγίνεται ἐρυθρὸν καὶ ἐρυσιπελατῶδες ἐν τῷ προσώπῳ. καὶ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἀμφοτέ- ροισιν, ἢ τῷ ἑτέρῳ, καὶ εἴ τις ἀπλοῖτο ἔσθ' οἰδήματος ὀδυῶτο, καὶ πυρετὸς ἐπιλαμβάνοι, καὶ ῥίγος, τὸ δὲ ἔλκος αὐτὸ τε ἀπὸ τῆς σαρκὸς καλῶς ἔχει ἰδέ- σθαι καὶ τὰ ἀπὸ ἔσθ' ὅτε, καὶ τὰ φείροντα τὸ ἔλκος ἔχει καλῶς, πλὴν ἔσθ' οἰδήματος ἔσθ' ἐν τῷ προσώπῳ. καὶ ἄλλῃ ἀμαρτὰδα μὴ δὲ μίαν ἔχει τὸ οἰδήμα, τῆς ἄλλης διαίτης, τέτταρ' ἐστὶν. καὶ τὸ κοιλίῃ ὑποκαθῆραι φαρμάκῳ ὃ, π' ἡ- λίου ἄγχι. καὶ ἔσθ' ὑποκαρθεύτος ὃ, τε πυρετὸς ἀφίη- σιν, καὶ τὸ οἰδήμα καθίσταται, καὶ ὑγίης γίνεται. τὸ δὲ φάρμακον ἑρὶ δίδοναι πρὸς τὴν δύναμιν ἔσθ' αἰθρώπου ὁρῶν, ὡς ἂν ἔχη ισχύος.

VBi in vulnere capitis, cum ægrotus ferra sectum os habeat, vel non dissectum, ostamen nudatum existat, si tumor rubicundus erysipelatis naturam præ se ferens superueniat in facie, & in ambobus oculis, vel in alterutro, & si quis tumorem contingat, doleat, febrisque corripiat & rigor, vulnus verò quantum ad carnem pertinet, bene habere videatur, eaque pariter quæ ad os spectant, tum etiam ambientes vulnus partes, excepto tumore qui faciem occupat, nullusque tumori in reliqua victus ratione adiungatur error, huius aluus per inferiora purganda est, medicamento quod bilem ducat, sicque purgato cessat febris, evanescit tumor, restituitur sanitas. Sed ita dandum medicamentum, ut prius quid valeant ægrotantis vires, perpendamus.

Si in vulneribus capitis osse nudato superueniat erysipelas aut phlegmone erysipelato-des, occupetque faciem aut oculos, medicamento cholagogo aluum per inferiora purgandam esse docet. Soler autem erysipelas vulneribus superuenire ex sententia 17. libri *ἀπὶ ἐλκ. α'*. Sequitur etiam erysipelas ossa denudata ex aphorismo 19. lib. 7. Non tamen semper aut plerumque nu-

datis ossibus superuenit erysipelas, sed potius raro, ex commentario Galeni in eundem aphorismum, prauum tamen symptoma est cum nudato osse, circumstans caro erysipelate occupata apparet, significat enim, vt inquit Philotheus, affluxum sanguinis flauī & biliosi, qui supra positas carnes exedit & absumit. Non solum autem vulneri superuenit, sed sine hoc quoque oriri consuevit. Celso lib. 5. Occupat autem faciem & oculos, incipitque maximè ab ea parte nasi, quæ vulgò lepus appellatur, deinde in faciem totam expanduntur, gemina quidem occasione, ob faciei raritatem, & bilis leuitatem, ait Guido. Erysipelata dolor mordicans & pungens comitatur ob bilis acrimoniam, cumque sit erysipelas inflammatione calidius, febrem etiam excitat maiorem. Rigor fit ob bilem flauam quæ per membra sententia veloci motu differtur. Addit Hippocrates tumorem hunc erysipelatosdem, si non adiungatur alius error in ratione victus, medicamento cholagogoper inferiora esse vacuandum, quod Galenus etiam docet libro 14. therapeutic. cap. 2. his verbis, in erysipelate pro sanguinis missione, medicamento quòd bilem trahat purgamus, ipsamque particulam affectam refrigeramus. Hippocrates autem libro *πρὶ ἐλκῶν*, sic inquit, In omni vlcere, cui superuenit erysipelas, purgare corpus conuenit, qua parte vlceri conducit siue per superiora, siue per inferiora. Hoc autem loco, aluum per inferiora purgandam dicit, Cùm enim bilis feratur in partes superiores, ad eius cursum reuellendum, satius est aluum mouere, quam vomitum ciere. Exhibito

medicamento chalogogo, & euacuante bilem quæ febrem & tumorem excitabat, tollitur febris & euanescit tumor. Cæterum in curatione erysipelatis Hippocrates & Galenus phlebotomiam omittunt, quam tamen commendant plurimum Celsus libro quinto, capite 26. Paulus libro quarto, capite 21. Sed hæc in verò & legitimo erysipelate locum vix habet in erysipelate phlegmonode si vires patiuntur, utilis est. In hoc contextu omnia exemplaria constantissimè retinent ὀϊδημα, quod & ego retinendum censeo, nec ὀϊδημα τῆς διαίτης coniungo, sed ἀμαρτάδα τῆς αἵτης διαίτης, sic etiam apud Hippocratem lib. 4. epidem. ἀμαρτάδες βρωμάτων, errata in ratione ciborum dicuntur. Itaque altius penetrent critici, si velint Hippocratem intueri, non autem immutent pro arbitrio, quæ non intelligunt. Miror Mercurialem ipsum assensum præbuisse & ascripsisse margini, ἵημα.

Περὶ δὲ τῷ ὀρίσιος, ὅταν καταλάβῃ ἀνάγκη τῷ ὀρίσιος ἀνθρώπου, ἵωδε γνώσκειν. ἢ ἐξ ἀρχῆς λαβόντι τὸ ἵημα τῷ ὀρίσιος, & ῥῆ ἐκ τῷ ὀρίσιος τὸ ὀρίσιος πρὸς τὴν μὲνιγδα αὐτίκα. & ῥῆ συμφέρει τὴν μὲνιγδα ψιλὴν εἶναι, ὅτι πολὺν ῥῆνον κακοπαθεύσαν, ἀλλὰ τελευταῖον σάπη καὶ διαμυθήσῃ. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερος κίνδυνος, ἢ αὐτίκα ἀφαίρεσις πρὸς τὴν μὲνιγδα ἐκ τῷ ὀρίσιος τὸ ὀρίσιος, πρῶτον ἐν τῷ ἔργῳ τῷ ὀρίσιος τὴν μὲνιγδα. ἀλλὰ ῥῆ τῷ ὀρίσιος, ἐπειδὴν ὀλίγου πάνυ δὲ διαπετρίσθαι, καὶ ἵδη κινεῖται τὸ ὀρίσιος, παύσασθαι τῷ ὀρίσιος. καὶ ἔαν

ἔπι τὸ αὐτόματον ἄποσῆναι τὸ ὄστέον. ὃν γὰρ τῷ
 διατρίπτῳ ὄστέω καὶ ἔπι λελειμμένῳ τῆς τρήσεως,
 ἔκ ἀν' ἔπι γένοιτο κακὸν ὄστέον. λεπτόν γὰρ τὸ λεπτό-
 μενον ἤδη γίνεται. τὰ δὲ λοιπὰ ἴησθαι δεῖ, ὥς ἀν-
 δοκίη συμφέρειν τῷ ἔλκει.

DE sectione verò, cum secandi ho-
 minis necessitas fuerit, sic statuē-
 dum. Cū à principio curatione susce-
 pta ad vsum serræ venis, os ad membra-
 nam vsque non statim excidendum est,
 neque enim confert membranā vexa-
 tam diutius relinqui nudam, tandem
 enim putresceret & fætido madore cor-
 rumperetur. Subest & aliud periculum,
 si os sectum ad membranā vsque sta-
 tim auferas, ne in ipso opere, serra cere-
 bri membranā lædat. Verū secan-
 tem oportet cū iam parum abest, quin
 os sit dissectum, iamque mouetur, se-
 candi finem facere, & sinere vt os sponte
 sua abscedat, nihil enim mali superueni-
 re potest ossi dissecto, & à sectione reli-
 cto, quod enim relinquitur tenue iam
 est. Cætera curanda sunt, pro vt vulnere
 conducere videbitur.

DOcet quomodo capitis os sit serra exci-
 dendum, cū à principio ægrum curan-
 dun

dum quis suscipit, & intra triduum os secat, præcipitque ne ad membranam usque totum os excidatur duabus de causis, quia tunc membrana diutius alioquin afflicta, denudata relinquere-
tur, aërique externo & insueto exposita aliena-
retur, tandemque putresceret, superfluoque
madens humore intumesceret. Periculum etiam
impender, si statim initio perforatum os ad
membranam usque detrahamus, ne cerebri
membranam violemus & laceremus, cum enim
iis diebus inflammatio nulla vulnus infestet,
nullaque febre æger teneatur, veri-simile est
membranam à cranio non recessisse, sed affixam
permanere, ut docet Paulus libro sexto. Itaque
si statim initio os dissecare & ad meningem us-
que perforare & auferre tentemus, periclita-
bimur, ne cerebri membrana lādatur, cum cra-
nio adhuc adhæreat. Hic locus in codice græ-
co corruptus legebatur, & in codice Parisiensi
asterisco notatus, quem multi restituere conati
sunt. Ego duabus aut tribus literis solum mu-
tatis. Sic lego, ἀλλὰ πλεονταῖον σάπη καὶ διαμυδῖση.
Suadet deinde ut in sectione ossis, cum fere to-
tum os fuerit perforatum, & iam moveri inci-
pit, secandi finem faciamus, sinam usque ut os
sponte sua abscedat, non enim periculum sub-
eundum est, ut antea dixit, conando detrahere
ossa, priusquam sponte sequantur. Recedent
enim facile succrescente carne, & ut ait Gale-
nus sexto therapeutic. Circa finem, membrana
ipsa ab ossibus quæ vehementer sunt afflicta, ce-
lerrimè recedet. Itaque tunc nullus erit metus,
eam, quæ iam seiuncta est, membranā violare, si

velimus os auferre. Initio tamen nonnunquam etiam totum os secatur, & à membrana statim detrahitur, vt Paulo post docebit sententia penultima.

Πρίοντα δὲ ῥῆ πικινὰ ἐξαίρειν τὸν ὀρίονα, τῆς θερμασίας ἐνεκα ὅσους, καὶ ὕδατι ψυχρῷ ἐναποβάπτειν. θερμαινόμενος γὰρ ὑπὸ τῆς πυρετώδους ὀρίων, καὶ τὸ ὅσθον ἐκθερμαίνων, καὶ ἀναζητούντων, κατακρίει, καὶ μείζον ποιεῖ ἀφισταθαι τὸ ὅσθον τὸ πυρετώδην τῇ ὀρίων, ἢ ὅσον μέλλει ἀφισταθαι. καὶ ἡν αὐτίκα βύλη ἐκὼρίσαι τὸ πρὸς τὴν μήνινγα, ἔπειτα ἀφελῆειν τὸ ὅσθον, ὡσαύτως καὶ πικινὰ τε ἐξαίρειν τὸν ὀρίονα καὶ ἐναποβάπτειν τῷ ὕδατι τῷ ψυχρῷ.

S Ecantem verò sæpius oportet ferrâ attollere & subinde in aquam frigidam immittere, metu incendij offis, incallescens, etenim ferra dum circumagitur, osque ipsum calefaciens & desiccans adurit, efficitque vt maior offis quod ferram attigit, portio abscedat, quam abscessura esset. Quod si statim ad membranam vsque velis os excidere, ipsûmque auferre, eodem modo ferra sæpius est attollenda, & in aquam frigidam demittenda.

Proponit quid Chirurgus in osse secando
obseruare debeat, ne serra dum circumagi-
tur, nimis incalescat, sæpius est attollenda &
retrahenda, & sæpius in aquam frigidam
demittenda. Cum enim serra sit ferrea, agatque
in corpus durum, nempe cranium, ex circumdu-
ctione & motu flammam facile concipit, diu re-
tinet, vehementer imprimi in ipsum cranij os;
calefactum autem os & desiccatum adurit, cum-
que adustum est, à parte sana recedit. Cum-
que soleat natura squamas reijcere ex osse, circa
quod serra circumacta est, maior ossis portio
abscedet, si serra incalescens os ipsum adurat,
vtile est autem vt quam minimum ex osse dema-
tur, cum in osse plus propugnaculi cerebrum ha-
beat, quam habiturum fuit eo exciso, hocque
præceptum de serra sæpius remouenda & in fri-
gidam immergenda, non solum locum habet in
sectione ossis quæ ad membranam vsque non
penetrat, sed etiam cum os statim ad membra-
nam vsque perforatur & detrahitur. Addit Cel-
sus aliud præceptum cap. 3. libri 8. neque alienū
est, inquit, instillare paulum rosæ vel lactis quo
magis lubrico circumagatur, quod ipsum tamen
si copiosius est, aciem ferramenti hebetat.

Ἦν δὲ μὴ ἐξ ἀρχῆς λαμβάνῃς τὸ ἵημα, ἀλλὰ
παρ' ἄλλης πρὸς δέχῃ ὑπερίζων τῆς ἱησίας, ὥριον
ἔσθ' ἡμετέρας ἐκπρίειν μὲν αὐτὴν τὸ ὅσπερ πρὸς
τὴν μὴνιγαν. Ἰαμινὰ δὲ ἐξαπρῶντα τὸν ὥριον
σκοπεῖσθαι καὶ ἄλλως καὶ τῇ μῆλῃ πρὸς χεῖρ' αὐτῆς
ἰδὼν ὁ ὥριος. καὶ γὰρ πολὺ ἴασον διαπρίεται.

τὸ ὀστέον, ἢν ὑπὸ πύον τε ἔον ἤδη καὶ διάπυον ὡρίνη.
 καὶ πολλάκις τυγχάνει ὅπι πόλαμον ἔον τὸ ὀστέον,
 ἄλλως τε καὶ ἢν ταύτῃ τῆς κεφαλῆς ἢ τὸ τρώμα, ἢ
 τυγχάνει λεπτότερον ἔον τὸ ὀστέον, ἢ παχύτερον.
 ἀλλὰ φυλάσσεσθαι δεῖν ὥς μὴ λάθῃς πρὸς βα-
 λῶν τὸν ὥριονα. ἀλλ' ὅπῃ δοκῇ παχίτατον εἶναι
 τὸ ὀστέον, ἐκ τοῦτο αἰεὶ ὀκνηεῖν τὸν ὥριονα, θα-
 μινὰ σκοπούμενος, καὶ πειράζεσθαι ἀνακινέων τὸ ὀστέον
 ἀναβάλλειν. ἀφελὼν δὲ τὰ λοιπὰ ἰητρεύειν ὥς ἂν
 δοκῇ συμφέρειν τῷ ἔλκει.

AT si ab initio curationem non sus-
 ceperis, sed ab alio exceperis, se-
 riùs ad curationem accedens acutiori
 ferra statim præcidere os oportet ad mē-
 branam usque, sæpius autem attollenda
 est ferra, & undique considerandus tum
 aliter, tum etiam specillo ferræ circuitus.
 Etenim celerius præciditur os si purulen-
 tum iam & pus fundens perforaueris. Ac
 sæpe contingit, ut non admodum pro-
 fundum sit os, tum alibi, tum si ea parte
 capitis sit vulnus, qua tenuius os quàm
 crassius existit. Sed cauendum ne ferram
 adhibens, fallaris, qua verò parte crassif-
 simum os esse videbitur, in eam semper
 feram imprimas, sæpiùsque inspicias,
 tentésque dimouendo ipsum os auferre,

quod cum abstuleris, cætera curare oportet, vt ratio vulneris postulat.

Docuit antea quomodo excidendum sit os, cum ab initio vulnerati cura chirurgo demandatur, nunc autem docet quomodo secandum sit os, si non statim inter initia ad curam vocetur, sed ægrotantem ab altero malè curatum, serius curandum suscipiat. Debet enim tunc chirurgus os ad membranam vsque prædicere, nec præcidendi finem facere, donec totum os sit perforatum: quoniam sanies inter os & membranam putrescens celerem exitum requirit, nec subest periculum, ne serra cerebri membranam laceret, cum à cranio separata sit, quòd symptomatica quæ superuenerunt, ostendunt. Acutiori serra vtendum consulit, vt citius, tutiusque os perforetur, Πείρα χαυκτον, verti serra acutiorē, cum alij interpretes serra cauam, asperam, aut exsculptam dicant. Serra enim minus acuta os ferè iam purulentum & mollius laceraret potius quam secaret. Serra sæpius attollenda, & foraminis altitudo consideranda & oculis & immisso specillo, quia cum totum os sit excidendum, periculum est, ne cerebri membranam serra lædat, cum os eiusmodi purulentū & mollius citissime præciditur. Præterea cum cranij hominis figura sit spherica & rotunda, serra vel modiolus æqualiter præcidere non potest, cumque sit os cranij alia parte crassius alia tenuius, periculum est ne prius in vna parte, quam in alia perforetur. Itaque remouenda subinde serra, &

consideranda altitudo foraminis, grauiusque semper imprimenda & adigenda ferra in eam partem quæ minus perforata, quæue crassior apparebit. Præcipit postremo ut quum parum abest, quin os perforatum sit, inspiciamus sæpius, tentemusque dimouendo detrahere os, ne forte membranam cerebri violemus. Addit Celsus, quæ labant & ex facili remoueri possunt, forfice ad id facta colligenda esse, maximèque ea, quæ acuta membranam infestant, si id ex facili fieri non potest, subiiciatur lamina membranæ custos, & super eam quicquid spinosum est & intus eminet, excidendum, eadem lamina quicquid deorsum insedit, attollendum. Paulus aures obturat lana propter sonitum qui ex ferramenti illisu redditur, recentiores etiam nunc aures occludunt xylo, ne ferre strepitus sit molestus. Fallopius tamen hoc deridet, quia cum ossa capitis colliduntur, finduntur, franguntur aut forantur, statim communicant passionibus auribus, & siue occlusæ siue apertæ sint aures, sonum semper percipiunt.

Καὶ ἢν ἐξ ἀρχῆς λαβὼν τὸ ἵημα, αὐτίκα βάλῃ
ἐκπώρισας τὸ ὄστεον ἀφελεῖν ἀπὸ τῆς μνήχης,
ὡσαύτως καὶ πυκνὰ τε σκοπεῖσθαι τῇ μήλῃ καὶ
περίοδον τε πρίονος, καὶ ἐς τὸ παχύτατον αἰεὶ
ὅτε τὸν πρίονα ἐντελεῖται, καὶ ἀνακινέων. βούλε-
σθαι ἀφελεῖν τὸ ὄστεον.

QUod si curationem ab initio susceperis, velisque statim os præcisum

à membrana detrahere, eodem modo ferræ circuitum specillo sæpius explorare oportet, & in partem ossis crassissimam semper ferram adigere, & os dimouendo tentare detrahere.

ANte hunc contextum in exemplaribus græcis continentur plurima quæ huius libri fere molem æquant, quia tamen ad rem propositam nihil faciunt, ea ab interpretibus omittuntur & in quibusdam etiam exemplaribus Græcis non leguntur. Aldinus codex hoc in fronte habet scriptum, quod etiā retinuit Basiliensis, *ταῦτα προσγεγράφαι τῷδε τῷ ἐκβλήῳ τὰ λυγρὰ ἐστίν.* Hoc autem dicit Galenus in proœmio commentariorum in quartum librum de diætâ in morbis acutis. Quod nunc explicamus circa finem legitur, quod etiam missum faciunt plures interpretes Latini, & in quibusdam codicibus Græcis non legitur. In codice Pariensi hoc postremum cum superioribus iunctum legitur, quod etiam vertit & commentarijs amplificauit Vidiſus quamuis ante hæc in codice Aldino & Basiliensi scriptum sit, *ἐν τῷδε τὰ τελευτήματα πρὸς προσγεγράφαι δὴλον ἐστίν.* Cùm quis curando ægro per initia præficatur, non debet statim ad membranam vsque os excidere & auferre, ob eas causas quas paulò ante commemorauit. Si quando tamen cogatur aliquis, quamuis initio ad curationem adhibeatur, protinus os excidere ad membranam vsque & remouere, debet obseruare eadem præcepta, quæ paulo an-

te proposuit, cum ageret de modo secandi ossis, cum seriùs ægrotus, alijs prius commissus, nos ad curationem vocat. Tunc enim attollenda sæpius ferra, considerata sectionis altitudo, in partem ossis crassissimam adigenda & imprimenda ferra, conandumque ut os cum labat & nutat, dimouendo detrahamus. Cogitur autem medicus statim primis diebus os excidere ad meningem usque & auferre, si copia sanguinis in cerebrum confluerit si os quod desedit, vehementer cerebri membranam urgeat, si ex fractura quidam veluti aculei eandem pungant.

Ἦν δὲ πρυπάνω χεῖρ, πρὸς δὲ τιῶ μὲνιγγα μὴ ἀφικνέεσθαι, ἢν ἐξ ἀρχῆς λαμβάνων τὸ ἴημα πρυπάνις, ἀλλ' ὀπιλιπέην ὅσπερ λεπτόν, ὥστε καὶ ἐν τῇ ὑπὸ σκελὶ γέγραπται.

CUm autem terebra vteris, ad membranam usque ne penetres, si per initia curationem suscipias per terebrā, sed tenuem ossis partem relinque, ut in ferræ usu præscriptum est.

Os capitis non solum ferra præciditur, sed aliquando etiam terebra, nunc docet quomodo sit excidendum cum ab initio curatio per terebram suscipitur. Suadet autem ne ad membranam usque statim os excidatur, ob easdem causas quas in usu ferræ recensuit, præterea cum os fere totum perforatum erit, & iam nutare in

capit, perforandi finem facere oportet, & sinere
ut os sponte sua abscedat. Quoniam autem apud
veteres non vna & eadem fuit ossis secandi &
excidendi ratio, non ineptum fuerit hoc loco, &
modum secandi ossis, & instrumenta paucis pro-
ponere.

Hippocrates hoc libro meminit tantum triū
ferramentorum, quibus vtitur in osse radendo
& excidendo, scalpri, ferræ, & terebræ.

Scalper autem quem *ξύστρα* vocat, qualis fue-
rit non satis constat. Eo quamuis vsi sint vete-
res ad os radendum & excidendum, Hippocra-
tes tamen hoc libro censet os abradendum scal-
pro, in longum, latum & profundum ad depre-
hédēdas rimas latentes & contusiones obscuras,
quæ si admodum profundæ sint, & abradendo
non possint deleri, ad vsum ferræ accedit, nec
penitus os scalpro excidit. Ex Celso tamen aliū
scalpri vsum colligimus, ad excidendum spatium
medium inter foramina, quæ terebra fiunt. A-
pud Galenum tria scalprorum genera leguntur,
Est enim *ἐκκοπίης κοῖλος*, scalper excisorius ca-
uus, qui etiam *κύκλισκος*, & Paulo *κυκλισκωτός*
dicitur, quod ima sui parte ad circuli figuram
accedat, eius vsus est in magnis fracturis capi-
tis, vel cum contusione aliqua. Eo enim quod
contusum est, excidi debet. Cū verò scalper
iste cauus malleolo adigatur vitio omnino non
caret, quod caput immodicè concutiat. Est alius
scalper qui *ἐκκοπίης φακωτός* siue *φακοειδής* dicitur,
quod lenticulæ speciem in imo habet obtusam,
aciem verò per longitudinem acutam, eoque
vtitur, quū vel scalpro cauo os excidens, vel

forcipe quod valdè comminutum est attollens vel conuertens, aditum facit, per quem lenticula immittatur, vbi autem latam partem lenticulæ super membranam constituit, ferit malleolo, ac si caluariam diuidit, nullûsque modus excidendi inueniri potest, qui minùs cum periculo, nec qui celerius perficiatur. Est etiam tertius scalper, qui *ξύστηρ στεγός* id est angustus ducitur, quo vtitur Galenus in simplicibus fracturis quæ ad diploem vsque perueniunt, & hic scalper est Hippocrati familiaris. Apud Paulum etiam est scalper excisorius *ἀντίθετος* id est oppositus, qui nihil est aliud, quam forfex qua fabri vtuntur ad aliquid excidendum, quamuis aliter sentiat Fallopius.

Serra siue *πέριον* ferramentum Hippocrati familiare, ad ossa secanda & excidenda, cuius plures extant apud veteres differentia, alia enim sunt longæ, cuiusmodi sunt illæ, quibus fabri vtuntur, quæ adhibentur in excisione ossis tibiæ, femoris, aut brachij, quædam sunt exiguæ, quæ in sectione cranij vsurpari possunt, alia sunt teretes, concauæ & imis oris serratæ, quibus verisimile est Hippocratem vsum fuisse in capitis ossibus excidendis, admonet enim subinde attollendam esse ferram, eiûsque circuitum considerandum, *σπίξ* id est *ἐν κύκλῳ*, & hæc mediolum Celsi representant, de quo paulò post. Est etiam apud Hippocratem hoc libello *πέριον χαράκτος* ferra acuta, quæ videtur esse *πέριον μαχαίρωτος* Galeni, id est ferra similis cultello quæ polit & lænigat, *υπόδοντος* est ferra dentata, quæ incidendo altiora crenularum vestigia relinquit.

Tertium Hippocratis ferramentum est *πέρυ-*

πυρρὸν siue terebra, cuius bis meminit in hoc libello, cum agit de ossibus puerorum parua terebra perforandis & in fine libri. Terebrarum autem, ut ait Celsus, duo genera sunt, alterum simile ei, quo fabri vtuntur, alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit, atque iterum ab alio principio paulò minùs quàm æqualiter sursum procedit. Vsum terebræ docet idem Celsus. Terebra foramen fit in ipso fine ossis vitiosi atque integri; deinde alterum non ita longè, tertiumque, donec totus is locus qui excidendus est, his cauis sit cinctus, tunc excisarius scalper, ab altero foramine ad alterum malleolo adactus, id quod inter vtrumque modium est, excidit, ac sic ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modiololo imprimitur. Est etiam apud Galenum *τρυπανον ἀβαπτιζον*, terebra quæ mergi non potest, nectora in cavitatem subiectam descendere, supra cuius mucronem circulus quidam latus parum extans circumcurrit, hic prohibet, ne terebra dum agitur, aliùs descendat quam par sit, & subiectas partes violet.

Celsus Hippocratis Latinus interpres duobus modis os excidit, vtiturque quatuor instrumentis, modiololo, terebra, scalpro, & lamina membranæ custode, *μνηνγοφύλακα* Græci vocant. Si parvulum est, quod læsum est, modiololo exciditur, si spatiosum, terebris.

Modiolus qui *χοιρίκιον* vel *χοιρινὸς* Græcè dicitur ferramentum est concavum, teres, imis oris ferratum, per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur, modiolus au-

tem est ferra teres qua vtitur Hippocrates. Paulus vsum ferræ & modioli à recentioribus tanquam noxium improbari scribit. De terebra & scalpro satis dictum.

Μηνιγγοφύλαξ membranæ eustos, & lamina ænea firma, paulum resima, ab exteriori parte lævis, quæ demissa est, vt exterior pars eius cerebro propior sit, subinde ei subijcitur, quod scalpro discutiendum est, ac si excipit eius angulum, vltra transire non potest, eoque & audaciùs & tutius scalprum malleo subinde medicus ferit, donec excisum vndique os eadem lamina leuetur, tollique sine vlla noxa cerebri potest, eadem lamina quicquid deorsum insedit, attollendum. Loco meningophylacis vtuntur Chirurgi specillis in extremo dilatatis & attenuatis.

Galenus circa finem libri sexti therapeutici capitis os præcidi posse dixit varijs modis, parùmque tutam existimat χειρουργίαι quæ terebra perficitur, quia dum paulò audaciùs tractatur, dura membrana quæ ossi substernitur, non raro violatur. Vsum etiam modioli non videtur approbare, cum dubitat, an eo vtentes, timidiore alijs siue tutiores appellet. Excisionem quæ fit cycliscis plurimum commendat, cæterum quod excidi oportet, id totum circulo cycliseis non nudat, sed ex ea maximè parte, qua fractura est grauissima, vbi verò vnam semel nudauerit partem, ac scalprum φακόν submiserit, ferit malleolo, ac sic caluariam diuidit, aliquando instrumento quod ὀσάχραν vocant, aliquibus ossium quæ vehementer sunt comminuta vel exaltatis vel conuersis, lenticularem scalprum demittit,

quo facto, succedunt omnia quibus opus est cum securitate simul ac celeritate.

Scalperi tenuis, *φοκωπὴς*, cycliscus, terebra etiam *ἀβάνισος*, instrumenta sunt quibus utitur Galenus, de quibus iam dictum est, superest ut quid sit *ἰσὺς* ex paucis explicemus. Est autem *ἰσὺς* ex instrumentum Chirurgicum, quo ossa atrolluntur, deprimuntur, loco mouentur vel euelluntur, huius loco Celsus utitur forfice, inquit enim ossa quæ labant & ex facili moueri possunt forfice ad id facta colligenda sunt, maximè quo ea quæ acuta membranam infestant. Paulus os violatum aufert, siquidem fieri potest digitis, sin minus *ἰδοντάγρη* ἢ *ἰσὺς* ex, ἢ *τετραλαβίδι*, aut eiusmodi quopiam instrumento.

Paulus libro sexto os capitis imbecillum natura aut fracturæ vitio aufert scalpris excisorijs antithetis & acie inter se aduersis, id est forfice ad id facta, sed prius aditum facit cycliscis, scalpris, malleolo sensim adactis. Si autem validum sit os, terebra quam *ἀβάνισον* vocant, primum perforat, deinde scalpris excisorijs præcidit, detrahítque non *ἀδρόως*, sed sensim & per partes, & hæc, inquit, ratio chirurgiæ maximè communis, facilis & prompta. Laudat etiam excisionem Galeni per scalprum cycliscum & *φακωτὸν*. Aui-cennas eadem utitur Chirurgia, qua & Paulus.

Recentiores medici & Chirurgi ingeniosi & in artis operibus feliciter versati ferram teretem siue modiolum probant & vsurpant, & vulgari nomine, improprio tamen *τρίπανον* vocant, eiusque vsum suis inuentis facillimum, tutissimum, & omnino *ἀκίνδυνον* reddiderunt.